

9- mode d'emploi administration – modo de empleo

- Visser le bouchon à fond pour percer le flacon.
- Screw the cap thoroughly to pierce the bottle.
- Atornillar el tapón a fondo para perforar el frasco.



1- catarstat® collyre

2- PRÉSENTATION :

Collyre : flacon de 10 ml - AMM 318 892.6.

3- COMPOSITION :

Principes actifs :	Chlorhydrate de pyridoxine
Acide L-glutamique	
L-biaspartate mixte de magnésium et de potassium	
Glycine	
Conservateur :	Chlorure de benzalkonium
Excipient : q.s.p.

4- INDICATIONS :

Ce médicament est un collyre.
Il est préconisé dans les opacités du cristallin (cataracte).

5- CONTRE-INDICATIONS :

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

6- PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE SIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
NE JAMAIS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.

7- AUTRES EFFETS POSSIBLES DU MEDICAMENT :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMEN
CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES
PLUS OU MOINS GENANTS ; NE PAS HESITER A DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

8- POSOLOGIE :

En moyenne 2 gouttes dans chaque œil, 2 à 3 fois par jour
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT
L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

9- MODE D'EMPLOI :

Voir schémas.

10- CONDITIONS DE DELIVRANCE :

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT
CRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :
- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS
- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

11- DUREE DE STABILITE :

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION
QUEE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE.

12- PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 15 jours
ouverture du flacon.

