

~~EXOMUC~~® 200 mg

acétylcystéine

COMPOSITION

Acétylcystéine (DCI) 200 mg

Excipients : aspartam, bêta-carotène, sorbitol, arôme orange q.s.p. un sachet.

Granulés pour solution buvable. En sachet. Sans sucre.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est un expectorant. Il facilite l'évacuation par la toux des mucosités bronchiques. Ce médicament est préconisé dans les états d'encombrement des bronches accompagnant certaines affections de l'appareil respiratoire.

CONTRE-INDICATION

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas de phénylcétourie (en raison de la présence d'aspartam).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Prévenez votre médecin en cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.
- Il est conseillé de ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Prévenir votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Adultes et enfants de plus de 7 ans : un sachet trois fois par jour.

Enfants de 2 à 7 ans : un sachet deux fois par jour.

Nombre de calories par sachet : 3,5 Kcal.

Absorber après avoir fait dissoudre le granulé dans un demi-verre d'eau.

EFFECTS INDESIRABLES

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Possibilité de troubles digestifs : nausées, diarrhées, maux d'estomac. Il est conseillé dans ce cas de réduire la posologie.

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MEDICAMENTS A PORTEE DE MAIN DES ENFANTS