

NÉO-CODION[®]

COMPRIMÉS ENROBÉS

COMPOSITION : Camposulfonate de codéine 25 mg
(Quantité correspondante en codéine base : 14, 93 mg).
Sulfogaïacol (DCI) 100 mg
Extrait mou de Grindélia 20 mg
Excipients: Terre d'infusoires, kaolin lourd, silice hydratée, glucose liquide, paraffine liquide légère, amidon de blé, stéarate de magnésium, talc, laurylsulfate de sodium, carboxyméthylamidon sodique, gomme laque, colophane, gélatine, gomme arabique, saccharose, dioxyde de titane (E 171), jaune orangé S (E 110), bleu patenté V (E 131), éthylvanilline, cire de Carnauba, q.s.p. un comprimé enrobé.
Boîte de 20 comprimés enrobés.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Ce médicament contient un antitussif.
Il est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez l'adulte.

CONTRE-INDICATIONS : Antécédent d'allergie à l'un des constituants, toux chez l'asthmatique, insuffisance respiratoire, allaitement. Ne pas utiliser en association avec l'alcool.

MISES EN GARDE : Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques. Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, demandez l'avis du médecin. En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : PREVEZ VOTRE MEDECIN en cas de maladie au long cours du foie.
Il conviendra de ne pas associer un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS : Ce médicament contient un antitussif, la codéine. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les posologies maximales conseillées (voir posologie et mode d'administration).

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec l'alcool, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

● **Grossesse :** ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de ce traitement.

● **Allaitement :** ce médicament passe dans le lait maternel. De trop fortes doses de codéine administrées chez les femmes qui allaitent peuvent entraîner des pauses respiratoires ou des baisses du tonus du nourrisson. En cas d'allaitement, la prise de ce médicament est contre-indiquée.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES : Possibilités de somnolence. Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées. Il est préférable de commencer ce traitement le soir.

SPORTIFS : Sportifs, attention, cette spécialité contient une substance pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopages.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : RESERVE A L'ADULTE. En l'absence d'efficacité, ne pas augmenter les doses au-delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif, mais consulter un médecin. La posologie usuelle est de :

Chez l'adulte : 1 comprimé par prise, à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 4 prises par jour.

Chez les sujets âgés ou en cas d'insuffisance hépatique : diminuer de moitié les doses conseillées chez l'adulte. Voie orale. Avaler les comprimés avec un peu d'eau. Les prises doivent être espacées de 6 heures au minimum. Le traitement doit être court (quelques jours). En cas de surdosage, CONSULTER un médecin.

EFFETS INDESIRABLES : Possibilité de : constipation, somnolence, vertige, nausées, vomissements. Rarement : gêne respiratoire, réactions cutanées.

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MEDICAMENTS A PORTEE DE MAIN DES ENFANTS
