

### COMPOSITION :

Camphosulfonate de codéine ..... 0,1722 g  
(Quantité correspondante en codéine base : 0,1027 g).

Excipients : acide ascorbique, sirop d'Ipéacuanha composé, sirop de baume de Tolu, alcool éthylique à 90%, glycérol, gallate de propyle, parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), jaune orangé S (E 110), bleu patenté V (E 131), arôme orange, arôme mandarine, vanilline, solution de saccharose, solution concentrée d'hydroxyde de sodium, eau purifiée q.s.p. 100 ml. Degré alcoolique : 3,16°. Flacon de 180 ml de sirop.

**INDICATIONS THERAPEUTIQUES :** Ce médicament contient un antitussif. Il est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS :** Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants : antécédent d'allergie à l'un des constituants, toux chez l'asthmatique, en cas d'insuffisance respiratoire, allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENELEMENT PAS ETRE UTILISE en association avec l'alcool.

**MISES EN GARDE :** Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques. Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, demandez l'avis du médecin.

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :** PREVEZ VOTRE MEDECIN en cas de maladie au long cours du foie. En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenir compte de la teneur en saccharose (sucre) : 8,7 g par cuillerée à soupe.

Il conviendra de ne pas associer un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique).

**INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :** Ce médicament contient un antitussif, la codéine. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les posologies maximales conseillées (voir posologie et mode d'administration).

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec l'alcool, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

### GROSSESSE - ALLAITEMENT :

● **Grossesse :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

● **Allaitement :** Ce médicament passe dans le lait maternel. De trop fortes doses de codéine administrées chez les femmes qui allaitent peuvent entraîner des pauses respiratoires ou des baisses du tonus du nourrisson. En cas d'allaitement, la prise de ce médicament est contre-indiquée.

**D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.**

### CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES :

L'attention est appelée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les possibilités de somnolence attachée à l'usage de ce médicament. Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées. Il est préférable de commencer ce traitement le soir.

**SPORTIFS :** Sportifs, attention, cette spécialité contient une substance pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopages.

**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :** RÉSERVE A L'ADULTE : En l'absence d'efficacité, ne pas augmenter les doses au-delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif, mais consulter un médecin. La posologie usuelle est de :

Chez l'adulte : 1 cuillerée à soupe par prise, à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 4 prises par jour. Chez les sujets âgés ou en cas d'insuffisance hépatique : diminuer de moitié les doses conseillées chez l'adulte.

Voie orale. Les prises doivent être espacées de 6 heures au minimum. Le traitement doit être court (quelques jours). En cas de surdosage, CONSULTER un médecin.

**EFFETS INDESIRABLES :** COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Possibilité de : constipation, somnolence, vertige, nausées, vomissements; Rarement : gêne respiratoire, réactions cutanées.

### CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.