

غير شائع أكثر من أو يساوي ١ إلى ١٠٠٠	شائع أكثر من أو يساوي ١ إلى ١٠٠	مجموعة جهاز العضو
أقل من ١ ١٠٠	أقل من ١ ١٠ /	اضطرابات فلوكسسين

يتبغى الاهتمام بالعلوم الماتحة بشأن مقاومة السبب وفلوكساسين قبل بدء الاعتبار التوجيهات الطبية بشأن الاستخدام الملائم للعوامل المضادة للبكتيريا.

- ١ - أسماء**  
سپیرووای ۲۰۰  
**٢ - التركی**  
کل عبوده زجاج  
کمیة کلورید ا  
للحصول على  
**٣ - الشك**  
 محلول للتسري  
 محلول صاف.  
 قيمة الرقم الـ  
**٤ - المعا**

**المسيحيون**  
استخدام سبب  
الفنانيون في  
**السيكلوبي**  
للحظ وجود ارتباط  
في نفس وقت  
بتكرار رقابة تزامن

يجب اخراق سادة الجبهة الزجاجية التي تحتوي على محلول التسريب في الملفة المركبة للسدادة وذلك بسلوهة الاستخدام. اخراق الغطاء المخارجي للسدادة قد يؤدي إلى أضرار لسدادة العيوب الزجاجية.  
يجب التخلص من أي محلول غير مستخدم.

**٧ - المصنع**

باير فارماز ايه جي  
المكان: ٥١٣١٨ ليفربوكوزن، ألمانيا.

**٨ - تلقيح مفعمة النتر**

يلوكوسين في نفس الوقت مع استخدام مناهضات الفيتامين K يمكن أن المضادة للتجلط قد تختلف اختلافاً طفيفاً مع العوامل الآتية: العمر، العمر، المرض حيث يصعب تحديد مساهمة السيسروفيلوكوسين في زيادة الـ INR (الدولية)، بينما مرافقه INR بشكل متكرر أثناء وبعد فترة وجيزة من استخدام فلورينادينون).

- في الدراسات الـ isozyme على الرغم من عندما يتم است .(٤) روبينيرول

- مستحضر طبي يؤثر على صحتك و استعماله خلاف التعليمات يعرضك للخطر.
- ابعد بعده استشارة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرف لك الدواء.
- الاطبيب الصيدلاني هما الخبران بالدواء و بنفعه و ضرره.
- لا تقطع العلاج قبل المدة المحددة لك من تلقائ نفسها.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.**

يرجى ان استخدام روبيبريلو في نفس الوقت مع استخدام سبيرووكساسيين. الـ C<sub>MAX</sub> لـ isozyme CYP450 1A2 يؤدي إلى زيادة AUC للروبيبريلو ٨٪ على اثناء و بعد فترة وجيزة من استخدام روبيبريلو في نفس الوقت مع استخدام ذلك الـ A2A ذلك الـ A2A (انظر الجزء ٤ - ٤).

خاص أصحاب أن استخدام مستحضرات طبية تحتوى على ليدوكايين في نفس الوقت  
يساين. الذي هو مثبط معتدل للـ isozyme CYP450 1A2 يؤدى إلى انخفاض  
نسبة الـ C<sub>MAX</sub> و يعكس النتائج المترتبة على ذلك الـ C<sub>MAX</sub> على اثناء و بعد فترة وجيزة من استخدام روبيبريلو في نفس الوقت مع استخدام ذلك الـ A2A ذلك الـ A2A (انظر الجزء ٤ - ٤).

- لیدوکایین کان استخدام لیدوکائین  
بعد استخدام ترکیزات کلوزابین پنصح بالمراقبة**

ن في نفس الوقت مع استخدام الكلورابين (انظر الجزء ٤ - ٤).  
**C<sub>MA</sub>** و AUC للسبيلاتنافيل بقدر مرتين لدى الأشخاص الأصحاء بعد  
 من طريق الفم بقدر ٥٠ مليغرام في نفس الوقت مع جرعة ٥٠٠ مليغرام  
 لذلك. ينفي توخي المذر عندما يتم استخدام سيربروفلوكساسيدين في نفس  
 أقفال مع الآخذ بعين الاعتبار المخاطر والفوائد.  
 **والإعراض من الثدي**

- البيانات المتوفرة  
السمبية للجنيه  
إلى آثار ضارة له  
الغير ناضج لد  
ولادة الحيوانات.  
في الكائن الحي

**الغیر مرتبوبة**  
الغیر مرتبوبة (ADRs) هي الغيرات الاصحاحات التي تحدث عاليه في المخاطر المحتملة من الضرب المفصلي. لا ينبغي أن ينبعوا من المخاطر المحتملة من الضرب المفصلي. لا ينبغي أن ينبعوا من المخاطر المحتملة من الضرب المفصلي. لا ينبغي أن ينبعوا من المخاطر المحتملة من الضرب المفصلي.

- الحصول على  
بعد التسويق (١)  
أدنى بحسب ف  
المصطلح عليها  
الوريد.

- الإصابة  
بالمراض

		(جزء ٢)
	فقر الدم انحلالي نقص في عدد الأنيميا نقص العدلات الغبيات زيادة عدد نقص عدد كرات الدم الدم البيضاء الأنيميا نقص كرات الدم كثرة كرات الدم المحمضية	

	تفاعل حساسية زائدة تراكم غير سوي لسائل مائي من الحساسية زائدة (تهدد)	تفاعل حساسية زائدة تراكم غير سوي لسائل مائي من الحساسية زائدة (تهدد)	السموم


- نفسية

ان ينتظرون  
إلى تكوين و  
قد تبلغ ذروتها  
في محاولة  
لتحقيقه /  
الانتحار أو إخراج  
النفس (انظر  
المجزء ٤ - ٤)  
الانتحار التي  
قد تبلغ ذروتها  
في محاولة  
لتحقيقه /  
الانتحار التي  
قد تبلغ ذروتها  
في محاولة  
لتحقيقه /

- اضطرابات  
العين

	<b>طنبين</b> <b>فقدان السمع</b> <b>/ ضعف</b> <b>السمع</b>	<b>سبيل المثال</b> <b>ازدواج الرؤبة</b>
--	--	--