

Coltramyl® 4 mg

thiocolchicoside

Comprimé

SANOFI 

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Coltramyl 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Coltramyl 4 mg, comprimé
3. Comment prendre Coltramyl 4 mg, comprimé
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Coltramyl 4 mg, comprimé
6. Informations complémentaires

1. QU'EST-CE QUE COLTRAMYL 4 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

MYORELAXANT.

(M : Muscle et Squelette).

Ce médicament est un myorelaxant. Il est préconisé, chez l'adulte (plus de 15 ans), dans le traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE COLTRAMYL 4 mg, comprimé

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais coltramyl 4 mg, comprimé en cas :

- d'antécédents d'allergie au thiocolchicoside, à l'un des constituants ou à la colchicine,
- d'allaitement, de grossesse.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec Coltramyl 4 mg, comprimé

Mises en garde spéciales

Utiliser avec précaution en cas d'antécédents d'épilepsie ou de convulsions. La survenue de crise convulsive impose l'arrêt du traitement.

Précautions d'emploi

En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.

En cas de douleurs d'estomac, de nausées, de vomissements, prévenez votre médecin.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose ou au fructose, un déficit en lactase de Lapp, un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant toute la durée de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin.

Allaitement

Ce médicament est contre-indiqué en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les possibilités de somnolence attachées à l'usage de ce médicament même si elles restent très rares. Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool.

Liste des excipients à effet notoire : saccharose, lactose.

3. COMMENT PRENDRE COLTRAMYL 4 mg, comprimé

Posologie

Réservé à l'adulte (plus de 15 ans).

La posologie habituelle est de 4 comprimés par jour, en 2 prises.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Mode d'administration

Avaler les comprimés avec un verre d'eau au cours des repas.

Fréquence d'administration

Conformez-vous strictement à la prescription de votre médecin.

Durée de traitement

Conformez-vous strictement à la prescription de votre médecin.

Si vous avez pris plus de Coltramyl 4 mg, comprimé que vous nauriez dû

En cas de prise d'une dose excessive,appelez immédiatement votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Coltramyl 4 mg, comprimé est susceptible d'entraîner des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Très rares réactions allergiques, telles que urticaire, œdème de la face et exceptionnellement choc anaphylactique.
- Très rares réactions cutanées, telles que démangeaisons, érythème, éruptions et exceptionnellement éruptions avec vésicules ou bulles.
- Rares troubles digestifs : diarrhée, douleurs d'estomac, nausées et vomissements (voir rubrique « Faites attention avec Coltramyl 4 mg, comprimé »).
- Très rares cas de somnolence, exceptionnel cas de convulsion ou de récidive de crise chez les patients épileptiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER COLTRAMYL 4 mg, comprimé

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Coltramyl 4 mg, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Que contient Coltramyl 4 mg, comprimé ?

La substance active est :

Thiocolchicoside 4,00 mg pour un comprimé.

Les autres composants sont :

Amidon de pomme de terre, gélatine, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, saccharose, talc.

Qu'est-ce que Coltramyl 4 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés. Boîte de 12.

Titulaire et exploitant

sanofi-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris – France

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
56, route de Choisy au Bac
60205 Compiègne – France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Janvier 2012