

corticétine®

framycétine, dexaméthasone

FORMES ET PRÉSENTATIONS

Solution auriculaire. Flacon de lyophilisat + ampoule de solvant de 5 ml.

COMPOSITION

Après reconstitution :	p. 100 ml	p. flacon
Framycétine (DCI) sulfate	1 g	50 mg
Dexaméthasone (DCI) phosphate disodique	100 mg	5 mg

Excipient : glycocolle, hydroxyde de sodium, eau distillée.

Conservateurs : parahydroxybenzoate de propyle (14 mg/100 ml), para-hydroxybenzoate de méthyle (26 mg/100 ml).

PROPRIÉTÉS

Antibiotique et anti-inflammatoire local.

- Dexaméthasone : anti-inflammatoire.

- Framycétine (famille des aminosides) : antibiotique à activité bactéricide sur : cocci Gram + (staphylocoques), bacilles Gram - plus particulièrement Haemophilus influenzae ; espèces inconstamment sensibles : pseudomonas ; espèces habituellement résistantes : streptocoques dont les pneumocoques.

SORT DU MÉDICAMENT

Pas de passage systémique sauf en cas de brèche tympanique (cf. Mises en garde).

INDICATIONS

- Otites moyennes aiguës incisées.
- Otites externes diffuses à tympan fermé, d'accompagnement, écrématisées, surinfectées.

CONTRE-INDICATIONS

- Destruction tympanique d'origine traumatique ou infectieuse (cf. Mises en garde).
- Hypersensibilité à l'un des constituants.

MISES EN GARDE

- Vérifier l'état du tympan avant toute prescription.

- En cas de destruction tympanique, l'administration intra-auriculaire a une action autre que locale au niveau de l'oreille externe et peut provoquer des incidents graves : la mise en contact directe avec l'oreille interne peut être responsable de phénomènes irréversibles d'ototoxicité (surdité, troubles de l'équilibre) en particulier avec les aminosides.
- La présence de corticoïdes n'empêche pas les manifestations cutanées d'allergie à l'antibiotique, mais peut modifier leur expression clinique.
- La sensibilisation cutanée à l'antibiotique peut compromettre l'utilisation ultérieure par voie générale d'un antibiotique antigéniquement apparenté.

EFFETS INDÉSIRABLES

Existence de risques d'ototoxicité vestibulaire ou cochléaire lors d'instillations, en cas de tympan ouvert.

Avec la framycétine, l'allergie peut être croisée avec les autres antibiotiques de la famille des aminosides.

Manifestations allergiques locales mineures dues à la framycétine.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

En bains d'oreilles biquotidiens de quelques minutes.

La durée du traitement usuel ne doit pas excéder 10 jours. Au-delà la conduite à tenir doit être réévaluée.

En règle générale, il est recommandé de ne pas utiliser sous pression.

DURÉE DE STABILITÉ

30 jours après ouverture du flacon.

LISTE I. VISA NL 3539 (1966) - Mis sur le marché en 1968.

Prix : 8,80 F (flacon de 5 ml) - Remb. Séc. Soc. à 40% - Collect.

corticétine fs1-491 export



LABORATOIRE
CHAUVIN

Laboratoire CHAUVIN SA
Parc Euromédécine B.P. 1174 34009 Montpellier Cedex 1
Information médicale Tél. : 67.63.4113