

cortancyl 5 mg

(prednisone) comprimés

composition

| | | |
|------------------|-------|------------|
| Prednisone | | 5 mg |
| Excipient q.s.p. | | 1 comprimé |

présentation

Comprimés blancs, biconvexes.
Boîte de 30 comprimés.

indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde.

Ce médicament est préconisé dans certaines affections ou maladies où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- infections à bactéries ou champignons lorsqu'elles ne sont pas traitées par antibiotique ou antimycosique,
- maladies dues à des virus (herpès, zona, hépatites ...),
- goutte,
- ulcère digestif en évolution et sans traitement,
- certains troubles mentaux,
- certaines cirrhoses.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

mise en garde

- Il est conseillé de suivre un régime riche en protéine et en calcium et pauvre en sucre.
- Prévenir votre médecin de toute autre maladie, surtout en cas d'hypertension artérielle, de diabète, d'ostéoporose, d'ulcère digestif (estomac, intestin, colon) récent ou ancien, d'insuffisance rénale.
- Sportifs attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles antidopages.

précautions d'emploi

- La corticothérapie nécessite de diminuer l'apport de sel dans l'alimentation, voire de le supprimer.
- Ne jamais arrêter brutalement le traitement mais diminuer progressivement les doses avant l'arrêt complet en suivant la prescription de votre médecin.
- Prévenir votre médecin en cas de grossesse ou si vous allaitez.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, en particulier : certains médicaments pour le cœur, l'aspirine, les anticoagulants, les antidiabétiques, certains antibiotiques, les diurétiques hypokaliémants, certains antiépileptiques
NE JAMAIS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.

autres effets possibles du médicament

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS ; NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

posologie et mode d'administration

- Toujours absorber les comprimés au cours des repas, de préférence en une prise le matin.

- La posologie doit être adaptée à chaque sujet en fonction du diagnostic.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

conditions de livraison

CE MÉDICAMENT EST INSCRIT SUR LA LISTE I.

VOTRE PHARMACIEN NE POURRA VOUS EN DÉLIVRER QUE SUR UNE NOUVELLE ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE:

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE RÉUTILISER SANS AVIS MÉDICAL
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

durée de stabilité

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUÉE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE.