

موبيك

أقراص 7.5 مجم و 15 مجم

ميلوكتسيكام

يرجى قراءة هذه النشرة كاملةً بعناية قبل أن تبدأ في تناول هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات هامةً بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة؛ فقد تحتاج إلى قرائتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، فاستشير طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.
- تم وصف هذا الدواء لك وحده، لا تعطه لآخرين؛ فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يعانون من نفس علامات المرض التي تعاني منها.
- إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، فتحثث إلى طبيبك. ويشمل ذلك أية آثار جانبية محتملة، غير المدرجة في هذه النشرة.
- انظر أيضاً نهاية قسم 4.

محتويات هذه النشرة:

1. ما هو عقار موبيك؟ وفيما يستخدم؟
2. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار موبيك
3. كيفية تناول أقراص عقار موبيك
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين عقار موبيك
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو عقار موبيك؟ وفيما يستخدم؟

يحتوي عقار موبيك على المادة الفعالة ميلوكسيكام. ينتمي ميلوكسيكام إلى مجموعة من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي تستخدم للحد من الالتهاب وألم المفاصل والعضلات.
تُستخدم أقراص عقار موبيك في البالغين والأطفال بعمر 16 عاماً فأكثر.

تُستخدم أقراص عقار موبيك للأغراض الآتية:

- لعلاج حالات احتدام التهاب المفاصل على المدى القصير
- لعلاج الآتي على المدى الطويل:
 - التهاب المفاصل الروماتوидي.
 - التهاب الفقار اللاصق

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار موبيك

لا تتناول أقراص عقار موبيك في الحالات الآتية:

- إذا كانت لديك حساسية تجاه ميلوكسيكام أو أي مكونات أخرى بهذا الدواء (المدرجة في القسم 6).
- خلال آخر 3 أشهر من فترة الحمل
- الأطفال والمراهقون (تحت سن 16 عاماً)
- إذا كنت تعاني من حساسية (فرط حساسية) تجاه حمض أسيتيل الساليسيليك أو غيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو إذا عانيت من أيٍّ من العلامات التالية بعد تناول حمض أسيتيل الساليسيليك أو غيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية:
 - أزيز بالصدر، ضيق بالصدر، ضيق التنفس (الربو).
 - انسداد الأنف بسبب تورم بطانة الأنف (السَّلَالِيَنُ الأَنْفِيَة).
 - طفح جلدي/شُرى القرacs (أرتكاريا).
- تورم مفاجئ للجلد أو الأغشية المخاطية مثل: التورم حول العينين والوجه والشفاه والفم أو الحلق، مما قد

- يجعل التنفس صعباً (وذمة وعائية عصبية).
- بعد علاج سابق بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية وتاريخ مرضي سابق من نزيف في المعدة أو الأمعاء.
- فتحات (تقوب) في المعدة أو الأمعاء.
- قرح أو نزيف في المعدة أو الأمعاء.
- تاريخ مرضي سابق أو حديث بالإصابة بالقرح المعدية أو القرح الهضمية أو النزيف (حدوث تقرح أو نزيف على الأقل مرتين).
- قصور شديد بوظائف الكبد.
- الفشل الكلوي الشديد دون الغسيل الكلوي.
- نزيف حديث بالمخ (نزيف دماغي وعائي).
- أي نوع من اضطرابات النزيف.
- فشل القلب الشديد.
- عدم تحمل لبعض السكريات؛ إذ قد يحتوي هذا المنتج على اللاكتوز (انظر أيضاً: "يحتوي عقار موبيك على سكر اللبن (اللاكتوز)").

إذا لم تكن متاكداً مما إذا كان ينطبق عليك أيٌّ مما سبق، فيرجى الاتصال بالطبيب الخاص بك.

تحذيرات واحتياطات

تحذر إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول عقار **موبيك**.

التحذيرات

قد ترتبط أدوية مثل عقار **موبيك** بزيادة ضئيلة في خطر الإصابة بالنوبة القلبية (احتشاء عضلة القلب) أو السكتة الدماغية. تحدث أي من هذه المخاطر بشكل أكبر مع الجرعات المرتفعة والعلاج المطول. لا تتناول أكثر من الجرعة الموصى بها لحالتك. لا تستخدم عقار **موبيك** لفترات أطول مما تم وصفه لك (انظر قسم 3: "كيف تستخدم عقار **موبيك**؟").

إذا كنت تعاني من مشاكل بالقلب، أو سكتة دماغية سابقة، أو كنت تعتقد أنك قد تكون معرضاً لخطر الإصابة بهذه الحالات، يجب مناقشة العلاج الخاص بك مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كنت:

- تعاني من ارتفاع ضغط الدم.
- تعاني من ارتفاع مستويات السُّكر في الدم (مرض السكري).
- تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم (فرط كوليسترول الدم).
- كنت مدخناً.

مثله مثل كافة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، قد يسبب عقار **موبيك** تفاعلات خطيرة بالمعدة والأمعاء، مثل نزيف، قرح وتقوب في جدار الأمعاء (انتقاب)، قد تؤدي إلى الوفاة، خاصةً في كبار السن.
توقف فوراً عن تناول عقار **موبيك** وأخبر طبيبك.

أوقف العلاج بعقار **موبيك** على الفور بمجرد ملاحظتك لحدوث نزيف (مما يسبب برازاً بلون القطران) أو تقرح الجهاز الهضمي (ما يسبب ألم في البطن).

تم الإبلاغ عن حدوث طفح جلدي قد يهدد الحياة (متلازمة ستيفنز جونسون، انحلال البشرة النخرية السُّمّيَّ) عند استخدام عقار **موبيك**، يظهر في البداية على شكل بقع حمراء شبيهة بالهدف أو بقع دائريَّة غالباً مع ظهور بثور مركزية على الجزء. تشمل العلامات الإضافية التي يمكنك البحث عنها: القرح بالفم والحلق والأنف والأعضاء التناسلية والتهاب الملتحمة (احمرار وتورم بالعينين). هذا الطفح الجلدي الذي قد يهدد الحياة غالباً يكون مصحوباً بأعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا. قد يتتطور الطفح الجلدي إلى ظهور بثور على نطاق واسع أو نقشر الجلد.

تكون أكثر مخاطر تفاعلات الجلد الخطيرة حدوثاً خلال الأسابيع الأولى من العلاج. إذا كنت قد أصبحت بمتلازمة ستيفنز جونسون أو انحلال البشرة النخرية السُّمّيَّ مع استخدام عقار **موبيك**، فيجب عليك عدم استئناف العلاج بعقار **موبيك** في أي وقت.

إذا أصبحت بطفح جلدي أو أعراض الجلد هذه، فتوقف عن تناول عقار **موبيك**، واطلب المشورة العاجلة من الطبيب وأخبره بأنك تتناول هذا الدواء.

عقار موبيك غير مناسب للاستخدام في حالة الحاجة إلى تخفيف فوري للألم الحاد.

قد يخفي عقار موبيك أعراض العدوى (على سبيل المثال: الحمى). يجب عليك زيارة طبيبك على الفور إذا كنت تعتقد بأنك مصاب بعدوى.

احتياطات الاستخدام

بما أنه سيكون من الضروري ضبط العلاج، فمن المهم أن تستشير الطبيب قبل تلقي عقار موبيك في حالة وجود:

- تاريخ مرضي سابق بالإصابة بالتهاب المريء، أو التهاب المعدة أو تاريخ سابق لأي مرض آخر في الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.
- ارتفاع ضغط الدم
- السن المتقدم
- أمراض القلب، أو الكبد أو الكلية
- ارتفاع مستويات السكر في الدم (مرض السكري)
- انخفاض حجم الدم (نقص حجم الدم) الذي قد يحدث إذا كنت تعاني من فقدان الدم الخطير أو حرق، والجراحة أو انخفاض في شرب السوائل
- في حال شخصك طبيبك بعدم تحمل بعض أنواع السكريات؛ إذ يحتوي هذا المنتج على اللاكتوز
- ارتفاع بوتاسيوم الدم سبق تشخيصه من قبل الطبيب

سيحتاج طبيبك أن يراقب تقدم حالتك أثناء العلاج.

استخدام أدوية أخرى مع عقار موبيك

نظرًا لأن عقار موبيك يمكن أن يؤثر أو يتأثر بالأدوية الأخرى، فيرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تناولت أيَّةً أدويةً أخرى.

على وجه الخصوص، أخير الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول/ قد تناولت، أو تستخدم أيًّا مما يلي:

- مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى
- أملأح البوتاسيوم - تُستخدم لمنع انخفاض مستويات البوتاسيوم بالدم أو لعلاجه
- تاكروليموس - يستخدم بعد الخضوع لعملية زرعأعضاء
- تريميثوبريم - يستخدم في علاج عدوى المسالك البولية
- الأدوية التي تمنع تجلط الدم
- الأدوية التي تقوم بتكسير الجلطات الدموية (الأدوية المذيبة للجلطات)
- الأدوية التي تستخدم لعلاج أمراض القلب والكلى
- الكورتيكosteroidات (مثل تلك المستخدمة لعلاج الالتهابات وتفاعلات الحساسية)
- سيلكلوسيورين - يستخدم بعد زرع الأعضاء، أو في الحالات الجلدية الشديدة، والتهاب المفاصل الروماتويدي أو المتنلازمة الكلائية
- ديفيراسيروكس - يستخدم لعلاج التحميل المفرط بالحديد المزمن الناجم عن عمليات نقل الدم المتكررة
- إذا كنت تتناول مدرات البول، فيُنصح طبيبك بمراقبة وظائف الكلى لديك.
- الأدوية التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثل حاصرات بيتا).
- ليثيوم - يستخدم في علاج بعض الاضطرابات المزاجية.
- مثبطة إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) - تُستخدم في علاج الاكتئاب.
- ميثوتريكسات - تستخدم لعلاج الأورام أو الحالات الجلدية الشديدة غير المتحكم فيها والتهاب المفاصل الروماتويدي الناشط.
- بيميتريكسيد - يستخدم في علاج السرطان
- كولستيرامين - يستخدم لخفض مستويات الكوليسترول.
- الأدوية المضادة لمرض السكري التي يتم تناولها عن طريق الفم (سلفونيل يوريا، ناتيجلينيد) - تُستخدم في علاج مرض السكري. ينبغي أن يراقب طبيبك مستويات السكر بالدم لديك بعناية تحسيناً لانخفاض السكر بالدم.

الحمل والرَّضاعة الطبيعية والخصوصية

إذا كنت حاملاً أو مريضاً، أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لذلك، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول هذا الدواء.

الحمل

خلال الثلث الأول والثاني من الحمل، لن يصف طبيبك هذا الدواء إلا إذا كان ضروريًا نظرًا لوجود خطر محتمل لا وهو حدوث إجهاض أو تشوهات. في هذه الحالة، ينبغي قدر الإمكان إيقاف الجرعة منخفضة ومدة العلاج قصيرة.

- خلال آخر 3 أشهر من فترة الحمل. يجب لا تتناوليني هذا الدواء أبداً، فقد يكون له آثار شديدة أو حتى مميتة على جنينك/طفلك، خاصةً على قلبك، رئتيه و/أو كليتيه، حتى وإن كان سيتم تناوله مرة واحدة. إذا تناولت هذا الدواء بينما كنت حاملاً، يجب عليك التحدث إلى طبيبك/القابلة الخاصة بك على الفور حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار مراقبة حالتك كما ينبغي.

الرَّضاعة الطبيعية

لا يوصى باستخدام هذا المنتج أثناء الرضاعة الطبيعية.

الخصوصية

قد يجعل عقار موبيك حدوث الحمل أكثر صعوبة. يجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تخططين للحمل أو إذا كان لديك مشاكل في أن تصبحي حاملاً.

القيادة واستخدام الآلات

قد تحدث اضطرابات بصرية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية أو الدوخة أو الدوار أو اضطرابات الجهاز العصبي المركزي الأخرى مع هذا المنتج. إذا أصبت بذلك، فتجنب القيادة أو تشغيل الآلات.

تحتوي أقراص عقار موبيك على سكر اللبن (اللاكتوز).

إذا كان طبيبك قد أخبرك بأنك لا تتحمل بعض أنواع السكريات، فاتصل به قبل تناول هذا الدواء.

3. كيفية تناول أقراص عقار موبيك

تناول دائمًا هذا الدواء كما أخبرك طبيبك بالضبط. راجع طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متاكداً من كيفية الاستخدام.

الجرعة الموصى بها من عقار موبيك 7.5 مجم هي:

حالات احتمام التهاب المفاصل:

7.5 مجم (قرص واحد) مرأة واحدة يومياً. قد تتم زيادة هذه الجرعة لتبلغ 15 مجم (قرصين) مرأة واحدة يومياً.

التهاب المفاصل الروماتويدي
15 مجم (قرصين) مرأة واحدة يومياً. قد يتم خفض هذه الجرعة لتبلغ 7.5 مجم (قرص واحد) مرأة واحدة يومياً.

التهاب الغضار اللاصق
15 مجم (قرصين) مرأة واحدة يومياً. قد يتم خفض هذه الجرعة لتبلغ 7.5 مجم (قرص واحد) مرأة واحدة يومياً.

الجرعة الموصى بها من عقار موبيك 15 مجم هي:

حالات احتمام التهاب المفاصل:

7.5 مجم (نصف قرص) مرأة واحدة يومياً. قد تتم زيادة هذه الجرعة لتبلغ 15 مجم (قرص واحد) مرأة واحدة يومياً.

التهاب المفاصل الروماتويدي
15 مجم (قرص واحد) مرأة واحدة يومياً. قد يتم خفض هذه الجرعة لتبلغ 7.5 مجم (نصف قرص) مرأة واحدة يومياً.

التهاب الفقار اللاصق

15 مجم (قرص واحد) مرة واحدة يومياً. قد يتم خفض هذه الجرعة لتبلغ 7.5 مجم (نصف قرص) مرة واحدة يومياً.

لا تتجاوز الجرعة القصوى الموصى بها البالغة 15 مجم في اليوم.

إذا انطبق عليك أيٌّ مما هو مدرج تحت العنوان: "تحذيرات واحتياطات"، فقد يقوم طبيبك بتقليل جرعتك إلى 7.5 مجم مرة واحدة يومياً.

المرضى من كبار السن

إذا كنت من كبار السن، تبلغ الجرعة الموصى بها فيما يخص علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار اللاصق طویل الأمد 7.5 مجم (قرص واحد من عقار موبيك 7.5 مجم أو نصف قرص من عقار موبيك 15 مجم) في اليوم.

المرضى من لديهم مخاطر متزايدة للتعرض لتفاعلات عكسية

إذا كنت أحد المرضى من لديهم مخاطر متزايدة للتعرض لتفاعلات عكسية، سبباً طبيبك العلاج بجرعة قدرها 7.5 مجم (قرص واحد من عقار موبيك 7.5 مجم أو نصف قرص من عقار موبيك 15 مجم) في اليوم.

قصور وظائف الكلى

إذا كنت أحد مرضى الغسيل الكلوى من يعانون من قصور شديد بوظائف الكلى، ينبغي ألا تتجاوز جرعتك 7.5 مجم (قرص واحد من عقار موبيك 7.5 مجم أو نصف قرص من عقار موبيك 15 مجم) في اليوم. لا يلزم ضبط الجرعة للمرضى المصابين بقصور خفيف إلى معتدل في وظائف الكلى.

قصور وظائف الكبد

لا يلزم تعديل الجرعة في المرضى المصابين بقصور كبدي خفيف إلى معتدل.

الاستعمال في الأطفال والمرأهقين

لا يجب إعطاء عقار موبيك للأطفال والمرأهقين الأقل من 16 سنة.

إذا شعرت أن تأثير عقار موبيك أقوى من اللازم أو أقل من اللازم، أو إذا لم تشعر بعد عدة أيام بأي تحسُّن في حالتك، فتحتَّث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

طريقة التناول

يتم استخدامه عن طريق الفم.
ينبغي ابتلاع الأقراص مع الماء أو غيره من المشروبات، أثناء تناول إحدى الوجبات.

يوجد خط التحذير في **عقار موبيك 7.5 مجم** فقط لمساعدتك على كسر القرص إذا كنت تواجه صعوبة في ابتلاعه كاملاً. يمكن تقسيم قرص عقار موبيك 15 مجم إلى جرعات متساوية. ينبغي تقسيم الأقراص باليد وليس باستخدام أدلة حادة (على سبيل المثال: سكين).

إذا تناولت كمية من موبيك أقراص مختلفة بالسكر أكثر مما يجب

سواء استخدمت كمية كبيرة جداً من أقراص أو تشك في أنه استخدمت جرعة زائدة، اتصل بطبيبك أو اذهب إلى أقرب مستشفى على الفور.

تفتقر الأعراض الناتجة عن جرعة زائدة شديدة من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عادة على:

- نقص الطاقة (الخمول)
- نعاس
- شعوراً بالإعياء (الغثيان)، أو القيء
- ألم في منطقة المعدة (ألم في فم المعدة)

تحسن هذه الأعراض بشكل عام عند التوقف عن استخدام عقار موبيك. قد تُعاني من نزيف بالمعدة أو الأمعاء (نزيف معدوي).
.

التسمم الحاد قد يؤدي إلى تفاعل خطير (انظر قسم: 4):

- ارتفاع ضغط الدم
- فشل كلوي حاد
- اختلال وظائف الكبد
- خفف/تسطح أو تثبيط التنفس (كبت الجهاز التنفسي)
- فقدان الوعي (الغيبوبة)
- نوبات تشنجية (تشنجات)
- هبوط في الدورة الدموية (وهنّ قلبيّ وعائيّ)
- توقف القلب (السكتة القلبية)
- تفاعلات الحساسية (فرط الحساسية) السريعة بما في ذلك:
 - إغماء
 - ضيق النفس
 - التفاعلات الجلدية.

إذا نسيت تناول عقار موبيك

لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة أغفلتها. تناول الجرعة التالية في الموعد المعتاد.

إذا كانت لديك أيّة أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدّواء، فاستشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثله مثل كافة الأدوية، قد يُسبب هذا الدّواء آثاراً جانبية، على الرّغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

توقف عن استخدام عقار موبيك واستشر الطبيب أو أقرب مستشفى لك على الفور إذا لاحظت:

- أي تفاعلات حساسية (فرط الحساسية)، والتي قد تظهر في شكل:
 - تفاعلات بالجلد، مثل: حكة أو بثور بالجلد أو نقشر الجلد، والتي يمكن أن تكون (طفحاً جلديًّا قد يكون مهدداً للحياة) (متلازمة ستيفنز جونسون وإنحلال البشرة التخري التّسمميّ)، أو إصابات بالأنسجة الرّخوة (إصابات بالأغشية المخاطية) أو أحمراراً متعدد الأشكال (انظر القسم: 2).
 - الأحمرار متعدد الأشكال هو تفاعل حساسية جلدية خطيرة يُسبب بقعًا أو كدمات حمراء أو أرجوانية أو مناطق بثور. يمكن أن تؤثر أيضًا على الفم والعينين وغيرها من أسطح الجسم الراطبة.
 - تورم في الجلد أو الغشاء المخاطي، مثل تورم حول العينين والوجه والشفاه أو الفم أو الحلق، وقد يجعل التنفس صعباً، تورم الكاحلين أو الساقين (الوذمة في الأطراف السفلية).
 - ضيق النفس أو نوبات الربو.
 - التهاب الكبد. قد يؤدي ذلك إلى **أعراض مثل:**
 - إصفرار الجلد أو مقلة العين (يرقان)
 - ألم في البطن
 - فقدان الشهية

أي آثار جانبية بالجهاز الهضمي، خاصةً:

- النزيف (يتوج عنها براز بلون القطران)
- تقرح في الجهاز الهضمي (مما يسبب ألمًا في البطن)

نزيف الجهاز الهضمي (نزيف بالمعدة والأمعاء)، تكون تقرحات أو ثقب في الجهاز الهضمي والذي قد يكون أحياناً شديداً، وقد يؤدي إلى الوفاة، وخاصة في كبار السن.

إذا عانيت من قبل من أي أعراض خاصةً بالجهاز الهضمي بسبب الاستخدام طويلاً للأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية، فاطلب المشورة الطبية على الفور، خاصةً إذا كنت من المرضى كبار السن. قد يرافق طبیبك تقدم حالتك أثناء العلاج.

إذا تعرضت لاضطرابات بصرية، فتجنب القيادة أو تشغيل الآلات.

الأثار الجانبية العامة للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية

قد يُصاحب استخدام بعض الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية ارتفاع طفيف في نسبة خطورة الإصابة بانسداد الأوعية السريانية (أحداث شريانية خُثُرية)، على سبيل المثال: نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو سكتة دماغية، بشكل خاص عند استخدام جرعات مرتفعة والعلاج طويلاً للأدوية.

تم الإبلاغ عن حدوث احتباس السوائل (وذمة) وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب (الفشل القلبي) بمحاجبة العلاج بالأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

الأثار الجانبية الأكثر شيوعاً التي تم ملاحظتها (أحداث متعلقة بالجهاز الهضمي):

- قرح بالمعدة والجزء الغلوبي من الأمعاء الدقيقة (قرح هضمية/معدية إثنا عشرية)
- ثقب في جدار الأمعاء أو نزيف الجهاز الهضمي (قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، وخاصةً في كبار السن)

تم الإبلاغ عن الأثار الجانبية التالية بعد تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية:

- شعور بالإعياء (الغثيان)، أو القيء
- براز لين (الإسهال)
- انفاس بالبطن
- إمساك
- عسر الهضم
- ألم في البطن
- براز بلون القطران بسبب نزيف الجهاز الهضمي (براز مدمم)
- قيء دموي
- التهاب مع تكون تقرحات في الفم (التهاب الفم التقرحي)
- تفاقم التهاب الجهاز الهضمي (على سبيل المثال: تفاقم التهاب القولون أو مرض كرون).

تم ملاحظة حدوث التهاب بالمعدة بشكل أقل تكراراً.

الأعراض الجانبية لميلوكسيكام - المادة الفعالة في عقار موبيك

شائعة جداً: قد تؤثر في أكثر من 1 من كل 10 أشخاص.

- آثار جانبية متعلقة بالجهاز الهضمي مثل: عسر الهضم، شعور بالإعياء (الغثيان)، أو الإعياء.

شائعة: شائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 10 أشخاص):

- صداع

غير شائعة: تؤثر في مريض واحد إلى 10 في كل 100 مريض:

دوخة (شعور بخفة الرأس)

شعور بالدوخة أو الدوار (الدوار)

نومية (نعاس)

فقر الدم (انخفاض تركيز صبغة الدم الحمراء، الهيموجلوبين)

ارتفاع ضغط الدم

احمرار الجلد (احمرار مؤقت بالوجه والرقبة)

احتباس الماء والصوديوم

ارتفاع مستويات البوتاسيوم بالدم (فرط بوتاسيوم الدم) يمكن أن يؤدي هذا إلى أعراض مثل:

- تغيرات في دقات قلبك (اضطرابات النظم القلبي)

- خفقان (عندما تشعر بأن قلبك يدق أكثر من المعتاد)
- ضعف العضلات
- تجشؤ
- التهاب المعدة
- نزيف الجهاز الهضمي
- التهاب الفم
- تفاعلات حساسية (فرط حساسية) فورية
- حكة
- الطفح الجلدي
- التورم الناجم عن احتباس السوائل (الوذمة)، بما في ذلك، تورم الكاحلين/ الساقين (وذمة بالأطراف السفلية)
- تورم مفاجئ للجلد أو الأغشية المخاطية مثل: التورم حول العينين والوجه والشفاه والفم أو الحلق، مما قد يجعل التنفس صعباً (وذمة وعائية عصبية).
- اضطرابات مؤقتة في اختبارات وظائف الكبد (مثل ارتفاع مستوى الإنزيمات الكبدية مثل الناقلات الأمينية أو ارتفاع في مستوى البيليروبين، صبغة الموجودة في العصارة الصفراوية). يمكن لطبيبك الكشف عن هذه الاضطرابات باستخدام اختبار الدم.
- وجود اضطرابات في نتائج الاختبارات المعملية التي تفحص وظائف الكلى (على سبيل المثال: ارتفاع مستوى الكرياتينين أو البورياء)

نادرة (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 1000 شخص):
اضطرابات الحالة المزاجية

كوابيس

تعدد الدم غير الطبيعي، بما في ذلك:

تعدد الدم التفريقي غير الطبيعي

انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (قلة خلايا الدم البيضاء)

انخفاض عدد صفائح الدم (قلة الصفائح الدموية)

قد تؤدي هذه الآثار الجانبية إلى ارتفاع نسبة خطورة الإصابة بعدها وأعراض مثل التكتم أو نزيف الأنف.

رنين بالأذن (طنين بالأذن)

الشعور بدقات قلب (خفقان)

فرح بالمعدة أو الجزء الغلوي من الأمعاء الدقيقة (فرح هضمية/ معدية إثنا عشرية)

التهاب المريء

حدوث نوبات الربو (يظهر في الأشخاص المصابين بحساسية للأسيرين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى)

نفطات شديدة بالجلد أو تفترس الجلد (متلازمة ستيفنز جونسون وانحلال البشرة النخري التّسمّي)

طفح القرacas (أرتكاريا)

اضطرابات بصيرية بما في ذلك:

عدم وضوح الرؤية

التهاب المُلتَحِمَة (التهاب مقلة العين أو الجفون)

التهاب الأمعاء الغليظة (التهاب القولون).

نادرة جدًا (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 10000 شخص):

تفاعلات جلدية ينجم عنها ظهور نفطات (تفاعلات فقاعية) واحمرار متعدد الأشكال.

يُعد الاحمرار متعدد الأشكال تفاعل حساسية جلدية خطير مما يسبب بقعًا حمراء أو أرجوانية أو مناطق بثور. يمكن أن

تؤثر أيضًا على الفم والعينين وغيرها من أسطح الجسم الرطبة.

التهاب الكبد قد يؤدي ذلك إلى أعراض مثل:

إصفار الجلد أو مقل العيون (يرقان)

ألم بالبطن

فقدان الشهية

فشل حاد بالكلى (فشل كلوبي) خاصٌّ في المرضى الذين لديهم عوامل خطورة مثل: أمراض القلب أو مرض السكري أو

أمراض الكلى.

ثقب في جدار الأمعاء (انثقاب)

غير معروفة: لا يمكن تقدير معدل التكرار من واقع البيانات المتاحة

- ارتباك.
- توهان.
- ضيق النفس وتفاعلات الجلد (تفاعلات تأقية/ تأقانية) وطفح ناجم عن التعرض لأشعة الشمس (تفاعلات حساسية للضوء)
- تم الإبلاغ عن الإصابة بفشل القلب (الفشل القلبي) بمحاجبة العلاج بالأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية
- فقدان كامل لأنواع محددة من خلايا الدم البيضاء (ندرة المحببات)، وبخاصة في المرضى الذين يستخدمون عقار موبيك جنباً إلى جنب مع العاقير الآخر الذي يتحمل أن تكون مثبطة، مخدمة أو مدمرة لأحد مكونات نخاع العظام (الأدوية السامة للنخاع العظمي). قد يُسبب هذا:

 - حمى مفاجئة
 - التهاب الحلق
 - العدوى
 - التهاب البنكرياس
 - العقم في السيدات، تأخر التبويض

الآثار الجانبية الناجمة عن الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، لكنها لم تظهر حتى الآن بعد استخدام عقار موبيك

تغيرات في بنية الكلى تؤدي إلى الفشل الكلوي الحاد:

- حالات نادرة جدًا من التهاب الكلى (التهاب الكلية الخلالي)
- موت بعض الخلايا داخل الكلى (نخر أنبوبى أو حليمي حاد)
- وجود بروتينات بالبول (متلازمة كلائية مصحوبة ببيلة بروتينية)

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. بما في ذلك أية آثار جانبية محتملة، غير المدرجة في هذه النشرة. بإبلاغك عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول أمان استخدام هذا الدواء.

5. كيفية تخزين عقار موبيك

تحفظ أقراص عقار موبيك في مكان آمن.

لا يُخزن في درجة حرارة تتعذر 30 درجة مئوية.

يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال.

لا تُستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الشريط والعبوة الكرتونية الخارجية. يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب التخزين داخل العبوة الأصلية للحماية من الرطوبة.

لا تخلص من الأدوية عن طريق إلقائها في مياه الصرف أو مع المخلفات المنزلية. استشر الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ما هي محتويات عقار موبيك:

المادة الفعالة هي:

- ميلوكسيكام
- يحتوي القرص الواحد من أقراص عقار موبيك 7.5 مجم على 7.5 مجم من ميلوكسيكام.
- يحتوي القرص الواحد من أقراص عقار موبيك 15 مجم على 15 مجم من ميلوكسيكام.

- المكونات الأخرى هي:
- سترات الصوديوم
 - لاكتوز أحدى الهيدرات
 - سيليلوز دقيق التبلور
 - بوفيدون
 - سيليكا غروية لا مائية
 - كروسبيوفيدون
 - ستيرات الماغنيسيوم

ما هو شكل عقار موبيك؟ وما هي محتويات العبوة؟

أقراص عقار موبيك 7.5 مجم هي أقراص دائيرية ذات لون أصفر فاتح، على أحد جانبيها شعار الشركة ويُوجَد "D/59D59" على الجانب الآخر. كل قرص من أقراص عقار موبيك 7.5 مجم به خط تقسيم. خط التقسيم هو لتسهيل كسرها؛ ليسهل بلعها وليس لنقسيمهما إلى جرعات متساوية.

أقراص عقار موبيك 15 مجم هي أقراص دائيرية ذات لون أصفر فاتح، على أحد جانبيها شعار الشركة ويُوجَد "C/77C77" على الجانب الآخر. كل قرص من أقراص عقار موبيك 15 مجم به خط تقسيم ويمكن تقسيمه إلى نصفين متساوين. تتوافر أقراص عقار موبيك 15 مجم في شرائط من بولي فينيل الكلوريد/بولي فينيلidين الكلوريد/الألومنيوم.

أحجام العبوة:

عقار موبيك 7.5 مجم عبوات بها قرص واحد، قرصين، 7، 10، 14، 15، 20، 28، 30، 50، 60، 100، 140، 280، 300 قرص.
500

عقار موبيك 15 مجم عبوات بها قرص واحد، قرصين، 7، 10، 14، 15، 20، 28، 30، 50، 60، 100، 140، 280، 300 قرص.
500 1000

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

طرق أخرى لاستخدام ميلوكسيكام
يتوافر ميلوكسيكام في بعض الدول على هيئة:

- ميلوكسيكام أقماع 7.5 مجم
- ميلوكسيكام أقماع 15 مجم
- ميلوكسيكام 15 مجم لكل 1.5 مللي لتر محلول للحقن.

مالك حق التسويق وجهة التصنيع

مالك حق التسويق:

شركة بوهرينجر إنجلهaim إنترناشونال المحدودة
173 شارع بنجر
55216 دإنجلهaim أيه إم راين
المانيا

جهة التصنيع:

بوهرينجر إنجلهaim فارما المحدودة وشركاؤها، شراكة محدودة
173 شارع بنجر
55216 دإنجلهaim أيه إم راين
المانيا

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في يوليو 2018.

هذا منتج دوائي

- الدواء منتج يؤثر على صحتك ويُعد استعماله بطريقة مخالفة للتعليمات خطراً عليك.
- اتبع وصفة الطبيب بشكل صارم وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي باعك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما خبران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا تقطع فترة العلاج الموصوفة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر الوصفة الطبية دون استشارة طبيبك.
- احفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيادلة العرب