NÉO·CODION®

SIROP ENFANTS

COMPOSITION

Camphosulfonate de codéine ..... 0,1098 g
(Quantité correspondante en codéine base : 0,0657 g)
Benzoate de sodium ..... 1,22 g
Excipient : acide ascorbique, sirop d'Ipécacuanha composé, sirop de baume de Tolu, gallate de propyle, parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), arôme orange, arôme mandarine, arôme fraise, vanilline, solution de saccharose, solution concentrée d'hydroxyde de sodium, eau purifiée, q.s.p. 100 ml. Degré alcoolique : 1,5° - Flacon de 125 ml de sirop.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Ce médicament contient un antitussif. Il est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez l'enfant de plus de 13 kg (soit environ 30 mois).

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :
■ antécédent d'allergie à l'un des constituants ■ toux chez l'asthmatique ■ en cas d'insuffisance respiratoire ■ allaitement ■ enfant de moins de 30 mois.
Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ en association avec l'alcool.

MISES EN GARDE

Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques. Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, demandez l'avis du médecin. En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

PRÉVENEZ VOTRE MÉDECIN en cas de maladie au long cours du foie.
En cas de diabète ou de régime hypoglucidique (pauvre en sucre), tenir compte de la teneur en saccharose : 0,55 g par ml.
Il conviendra de ne pas associer un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique).

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament contient un antitussif, la codéine. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les posologies maximales conseillées (voir posologie et mode d'administration).
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment avec l'alcool, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

● **Grossesse :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.
● **Allaitement :** Ce médicament passe dans le lait maternel.
De trop fortes doses de codéine administrées chez les femmes qui allaitent peuvent entraîner des pauses respiratoires ou des baisses du tonus du nourrisson. En cas d'allaitement, la prise de ce médicament est contre-indiquée.
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

L'attention est appelée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les possibilités de somnolence attachée à l'usage de ce médicament. Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées. Il est préférable de commencer ce traitement le soir.

SPORTIFS : attention, cette spécialité contient une substance pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopages.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale - RÉSERVÉ À L'ENFANT DE PLUS DE 13 KG (SOIT ENVIRON 30 MOIS).
En l'absence d'efficacité, n'augmentez pas les doses au-delà de ce qui est préconisé, ne prenez pas conjointement un autre antitussif, mais consultez votre médecin. Utiliser le gobelet doseur gradué.
La posologie est fonction du poids de votre enfant, soit :
- **enfant de 13 à 20 kg (environ 30 mois à 6 ans) :** 1 mesure graduée à 2,5 ml par prise, à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 4 prises par jour.
- **enfant de 20 à 25 kg (environ 6 à 8 ans) :** 1 mesure graduée à 5 ml par prise, à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 4 prises par jour.
- **enfant de 25 à 40 kg (environ 8 à 12 ans) :** 1 mesure graduée à 10 ml par prise, à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 4 prises par jour.
- **enfant de 40 à 50 kg (environ 12 à 15 ans) :** 1 mesure graduée à 15 ml par prise, à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 4 prises par jour.

En cas d'insuffisance hépatique, consultez votre médecin afin d'adapter la posologie.
Les âges approximatifs en fonction du poids sont donnés à titre indicatif. Les prises doivent être espacées de 6 heures au minimum. Le traitement doit être court (quelques jours). En cas de surdosage, CONSULTER un médecin.

EFFETS INDÉSIRABLES : COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :
Possibilité de : constipation, somnolence, vertige, nausées, vomissements ; Rarement : gêne respiratoire, réactions cutanées.

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MÉDICAMENTS À PORTÉE DE MAIN DES ENFANTS