

OTOFA®

Solution auriculaire Gouttes

COMPOSITION

Rifamycine (DCI) sodique 2,6 g correspondant à 2 millions UI de rifamycine.
Excipients : Macrogol 400, acide ascorbique, édétate de sodium, métabisulfite de potassium (E 224), hydroxyde de lithium, eau q.s.p. 100 ml. Flacon de 10 ml.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Poussées aiguës d'otite (inflammation de l'oreille) chronique : suppurations tympaniques pures.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament **NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ** en cas d'allergie connue à la rifamycine, ou à l'un des composants.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN, AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Adultes : 5 gouttes 3 fois par jour en instillation dans le conduit auditif ou, de préférence, un bain d'oreille de quelques minutes avec la solution pure tiédie, 2 fois par jour.

Enfants : 3 gouttes 3 fois par jour en instillation dans le conduit auditif ou, de préférence, un bain d'oreille de quelques minutes avec la solution pure tiédie, 2 fois par jour. Laisser ensuite la tête penchée pendant quelques minutes.

Éviter tout contact avec les vêtements, la solution pouvant tacher les textiles.

Suivre les indications du médecin traitant.

En règle générale, il est recommandé de ne pas utiliser sous pression.

EFFETS INDÉSIRABLES

Provoque une certaine coloration rose visible lors d'un examen médical de l'oreille à l'aide d'un instrument. En raison de la présence de sulfites, risque de réactions allergiques, y compris réaction allergique généralisée avec une gêne respiratoire.

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres. - Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien. - Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses contre-indications. - N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite. - Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MÉDICAMENTS À PORTEE DE MAIN DES ENFANTS