

# PANFUREX® 200 mg

## nifuroxazide Gélule

### COMPOSITION

Nifuroxazide(DCI) ..... 200 mg  
Excipients : lactose, amidon prégélatinisé, stéarate de magnésium, gélatine, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172) q.s.p. une gélule. Boîte de 28 gélules.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué dans le traitement de la diarrhée aiguë d'origine infectieuse chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Le traitement ne dispense pas de mesures diététiques et d'une réhydratation si elle est nécessaire.

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISE** en cas d' antécédent de réaction allergique aux dérivés du nitrofurane.

### MISES EN GARDE

■ Vous devez consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

- absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement,
- apparition de fièvre, de vomissements,
- présence de sang ou de glaires dans les selles,
- soif intense, sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation, c'est à dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

■ La prise de gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce traitement est un complément des règles diététiques :

- **se réhydrater** par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres);
- **s'alimenter** le temps de la diarrhée : • En excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés • En privilégiant les viandes grillées, le riz.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.*

### GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser le nifuroxazide pendant la grossesse.

L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.

*D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.*

### POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT A PARTIR DE 6 ANS.

Adulte : 4 gélules par jour en 2 à 4 prises

Enfant à partir de 6 ans : 3 à 4 gélules par jour en 2 à 4 prises.

Avalez les gélules à l'aide d'un verre d'eau.

La durée du traitement est limitée à 7 jours.

### EFFETS INDESIRABLES

Possibilité de réactions allergiques.

### CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

**NE LAISSEZ JAMAIS LES MEDICAMENTS A PORTEE DE MAIN DES ENFANTS**