

POLYDEXA®

Solution auriculaire - Gouttes

COMPOSITION

Néomycine (DCI) sulfate	1 g soit 650.000 U
Polymyxine B (DCI) sulfate.....	1.000.000 U
Dexaméthasone (DCI) métasulfobenzoate sodique.....	0,100 g
Excipients: mercurothiolate sodique, acide citrique, hydroxyde de sodium, macrogol 400, polysorbate 80, eau q.s.p. 100 ml. Flacon de 10,5 ml.	

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est utilisé dans le traitement des otites externes à tympan fermé, en particulier en cas d'eczéma infecté du conduit auditif externe.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas :

- de perforation du tympan,
- d'antécédents d'allergie à l'un des constituants.

MISES EN GARDE

Ne pas avaler. Ne pas utiliser sans avis médical. Par mesure de précaution, avant toute administration, il convient de faire vérifier l'intégrité de votre tympan par un médecin. Si le tympan est ouvert, ce médicament peut être à l'origine d'effets indésirables irréversibles au niveau de l'oreille (surdité, troubles de l'équilibre).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

La durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé au cours de la grossesse, ou de l'allaitement, que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin, car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie auriculaire. Se conformer à la prescription de votre médecin.

A titre indicatif :

Adulte : 1 à 5 gouttes, 2 fois par jour.

Enfant : 1 à 2 gouttes, 2 fois par jour.

En règle générale, il est recommandé de ne pas utiliser sous pression.

Ne pas dépasser 10 jours de traitement. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES

- Risque de réactions locales (irritation) et d'allergie liée aux antibiotiques.
- En cas de tympan ouvert, risque de surdité et de troubles de l'équilibre.
- Possibilité de sélection de germes résistants et de développement de mycoses (infections dues à des champignons).

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MEDICAMENTS A PORTEE DE MAIN DES ENFANTS