

DIFRAREL® 100

Comprimés enrobés

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

EXTRAIT ANTHOCYANOSIDIQUE DE VACCINIUM MYRTILLUS 100 mg
BÉTA-CAROTÈNE 5 mg
Excipients : Kieselguhr (diatomite pour onéologie), Sucre glace amylacé, Talc, Amidon de maïs, Stéarate de magnésium, Colophane, Huile essentielle de térébentine type "Pinus pinaster", Gomme laque, Saccharose, Gélatine, Gomme arabique, Dioxyde de titane, Bleu patenté V, Opaglos 6000.

Pour un comprimé enrobé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés enrobés, boîte de 20.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

VASCULOPROTECTEUR

(C: système cardio-vasculaire)

(S: organes sensoriels)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM

68-88 rue Ampère - Z.I. des Chanoux

93330 NEUILLY SUR MARNE

Information médicale : ☎ 01 49 44 29 29

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est indiqué :

- dans les troubles de la circulation veineuse,
- dans la fragilité des petits vaisseaux sanguins,
- dans les troubles visuels d'origine circulatoire.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant:

- antécédent d'allergie à l'un des constituants du comprimé enrobé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie. Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids. La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorise la circulation sanguine.

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux augmentent (les bleus et les ecchymoses s'étendent), consulter immédiatement votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

3 à 6 comprimés par jour.

Le traitement doit être effectué par cure de 20 jours par mois, puis être renouvelé si nécessaire.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- *IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ A UN AUTRE CAS.*
- *NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.*

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler, sans les croquer avec un verre d'eau.

DURÉE DU TRAITEMENT

Le traitement doit être pris par cure de 20 jours par mois, et renouvelé si nécessaire. Se conformer à l'avis de votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS : rarement survenue de troubles digestifs.

SIGNEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

24.08.2005.