

DIFRAREL®

comprimé enrobé

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

EXTRAIT ANTHOCYANOSIDIQUE DE MYRTILLE 50,000 mg
ACÉTATE D'ALPHA-TOCOPHÉROL (concentrat d') - forme pulvérulente 50,000 mg
Excipients : Célatine, Acide silique, Cellulose microcristalline, Croscarmellose sodique, Silice colloïdale anhydre, Gomme arabique, Saccharose, Amidon de maïs, Talc, Dioxyde de titane (E 171), Opaglos 6000.

Pour un comprimé enrobé

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé enrobé, boîte de 24

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

MÉDICAMENT OPHTALMOLOGIQUE / À VISÉE VASCULOPROTECTEUR
(S - organes sensoriels)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM
68-88, Rue Ampère
Z.I. des Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

Information médicale : 01 49 44 29 29

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est indiqué en traitement d'appoint des troubles de la vision crépusculaire et nocturne, des myopies.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant :

- Antécédents d'allergie à l'un des constituants du comprimé enrobé.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de trouble visuel soudain ou d'aggravation d'un trouble visuel préexistant, il est nécessaire de consulter votre médecin.

EN CAS DE DOUCE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT
TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSÉOLOGIE

3 à 6 comprimés par jour.

Le traitement doit être effectué par cure de 20 jours par mois, puis être renouvelé si nécessaire.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale

Les comprimés sont à avaler, sans les croquer avec un verre d'eau.

DURÉE DU TRAITEMENT

Ce traitement doit être pris par cure de 20 jours par mois, et renouvelé si nécessaire.

S'écarter à l'avis de votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS ;

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITÉE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : 28 février 2006