

النشرة الدوائية: معلومات للمريض

ديبروساليك® 0.5 ملجم/جم - 30 ملجم/جم مرهم

بيتاميثازون ديبروبيونات وحمض الساليساليك

اقرأ كامل هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ باستخدام هذا الدواء.

• احتفظ بهذه النشرة، لربما احتجت إلى الإطلاع عليها مجدداً.

• استشر طبيبك أو الصيدلي إن كانت لديك آية أسلنة إضافية.

• وصف هذا الدواء لك بشكل خاص. حذار من إعطائه لأي شخص آخر لأنه قد يضره حتى لو كانت أعراضه المرضية شبيهة بأعراضك.

• إذا ساءت لديك آية أعراض جانبية أو بدت عليك آية أعراض جانبية لم ترد في هذه النشرة، اتصل بالطبيب أو الصيدلي.

مضمون هذه النشرة:

1. التعريف بمسمى ديبروساليك ودواعي استعماله

2. المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل البدء باستعمال ديبروساليك

3. كيفية استخدام ديبروساليك

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

5. كيفية حفظ ديبروساليك

6. معلومات إضافية

1. التعريف بمسمى ديبروساليك ودواعي استعماله

يحتوي ديبروساليك على مادة ستيرويدية هي البيتاميثازون ديبروبيونات وعلى حمض الساليساليك الذي يسهل عملية امتصاص البيتاميثازون ديبروبيونات داخل الجلد.

يُستخدم ديبروساليك لعلاج الالتهابات الجلدية.

2. المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل البدء باستعمال ديبروساليك

لا تستخدم ديبروساليك:

• إذا كانت لديك حساسية (فرط التحسس) من مادة البيتاميثازون ديبروبيونات أو حمض الساليساليك أو أي مكون آخر من مكونات ديبروساليك

(المدرجة في الفقرة 6)

• إذا كنت مصاباً بقرحات جلدية

• على الجروح

• على الجلد المصاب بعذوى

• على الجلد المصاب بحب الشباب

• قرب العينين

• على الأغشية المخاطية كالفم أو الشرج.

احتياطات خاصة مع استعمال ديبروساليك

تحتاج مع طبيبك قبل استخدام ديبروساليك:

• إذا كنت مصاباً بعذوى جلدية بكثرة، فذلك العدوى بحاجة لعلاج. وإن لم يظهر العلاج نتائج بسرعة ، توقف عن استخدام ديبروساليك.

• إذا كنت تستعمل هذا الدواء لفترة طويلة أو على مساحة كبيرة من الجسم.

• إذا كانت رقائق أو منضررة.

• إذا كنت تستعمل هذا الدواء تحت ضياء إطفائي.

• إذا كنت طفلًا.

قبل البدء باستعمال ديبروساليك، الرجاء استشارة الطبيب في حال انتبعت عليك أي من الحالات المذكورة أعلاه حالياً أو في أي وقت مضى.

استعمال ديبروساليك مع أدوية أخرى

في حال كنت تتناول أو تتناولت مؤخرًا آية أدوية أخرى، بما فيها أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية، الرجاء إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني بالأمر.

الحمل والرضاة الطبيعية

استشيري طبيبك قبل البدء باستعمال ديبروساليك في حال كنت حاماً أو مريضاً، خاصة إن كنت مستعملي ديبروساليك لفترة طويلة أو على مساحة

كبيرة من الجلد. فوذه الطبيب يقرر إن كان بإمكانك استخدام ديبروساليك خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل البدء باستخدام أي دواء.

اتصل بطبيبك في حال شعرت بتشوش الرؤية أو بغيرها من اضطرابات الرؤية.

3. كيفية استخدام ديبروساليك

تقىد دوماً بتعليمات الطبيب عند استخدام ديبروساليك. تحقق من الأمر مع طبيبك أو الصيدلاني إن كنت غير متأكد.

ديبروساليك مخصص فقط للاستعمال الموضعي على الجلد.

كيفية استخدام ديبروساليك

• استخدم ديبروساليك مرتين في اليوم، في الصباح والمساء.

• ادهن طفقة رقيقة من ديبروساليك مع الحرص على تغطية كامل المنطقة (المناطق) التي تحتاج إلى علاج.

• امرح المرهم برفق حتى يتغلغل الدواء داخل الجسم ويعطي مفعوله.

• أغسل يديك بعد الانتهاء من استخدام ديبروساليك.

مدة استخدام ديبروساليك

طبيبك هو الذي يحدد مدة العلاج ديبروساليك لأن تلك المادة ستعتمد على فعالية العلاج. ينبغي وقف العلاج فور تعافي البشرة المتضررة.

• الرجاء استشارة الطبيب إن لم تلاحظ أي تحسن.

• لا تستعمل ديبروساليك لأكثر من مرتين في الأسبوع إلا بتعليمات من الطبيب.

• فور زوال الطبقة المنتشرة أو السميكة من الجلد، ينبغي مواصلة العلاج بواسطة الستيرويد فقط.

ينبغي التقيد بتعليمات الطبيب على الدوام.

في حال استعملت جرعة زائدة من ديبروساليك

في حال استعملت كمية زائدة من ديبروساليك أو قفت بابتلاع الدواء عن طريق الخطأ (توخي الحذر مع الأطفال)، ينبغي الاتصال بالطبيب أو الصيدلاني على الفور.

إن أعراض الجرعة الزائدة شبيهة بالأعراض التي تظهر عند الاستعمال المترکز لمرم ديبروساليك أو عند استعماله لفترة طويلة (راجع الفقرة 4 بعنوان

"التأثيرات الجانبية المحتملة"

إذا قفت بابتلاع ديبروساليك أو استعماله لفترات طويلة على مساحة كبيرة من الجسم، يمكن لحمض الساليساليك الموجود في الدواء أن يتسبب بالتسكم،

علمًا أن علامات التسمم هي الدوخة، الغثيان أو التقيؤ، الصداع أو الطنين في الأذنين. وهذه الأعراض تزول مع الوقت.

في حال تسببت استخدام ديبروساليك

لا تستعمل جرعة مضاعفة من ديبروساليك للتعويض عن جرعة مناسبة.

في حال توقف عن تعاودك المشاكل الجلدية عند وقف العلاج.

استشر الطبيب أو الصيدلاني إن كانت لديك آية استفسارات إضافية حول استخدام هذا الدواء.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل سائر الأدوية، يمكن لدبيروساليك أن يتسبب بعض التأثيرات الجانبية، مع العلم أنها لا تصيب الجميع.

الحساسية

إذا بدت عليك آية لحسانية، توقف عن استخدام ديبروساليك واتصل بالطبيب على الفور.

بوجه عام، يتسم ديبروساليك بقابلية تحمل جيدة. ولكن من المحتمل أن يتسبب لك بالمشاكل الجلدية التالية:

• حب الشباب

• علامات تندد الجلد

• عدوى جلدية

• مشاكل جلدية حول الفم

• تغير لون البشرة، ضمور أو ترقق الجلد

• التهاب جذور الشعر، نمو الشعر الزائد

• الشعور بحرقة، حكة، تهيج البشرة، جفاف أو احمرار الجلد التماسي"). في حال الإصابة بتبييج جلدي، توقف عن استخدام ديبروساليك.

كما هي الحال مع سائر المواد стيرويدية، عند استخدام ديبروساليك على منطقة واسعة من الجسم أو بكميات كبيرة أو لفترة طويلة أو تحت ضياء إطفائي، يمكن للجلد أن يمتلك كمية كبيرة من السيرويدات ما يتسبب أحالاً بتأثيرات جهازية مثل تورّم الوجه والعنق والخداع أو زيادة الوزن أو تشوش الرؤية. كما يمكن أن يؤثر على النمو لدى الأطفال. استشر الطبيب في حال بدت عليك تلك الأعراض الجانبية.

إن الأطفال والمرضى من بشرتهم رقيقة أو متصرّفة أو متصرّفة والمرضى المصابين بداء حاد في الكبد أكثر عرضة من غيرهم للتآثيرات الجانبية.

إذا بدت عليك آية من التآثيرات الجانبية الخطيرة أو آية تآثيرات جانبية لم ترد في هذه النشرة، الرجاء إبلاغ الطبيب أو الصيدلاني بالأمر.

الإبلاغ عن التآثيرات الجانبية

إذا بدت عليك آية تآثيرات جانبية، بما فيها آية تآثيرات ممكناً لم ترد في هذه النشرة، الرجاء إبلاغ الطبيب أو الصيدلاني بالأمر.

الجانبية يساعد في تكوين معلومات إضافية حول سلامة هذه الدواء.

5. كيفية حفظ ديبروساليك

يحفظ بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.

يحفظ على درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

لا تستخدم ديبروساليك بعد انتهاء مدة الصلاحية المدونة على العلبة وبطاقة الدواء بعد EXP، علمًا أن الصلاحية تنتهي في آخر يوم من الشهر المذكور.

لا يجب التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. فهذه التدابير تساعد في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

مكونات ديبروساليك:

مرهم ديبروساليك:

• المواد الفعالة في ديبروساليك هي بيتاميثازون ديبروبيونات بتركيز 0.64 ملجم/جم (ما يعادل 0.5 ملجم/جم من البيتاميثازون) وحمض الساليساليك

بتركيز 30 ملجم/جم.

• يحتوي ديبروساليك على مكونات أخرى هي البرافين السائل والبرافين الأبيض اللين.

الشكل الصيدلاني ومحظيات العلبة

مرهم ديبروساليك: أنابيب من الألومنيوم سعتها 5، 10، 20، 30، 50، 100 و500 جرام.

من المحتمل لا تتوفر جميع الأحجام في الأسواق.

مالك حقوق التسويق والمصنع

شركة المالكة لحقوق التسويق:

أم إس دي بلجيكا بي في بي بي/إس بي أر إل، كلوس دي لينكس 5، بي- 1200 بروسيل.

الشركة المصنعة ومصدرة التسويق:

شرينغ بلاو بان في، اندرستيريارك 30، بي- 220 هايس-أوب-دن-بيرغ، بلجيكا

الرجاء استشارة الطبيب أو الصيدلاني للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الدواء.

مستحضر دوائي لا يصرف إلا بوصفة طبية.

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

(هذا مستحضر دوائي)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتليميـات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- الطبيب والصيدلاني هما الخبراء بالدواء وبنفعه وضرره.

- لا قطع مدة العلاج المحددة لك من تقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيادلة العرب

XXXXXX

2/