

ديبروزون * كريم/مرهم DIPROSONE * Cream/Ointment

مشتق من ديبرويونات البيتاميثازون للإستعمال الجدي فقط

الوصف : يحتوي كل ١ جرام من ديبروزون كريم/مرهم على ديبرويونات البيتاميثازون ، ستيرويد قشري تركيبي ، بما يعادل ٠.٥ مجم (٪٠.٥) من البيتاميثازون .

التأثير الدوائي : يعتبر ديبروزون كريم/مرهم فعلاً بسبب خواصه كمضاد للإتهاب والحكة ووظيفته كمقبض للأوعية . تفسر هذه التأثيرات بأسلوب قوي ولمدة تسمح باستعماله مرتين يومياً . وفي بعض الأحيان مرة واحدة يومياً .

الإستخدامات ودواعي الإستعمال : يستخدم ديبروزون كريم/مرهم للتخلص من المظاهر الإتهابية والحكة للإضطرابات الجلدية المستحسبة للمسترويدات القشرية .

الجرعات وكيفية الإستعمال : توضع طبقة رقيقة من ديبروزون كريم/مرهم بحيث تغطي كامل المنطقة المصابة بمعدل مرة إلى مرتين يومياً (صباحاً ومساءً) .

التأثيرات الجانبية : سجلت بشكل قليل التكرار الحالات التالية نتيجة استخدام المسترويدات القشرية الموضعية : العرقان ، الحكة الحكاك ، تهيج الجلد ، تهيج الجلد ، التهاب الأبرية الشعرية ، الشعرانية ، الإندفاعات العنية ، نقص التصبغ الجلدي ، التهاب حواف الفم ، التهاب الجلد بالشمس التحسسي ، تعطن الحلد ، افتقان ثانوي ، ضمور الجلد ، الأثلام الجلدية والأدواء الخفية العرفية .

موانع الإستعمال : لا يستخدم ديبروزون كريم/مرهم لدى المرضى نوى تاريخ تحسسي تجاه أي من مركباته .

الإحتياطات : يجب إيقاف استخدام ديبروزون كريم/مرهم إذا ظهر أي تهيج أو تحسن نتيجة استعماله ، ويستحسن استبداله بالمعالجة المناسية . عند تواجده أي إنسان مرافق يفضل استخدام مضادات الفطور أو مضادات الجراثيم المناسية . إذا لم يظهر تحسن سريع يجب إيقاف المسترويدات القشرية حتى يتم معالجة الحالة الإنانابية تماماً . أي من التأثيرات الجانبية المسجلة نتيجة استخدام المسترويدات القشرية العامة بما فيها تثبيط الغدة الكظرية ، يمكن أن تظهر أيضاً نتيجة استخدام المسترويدات القشرية الموضعية خاصة عند الرضع والأطفال .

يزداد الامتنصاص العام للمسترويدات القشرية الموضعية بزيادة مساحة الجلد المعرضة للعلاج ، أو عند استخدام تقنية التغطية بالضمادات . يجب أخذ الحذر في هذه الحالات أو عند توقع تطبيق معالجة طويلة المدى خاصة لدى الرضع والأطفال .

لا يستخدم ديبروزون كريم ومرهم للإستعمالات العينية .

الإستعمال لدى الأطفال : المرضى من الأطفال قد يبدون تأثراً أكبر للكبت الوطائي - النخامي - المحوري الذي يسببه استعمال الإستيرويدات القشرية الموضعية وكذلك الإستيرويدات القشرية الخارجية المصدر عنه في المرضى كما يجب تجنب ذلك لقابليتهم الأكبر للإمتصاص نظراً لأكبر مساحة الحلد بالنسبة لوزن الجسم . إن مجموعة الأعراض التي تم تسجيلها للأطفال الذين عولجوا بالإستيرويدات القشرية الموضعية تشمل : الكبت الوطائي - النخامي - المحوري ، تناثر كوشينج ، تأخر النمو الطولي ، تأخر اكتساب الوزن ، وارتفاع الضغط داخل الجمجمة . مظاهر كبت الغدة الكظرية لدى الأطفال تشمل انخفاض مستوى الكورتيزول في البلازما وغياب الإستجابة لتحفيز الهورمون الكظري - الغدي القشري . مظاهر ارتفاع الضغط داخل الجمجمة تشمل انتفاخ البياض ، صداع ، ورممة الحليمية البصرية .

الإستعمال لدى الحوامل والمرضعات : بما أنه لم يثبت أمان استعمال الإستيرويدات للسيدات الحوامل ، يجب استعمال هذا النوع من العلاج فقط إذا كانت الفائدة العلاجية منه تبرر المخاطرة بحياة الأمين .

لا يجب الإستعمال المفرط وبكميات كبيرة لهذه النوعية من الأدوية ولمدد طويلة الحوامل .

حيث أنه من غير المعروف إذا كان استعمال الإخير، وبتيدات القشرية الموضعية ينتج عنه امتصاص يندى بسبب إفراز هذه المادة في لبن الأم ، يجب اتخاذ القرار في إيقاف الرضاعة أو إيقاف استعمال المنتج مع الأخذ في الاعتبار مدى أهمية المنتج المستخدم .

زيادة الجرعة : الأعراض : الإستعمال المكثف أو لممد طويلة للإستيرويدات القشرية الموضعية قد يؤدي إلى كبت وظيفة الغدة الكظرية - الكلوبية والذي يؤدي بدوره إلى قصور كظري ثانوي ومظاهر زيادة الكورتيزون بما فيها مرض كوشينج .

العلاج : ينتج علاج عرضي مناسب . الأعراض الحادة لزيادة إفراز الكورتيزون عادة ما تعود لحالتها الطبيعية . يعالج اختلال التوازن الكهربي - إذا لزم الأمر - في حالة السمية الزمنية ، ينصح بالمسح البطيء للإستيرويدات القشرية .

التحذير : ديبروزون كريم : أنبوبات سعة ١٠ و ٣٠ جرام
ديبروزون مرهم : أنبوبات سعة ١٠ و ٣٠ جرام
يحفظ في درجة حرارة بين ٢م° و ٣٠م° .

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر بوتر على صحتك واستهلكه خلافا لتعليمات بعرضك للخطر .
- إنع بقية وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك
- فاطبيب والصيدلاني هما المسئولان بما للدواء وينبغي وضره .
- لا تفرغ منه العلاج الممنعة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بنون وصفة طبية .
- لا تترك الأدوية في متناول ايدي الأطفال .

محس وزارة الصحة العرب وإعداد الصيدالفة العرب

* علامة تجارية

صنع بواسطة شيرنج بلاو لابو ، هايست أوب - دن - برج - بنجيك ،
فرع من شيرنج بلاو كوربوريشن ، الولايات المتحدة الأمريكية .
شيرنج بلاو كوربوريشن - الولايات المتحدة الأمريكية .