

# FELDENE®

piroxicam

15 SUPPOSITOIRES 20 mg

PIÈCE ET MODE D'ADMINISTRATION



DANS TOUS LES CAS DE CONGÉNÉRALISATION A L'ORDONNANCE DE L'APOTHECER

POUR UNE BONNE UTILISATION DE CE MÉDICAMENT IL EST IMPÉDIE DE LE PRENDRE EN CAS DE SURDOULEUR

POUR UNE SURDOULEUR NE PAS SE CONGÉNERISER

CONDITION DE STABILITÉ

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Rhumatismes inflammatoires et dégénératifs:

- polyarthrite rhumatoïde,
- spondylarthrite ankylosante,
- arthrose (coxarthrose, gonarthrose, lombarthrose, ...).

Rhumatismes ab-articulaires et affections aiguës post-traumatiques de l'appareil locomoteur tels que périarthrite scapulo-humérale, tendinité, bursite, entorse.

Radicalgies aiguës, en relais de la voie orale ou injectable.

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE DONNÉ dans les cas suivants:

- allergie connue à ce médicament ou à un médicament apparenté (autres anti-inflammatoires et aspirine),
- ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- maladie grave du foie,
- maladie grave des reins,
- enfants de moins de 15 ans,
- grossesse,
- allaitement,
- antécédents de rectites ou de rectorragies.

EN CAS DE DOUZE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISE EN GARDE

CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE.

En cas d'infection, la surveillance médicale doit être renforcée.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En raison de la nécessité d'adapter le traitement, il est important de PREVENIR LE MÉDECIN qui rédige l'ordonnance en cas :

- d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- de maladie du cœur, du foie, ou du rein,
- d'allergie ancienne ou de crise d'asthme lors de la prise d'aspirine ou d'un autre anti-inflammatoire,
- de contraception par stérilet,
- de grossesse
- d'allaitement.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, NOTAMMENT ASPIRINE, ANTIAGGREGANTS...  
NE JAMAIS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.

## EFFETS SUR LA CAPACITÉ DE CONDUIRE DES VÉHICULES

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements.

## AUTRES EFFETS POSSIBLES DU MÉDICAMENT

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS ; au cours du traitement, il est possible que surviennent :

- des douleurs de l'estomac,
- des vomissements,
- une crise d'asthme.

Il faut en avertir votre médecin.

Dans certains cas rares, il est possible que surviennent :

- une manifestation cutanée ou muqueuse inhabituelle (éruption, démangeaison, rougeur, aphte, conjonctivite),
- une hémorragie digestive (rejet de sang par la bouche ou dans les selles).

Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

PIÈCE ET MODE D'ADMINISTRATION

PIÈCE ET MODE D'ADMINISTRATION

PIÈCE ET MODE D'ADMINISTRATION

PIÈCE ET MODE D'ADMINISTRATION

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie rectale - Réservé à l'adulte.

- La posologie est de 1 suppositoire de 20 mg par jour. A administrer de préférence le soir au coucher

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

POUR UNE BONNE UTILISATION DE CE MÉDICAMENT IL EST INDISPENSABLE DE VOUS SOUMETTRE A UNE SURVEILLANCE MÉDICALE RÉGULIÈRE.

## CONDITION DE DÉLIVRANCE

CE MÉDICAMENT EST INSCRIT SUR LA LISTE I.

SA DÉLIVRANCE NE PEUT ÊTRE RENOUVELÉE QUE SI LE MÉDECIN L'A EXPRESSEMENT INDICÉ SUR L'ORDONNANCE OU SUR PRÉSENTATION D'UNE NOUVELLE ORDONNANCE.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE RÉUTILISER SANS AVIS MÉDICAL
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

## DURÉE DE STABILITÉ

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDICÉE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé à la température ambiante (entre 10 et 25°).

## PRÉSENTATIONS

Feldène 20 mg suppositoires. Boîte de 15 suppositoires dosés à 20 mg de piroxicam. AMM n° 326 382.3

## AUTRES PRÉSENTATIONS

Feldène 10 mg gélules. Boîte de 30 gélules (gélules blanches). AMM n° 324 221.2.

Feldène 20 mg gélules. Boîte de 15 gélules (gélules bleues et blanches). AMM n° 326 369.7.

Feldène dispersible 20 mg. Boîte de 15 comprimés sécables. AMM n° 331 939.2

Feldène 20 mg I.M. solution injectable. Ampoule de 1 ml.

Boîte de 1 ampoule AMM n° 328 609.5.

Boîte de 2 ampoules AMM n° 328 610.3

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Les informations et conseils suivants vous sont donnés par l'Industrie Pharmaceutique, les Professions de Santé et des Organisations de Consommateurs.**

Ce médicament est un anti-inflammatoire. Il est destiné à diminuer les symptômes de l'inflammation. L'inflammation peut se manifester en divers points du corps par des signes variés, notamment douleur, rougeur, sensation de chaleur.

Pour qu'il soit efficace, respectez scrupuleusement la prescription de votre médecin : les doses prescrites, l'horaire des prises et la durée du traitement.

Comme tout produit actif, il arrive que certaines personnes le tolèrent moins bien que d'autres, en particulier sur le plan digestif. Donc, si vous remarquez que ce médicament provoque chez vous certains troubles plus ou moins gênants, parlez-en à votre médecin sans attendre.

Vous ne devrez pas de **votre propre initiative** prendre un autre médicament, quel qu'il soit, sans l'aviser de votre médecin traitant, car certaines associations doivent être évitées. Ainsi, même pour des produits que vous utilisez parfois pour des maux que vous connaissez bien, comme l'aspirine, il est préférable d'en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Signalez systématiquement à votre médecin, comme à votre pharmacien, les médicaments que vous prenez déjà, avant qu'il ne rédige une ordonnance ou ne délivre un médicament.

**VOTRE MÉDECIN, VOTRE PHARMACIEN CONNAISSENT LES MÉDICAMENTS.**

N'HÉSITEZ JAMAIS A LEUR DEMANDER DES PRÉCISONS.

**NE LAISSEZ JAMAIS UN MÉDICAMENT A LA PORTÉE DES ENFANTS**

**® Marque déposée de Pfizer Inc.**

**Pfizer**

86, rue de Paris 91407 Orsay Cedex - Laboratoire Pfizer

13455/2.I.F.

708335