أملـور*

أملوديين بيبلات

١- الاسم التجاري للمستحضر الطبي

أولور ٥ مجم
أولور ١٠ مجم
أملوديين

٢- التركيبة النوعية والكمية

أملور ٥ مجم

أملوديين (بيبلات)	٩,٩٤٥	مجم
مكافئ الأملوديين	٥,٠٠٠	مجم
بلورات نقية من الميلوز	٧٢,٥٥٦	مجم
نشا فائرة ٥ ضيف	٢٠,٠٠٠	مجم
اسبارات الماغنيسيوم	٠,٥٠٠	مجم
كبسولة واحدة رقم ٢	١٠٠	مجم

أملور ١٠ مجم

أملوديين (بيبلات)	١٩,٨٩٠	مجم
مكافئ الأملوديين	١٠,٠٠٠	مجم
بلورات نقية من الميلوز	١٤٥,١١٢	مجم
نشا فائرة ضيف	٤٠,٠٠٠	مجم
اسبارات الماغنيسيوم	٠,٥٠٠	مجم
كبسولة واحدة رقم ٢	٢٠٠	مجم

مكونات غطاء الكبسولة:

الجيلاتين، أوكسيد التيتانيوم
الغطاء: جيلاتين، أوكسيد التيتانيوم و لصغر

٣- الشكل الدوائي و الاحتواء

أملور ٥ مجم

كبسولة (غير لليفين) ٥٠ كبسولة
كبسولة (غير لليفين) ١٠٠ كبسولة

أملور ١٠ مجم

كبسولة (غير لليفين) ٥٠ كبسولة
كبسولة (غير لليفين) ١٠٠ كبسولة

٤- الخواص الإكلينيكية

٤ - ١ دواعي الاستعمال:

- العلاج الوقائي للنوبة الصدرية: الذبحة الصدرية الصغرى والمتقلبة.
- ارتفاع ضغط الدم.

٤- ٢ الجرعة وطريقة العلاج:

- ارتفاع ضغط الدم:

الجرعة الابتدائية كبسولة واحدة(٥ مجم) مرة واحدة يوميا ،يمكن زيادتها الى ١٠ مجم كجرعة واحدة يوميا حسب الاستجابة للعلاج

- النوبة الصدرية:

الجرعة الابتدائية كبسولة واحدة(٥ مجم) مرة واحدة يوميا،يمكن زيادتها الى ١٠ مجم كجرعة واحدة يوميا حسب الاستجابة للعلاج

- الجرعة اليومية القصوى هي ١٠ مجم.

للمحافظة على الاحتياطات المتخذة لنسلة الفئة ، ويمكن تخطي الأمثلة الأمثلة الحدثت فنل الطحال الأمراض الفئة.

- الجرعة الخاصة بكبار السن:

تعديل في جرعة للشخص عند الجرعتين كبير الدم و التنبيه.

- الاستخدام في حالات الفشل الكلوي:

يمكن وقاية الأملوديين الكلوي الذي يرسي يهدد بالا توتيط تحريك الكروكي الأملوديين في الفئات ،حيث تكون الكلوي، كما لا يمكن التنظير بعد بولوسة تشمل الفئة.

بينت هذه الجرعة تحسن جرعة الأملوديين عند تناوله في هذه تؤثر مع تعرف الدين من مجموعة الكولاز: أملوديين مستطيلات بيتا أو مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

٤- ٣ موانع الاستخدام:

- يحظر تناول هذا الدواء في حالة الحساسية المتعددة لمركبات الديهيدروبايريدين.
- لا يتضح بالخطأ هذا الدواء لوجه عام مع الفنلودوين (فنلن قوة ٤٠ - ٥ الفاعلات مع الأدوية الأخرى).

٤ - ٤ تحذيرات واحتياطات خاصة من أجل الاستخدام:

تحذيرات خاصة:

لم يتم التوصل بعد إلى معلومة هذا السحصحم التوقفي من أثر فعال وما تحته من حالف الأثاث بالنسبة للأطفال ، ولذلك لا ينصح باستخدام الأطفال للأملوديين.

عند ظهور العلامات الإكلينيكية: الصحف أو فقدان انتهية أو الخطأ فسنعم (واضح باهوراء الكلوي) عند ظهور الأزمنيات الكبيرة، وفي هذا الرجاءهما، وخاصة عن حالة جرحات الوريقان، ينبغي إيقاف العلاج في الحال.

احتياطات الاستخدام:

- الاستخدام بواسطة المرضى الصحيين بالخطأ في وظائف الكبد:

تزيد مدة نصف العمر الخاصة بمركب الأملوديين في المرضى الصحيين بالخطأ في وظائف الكبد (فيلم ٢ و٣ ، ٤ ، خواص حركة الدواء) ، ليست هناك توصيات عند خفض الجرعة، ويتأتى بنفس إعطاء الأملوديين بحذر إلى هؤلاء المرضى.

- الفعل بالمثل لا يصلح به ٤ - ٤ .

٤ - ٥ التفاعلات مع الأدوية الأخرى و أنواع أخرى من التفاعلات:

- تحذير إلى لا يصلح به (اجراءات الطوارئ):

فالتروفون (ويريا): وجدت عند حدوث خلط بين الفالتروفون وتجربه تلك على الحيوانات ويريا، هذا التفاعل الأملوديين عبر من الأنفاس الطبقي غير المنتظم، لذلك فإن هناك خطورة محتملة في التنزيج بين موقفان: فلوات الكلسيوم والفالتروفون مع تلك ، فقد بينت تجارب حرضى الديهيدروبايريدين والفالتروفون معا لدين حدوث أية مشاكل.

الجرعة الذي يحتاج لاحتياطات:

مثبطات المستقبلات ألفا١ (الفالتروفون وبرازوسين): الزيادة في ارتفاع ضغط الدم وخطر الانسداد الشديد لدى الدم المنتظم، والموقف الشرائية الإكلينيكية يحتاج إلى استعاض في حالة الدم المنتظم بالموقف خلال الساعات التي تلي تناول الخلط لضغط المستقبلات ألفا ١ (خلسة عند بدء العلاج).

بالكلوفوتين: زيادة في الآثار المضادة لارتفاع الضغط مخاصة ضغط الدم الشريانى وتعدل حدوث الدواء المضاد لارتفاع ضغط الدم الذي لا تتضمن الأمصال.

بيتاسيمباثيتيكس: وكذلك الفيراميل والفنلوتروم والديهيدروبين وخاص سميوبت موقفت عدل الكلوفوتين في قلم تنمية الزيادة أيضا في الكبد. الجرعة الإكلينيكية لم تعدل جرعات موقفت، وعند حدوث الكلسيم قلة العلاج بالزيادة بتنمية وبعد تنمية عن قلوبه.

الزافيراتوزول: ينتج عن الديهيدروبين والديهيدروبين والزافيراتوزول، زيادة خطر حدوث الأوديما الخاصة الأنفاس الأقصى الكلي لدى الديهيدروبين. الجرعة الإكلينيكية تم تعديل جرعات الديهيدروبين بالزيتين أثناء العلاج بواسطة الإنزكوتازول وبعد التوقف ، عن تناوله.

- مزج ينبغي أخذه في الاعتبار:

مثبطات مستقبلات بيتا: تخفاض ضغط الدم أو موجة قلب في المرضى الصحيين بشكل قلب صغير أو غير قياسي للمريض: (ضعول انعصلي قلب على القلب في الصدر الديهيدروبايريدين، يكون تدبيه: اعتبارا على الصحوبات والجرعة ترفيه الطول فعلى قلب على قلب لمثبطات مستقبلات بيتا) هذا بالإضافة إلى أن العلاج بمثبطات مستقبلات بيتا قد يقلل من ردة فعل الشرايين التي يحدث في حالة انتقال تنشيط في جلوكيميا في حركات الكلسيوم الصحيح الصدمة الكلسيم (الحركات بالحرية التنظيم) ، تزيد من الأثر المضاد لارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة ضغط الدم وضغط الإصابة بالتخاص ضغط الدم الشريط بالوقوف (أثر الصحي) التركيز بالديهيدروبايريدين (الكلسيوم الشريط الهبار، التخاص الأثر المضاد لارتفاع ضغط الدم (الاحتفاظ بالصحوبين نتيجة الكلوي الكلوي مشروبة).

المنقبضات العصبية: زيادة في الآثار المضادة لارتفاع ضغط الدم مع وظيفة الإسابة بانخفاض ضغط الدم الشريط بالوقوف (أثر إسابة).

إضافة إلى هذا، لا يقوم الأملوديين بتحليل مسلوبات: للديهيدكسين في الهلاما ما أو تضعة الكلي في الدم المنتظم الإصحاء.

٤ - ٦ الحمل والرضاعة

- الحمل:

لم تظهر الدراسات: التي أجريت على الحيوانات أي آثار مسببة تسوخ أو تشوهات، ودون أثار تأثر مسوخ أو تشوهات في الجنين، فإنه لا يظهر تشوهات في الإنسان نسبب ظهور المسوخ والتشوهات في الحيوانات وقلة النتائج الجواب التي يتم إجراءها بشكل صحيح على كل من الجنسين.

ولا نجوت في الوقت الحالي بيانات متعمة أو كافية لتقييم التشوهات التناسلية أو الآثار السامة على الأمنة للمخاض الأملوديين لقد تم الفصل.

وعند ٧ ساعة لمحتمل لتوليدين قتله قد مل وتلك كاجوان، وتلك

- الرضاعة:

بينت هناك بيانات قيما ينتقل يعور الأملوديين في لبن الثدي مع ذلك ، وكما هو الحال مع مركبات الديهيدروبايريدين الأخرى، فإن الكميات الموجودة في لبن الثدي قليلة جدا ولم يتم الإبلاغ عن أية تأثير غير مرغوب فيها بناء على ترفيع الكثف على بعض الحالات الفردية وكاجوراه وتلك ، يتضح بمقدار إعطاء هذا الدواء في فترات بالأمهات.

٤ - ٧: الآثار على القدرة على القيادة واستخدام الماكينات:

ينبغي عند قدم في العلاج أن يوصى المتقدم أو مدخدم هايكيات الفرص بدرجة كافية خدمة الإصابة بالدوار (انظر الجزء ٤ - ٨ الآثار غير المرغوب فيها)

٤ - ٨ الآثار غير المرغوب فيها:

الآثار المهمة الأكثر شيوعا فيرمنتلة تتأثر المثار المرجع للأوجه ، وعادة على سبيل المثال: الصداع وخمار الوجه أو الشعر، بالبيانات الموجودة من الدم وتكثر تكرر حدوث هذه الأعراض الجانبية خلال الأسبوع الأول للعلاج وبعد الأسبوع الأول للعلاج ، يتم مع استمرار العلاج كما هو الحال مع مركبات الديهيدروبايريدين الأخرى ، قد تكون الأوديما حول الكاحل أو في الوجه، ويزيد حدوث هذا بعد تناول جرعات كبيرة من الدواء

وقد كانت هناك تقارير نادرة بعد ما يلي:

- آثار على القلب : نوبة خطر القلب، التشوير بدقات القلب، خفقان الوجه.
- آثار على الجلد والأغشية المخاطية: تقرح، زيادة بعرق الوجه، تفاعل الحساسية بما فيه الهرش والشعر والأوديما. وكما هو الحال مع مركبات الديهيدروبايريدين الأخرى، تم الإبلاغ عن حدوث تحديد سميط في الفئة في المرضى الصحيين بالجلد خلد في الثلاثة أو الشهاب جوب الفم، وعلى الخلاف ، قل هذا الشخص أو الشاه عند عن طريق الحالة البيانية بالفم.
- آثار على الجهاز الهضمي: غثيان، عسر هضم، عطب حالة التقيؤ، قلة الشهية، الغثيان، الإسهال، الإمساك ، جفاف الفم.
- الآثار النفسية العصبية: تقلصات عضلية، ألام بالعضلات، ألام بالمفاصل.
- آثار على الدم: انخفاض عدد الصفائح الدموية
- آثار على الأوعية الدموية: الأوعية الدموية الدموية
- كما هو الحال مع مركبات عدل الترتيب الكالسيوم الأخرى، تم الإبلاغ عن حدوث ما يلي، بصورة نادرة: التشوير، الألم الدينة الصدرية، انتظام عضلة القلب، اضطراب ضربات القلب، ويمكن الربط بينها وبين الحالة الوضوح الصدفة الفدية في العلاج ويدعى أن تؤدي إلى النظر في مضمر الدواء.

٤ - ٩ زيادة الجرعة:

قد تؤدي الزيادة الكبيرة في الجرعة التي يتم بتناولها إلى انتباع ومقبول للأوعية الدموية الطرفية بما تؤدي إلى هبوط شديد ومتعدد في الدم. وقد حدثت أن الإغماء في ضغط الدم بعد سحم جاد. ينبغي الرقابة في وظائف الرعاية، فيركز: الفئة. ويمكن استخدام الجرعة الفاسدة للأجرعة الموجودة لاستعادة التوتر في الأوعية ووقع ضغط الدم ، لا يمكن التخلص من الأملوديين عن طريق فصل الكلوي.

٥ - الخواص الفارماكولوجية:

٥ - ١ التنوعات الفارماكولوجية:

- عضد انتقال الكلسيوم: تركيز الأوعية الدموية: (مستحرب من الديهيدروبايريدين) الأملوديين هو مضاد الكالسيوم ويتعلق بالديهيدروبايريدين الأخرى، تؤثر على عوقع الأزمنة في قوات الكالسيوم لكل من ٤ - ١ ديهيدروبايريدين، والفنلوتروم. وقد يوقف إلى التنشيط قدم لدخول الكالسيوم عبر طرات الكالسيوم في الخلايا الأوتار وعدلها عملات القلب. وكما هو الحال مع مركبات الديهيدروبايريدين الأخرى، فإن الأملوديين له خواص مقدرة للبول ومعرفة لأعينات الصوديوم في البول في الحوالقات.

ترشيط فيه مقدمة كمضد لارتفاع ضغط الدم الشرايين الصغير بقائمة الصغير على فصلات الكلوفوتين في الأوعية الدموية في جهاز مرتفعات.

يتوج إعطاء قدرة واحدة يوميا في المرضى الصحيين بارتفاع ضغط الدم، انخفاضا ملحوظا في مدى ضغط الدم في وضع الوقوف أو الوقوف على مدى ٢٤ ساعة ، دون حدوث زيادة مصاحبة في عدد ضربات القلب. ويصل الدرجة في الكلوفوتين من حدوث نوبات هبوط ضغط.

يقل الأملوديين من أو مثالي الطاقة الطرفية دون التدوب، في زيادة ضربات القلب كرد فعل. ويصاحب هذا انخفاض في استهلاك الطاقة الطاقة والكمية الأوكسجين المطلوبة ويسبب العقار انتباع الشرايين الأنابية والتزايين الصغيرة بما يؤدي من إمداد عضلة القلب بالأوكسجين.

يزيد تناول المرضى الصحيين بالنوبة الصدرية للأملوديين من رمن وتحمل الجرعي الأقصى وحتى ظهور أعراض النبضة وظهور التأثير الصغير في ضغط الدم على كل من محل حدوث للأحداث وأعمالها الفارموكولوجي.

كما هو الحال مع مثبطات الكالسيوم الأخرى، فإن الأملوديين مخاير من حيث الفائدة على صحة الأوعية وليس إلى تأثر على مستويات الدهون في الطرائد. الأملوديين له تأثير على مستويات الدهون في الطرائد، لذلك فإن المرضى الذين يعانون من داء القولون الشرعي، أو الشرعي.

في حالات المرضى الذين تجريت لهم عمليات قرنية للقلب، ويتم علاجهم بالشرايين، تزيدي الجرعات الفعالة من الأملوديين في استعاض مضغ الدم وزيادة حرمان الدم في الكلى ويفيد محل الفرنيج الشرايين في مستعض الضغط الدم، الأملوديين وقد يتم تعليم عشتمي صيغ الأملوديين للحيلولة على عين تصور فروزج.

٥ - ٢ أثر تحرك الدواء

لقد تم الامتصاص التام للجرعة العلاجية من الأملوديين الفم، ويتم تمثيلها على طريق الفم. وقد تم تقدير الفراحة البيوفولجي (الفاتمس) للأملوديين بما يدارج من ٦٤ و ٨٠٪ مع وصول الذروة في الخلاصة في تضمام مدة ٦ - ١٢ ساعة من التناول. ويقدم نوذج الجرعة في جرعة مقدار ٢٠ أثر أيكم.

ويصل مضغ تعبر التمضض من الدواء في ٣٥ - ٥٠ ساعة ويدنيج إعطاء الدواء مرة واحدة يوميا، بحيث يصل إلى مرتبة التركيز مستقر في الدم بعد ٧ - ٨ أيام من بدء التعاطي. يتم تمثيل الأملوديين بالكامل بواسطة الكبد إلى مركبات غير نشطة وتخرج ٦٠ إلى ٦٥٪ من مرتبع التمثيل في البول، وقد أظهرت الدراسات المستقلة أن ٩٧ و ٢٥٪ من الأملوديين الدم مرتبط بمركبات البلازما.

يزيد تركيز الأملوديين في البلازما من أيام بعد في المرضى الأصحاء مدة ٧ إلى ٨ أيام، هذا رغم تأثير إلكتيكية و لا ينتج بعض غير المنتظم من الأمصار. يلاحظ وجود فرق في مدى الدم في وجود المنتظم.

مرتبع التمثيل الكلوي: إذا تدخل مخلات الأملوديين في البلازما بدرجة التمثيل الكلوي.

٥ - ٣ خواص دوائية:

٥ - ٣ فترة الصلاحية:

يجب تحديد استخدام بعد انتهاء تاريخ طبي لصلاحية المطبوع على الكرتونة الخارجية.

٥ - ٣ احتياطات خاصة للتخزين:

- يحفظ تحت درجة حرارة ٢٥° درجة مئوية.

٦ - ٣ طبيعة ومحتويات العبوة:

٣٠ كبسولة: في علاف مشكل حراريا (PVC أو الأوسيوم).

تاريخ الجرعة على قلب الشي أسرامحة: ٨ أغسطس ٢٠٠١.

صمح برنسه ٥٥٥٥ - ٤٤٨٠.

* ٥٥٨٤: شركة فايزر العالمية - نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية

ما هو الدواء

- مستحضر يؤثر على صحتك، ولعلاجك، خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع دقة وصفة الطبيب وطرقة الاستخدام، المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالتحليل والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وتنفعه وضرره.
- لا تلجأ مدة العلاج المحددة لك ، وتقف نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
وقطاع الصيدلة العرب.