

يحتوي كل قرص على 115,4 ملغرام من هيكلات الدوكسيبيكسين، أي ما يعادل 100 ملغرام من الدوكسيبيكسين. السواغ: سليلوز بلوري، فوسفات الكسيوم الثنائي القاعدة، كروسبوفيدون، نشأ الذرة، ستيرات المغنيزيوم، غليكولات نشأ الصوديوم، سليكات المانيز، وأوليسولفات الصوديوم، سيليكات غروانيية.

#### الأشكال الصيدلانية والتوضيب:

أقراص العلية الواحدة تحتوي على 10 أقراص ووزنها 100 ملغرام.

#### دواعي الإستعمال:

لمعالجة كافة حالات الخمج الناتجة عن جراثيم سلبية وإيجابية الغرام التي تتأثر بمادة التيتراسيكلين.

#### الذواهي عن الإستعمال:

الحساسية على التيتراسيكلين وعلى أي مادة من مواد السواغ.

إضطراب مريئي ساد، مثل ضيق المرئي أو الأكلارزيا.

من المستحسن عدم تناول هذا الدواء من قبل النساء الحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم على شامي سنوات.

#### التفاعل مع أدوية أخرى:

ينبغي تجنب تناول هذا الدواء مع البنسلين نتيجة احتمال التشويش بين مختلف الأنظمة المضادة للبكتيريا.

وطالما أن التيتراسيكلين يعيق تخثر البلازما قد يكون من المستحسن تخفيض الجاعة في حال كان المريض يتناول ادوية مضادة للتخثر.

ولما كانت مضادات الحمض المعدة مع الألوينوم أو الكسيوم أو المغنيزيوم أو الحليب ومنتجات الحليب والمنتجات المحتوية على أملاح حديدية ثنائية التكافؤ تحد من القدرة على إمتصاص التيتراسيكلين الذي يتم تناوله بالفم، فعليه ينبغي عدم تناول هذه المواد في نفس الوقت الذي يتم فيه تناول الدواء... إن الريبينوتور والكاربامازين والفنتيتوين تحد عمر النصف الخاص بالدوكسيبيكسين. نادرة هي الحالات التي أشارت إليها الأديبات والتي أدت إلى زيادة تركز الليثيوم والديفوكسين ومشتقات الإريغوت في الدم على أثر تناول التيتراسيكلين.

من شأن تناول التيتراسيكلين الحد من فعالية أدوية منع الحمل التي تؤخذ بالفم.

#### تحذيرات خاصة:

على ضوء ما تمت ملاحظته في مضادات حيوية أخرى قد يؤدي العلاج بالتيتراسيكلين إلى خمج ناتج عن بكتيريا وفطور شديدة القدرة على المقاومة. ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار احتمال حدوث إتهاب معدني فلوني ناتج عن العقنوديات. كما ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار، في معالجة الخمج الناتج عن المكورات البنية، إمكانية أن يؤدي ذلك إلى إخفاء أعراض السلفس. في هذه الحالات ينبغي تنفيذ اختبارات المصل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. كما يحتاج العلاج الطويل الأجل إلى التحقق المنتظم من بنية الدم ومن وظائف الكبد والكلى. خلال تشكيل أنسجة العظم من شأن التيتراسيكلين أن ينتج مركب مسفرق من الكسيوم، دون أن يؤد ذلك أي أثر مضر بإتسان.

إن تناول التيتراسيكلين خلال نمو الأسنان (الحمل، الطفولة حتى عمر 12 سنة قد يؤدي إلى تغيير لون الأسنان (أصفر، رمادي، بني). هذه الأثر المضاد غالباً ما يحصل خلال العلاج الطويل الأجل. غير أنه تم التحقق من حصوله حتى في حال تكرار العلاج القصير الأجل.

#### الاحتراسات:

إن من شأن تناول جرعات عالية من الدوكسيبيكسين وبلدة تزيد على إيسويين إثثين التسبب باضطراب في وظائف الكبد. فعليه ينبغي رصد وظائف الكبد ووقف العلاج في حال حدوث ردات فعل قوية. قد تظهر حالات من التحسس الضوئي التي تتخذ شكل تهيج شديد للبشرة التي تتعرض للأشعة الشمس والأشعة فوق بنفسجية خلال العلاج في بعض الأشخاص. من المناسب تجنب هذه الظاهرة عن طريق عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة ووقف العلاج ما أن تظهر على البشرة بوادر الحماهي. إفراز الدوكسيبيكسين لا يتغير في الأشخاص الذين يشكون من ضعف في الكلى. ومع ذلك يستحسن التصرف بحذر مع هذا النوع من المرضى عن طريق تخفيض الجرعات.

عند الأشخاص الذين يشكون من قصور في الكلى حتى الجرعة الاعتيادية من الدوكسيبيكسين قد تولد تراكم في الدورة الدموية مع احتمال تضرر الكبد. في هذه الحالات ينبغي تعديل الجرعة بما يتناسب مع مستوى أداء الكلى. وإذا لزم الأمر ينبغي تحليل مستوى الدوكسيبيكسين في الدم (الذي ينبغي أن لا يزيد أبداً عن 15 ملغرام/دسيليتر) ووظائف الكبد. أكثر من ذلك، ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن يقوم التيتراسيكلين بدور إبتنائي مضاد الذي من شأنه زيادة قصور الكلى. كما تم الاعلان في بعض الحالات عن حدوث قرحة أو إتهاب حاد للمريء. ننصح المرضى بتناول الدواء مع ماء وفير حتى أثناء الوجبات والبقاء في وضعية الوقوف مدة لا تقل عن الساعة الواحدة بعد تناول الدواء وعدم تناول الدواء وقت الراحة في السرير. في حال ظهور عوارض مثل صعوبة في البلع أو ألم على مستوى خلف القص خلال العلاج ينبغي وقف تناول الدواء فوراً وتنفيذ بعض الكشوفات بواسطة الأدوات الطبية وفق تقدير الطبيب المعالج.

في علاج المرضى الذين يشكون من جرز بلعومي أكيد من المناسب تقدير إمكانية تناوب العلاجات.

#### الجرعات:

قرصان إثثن (200 ملغرام) دفعة واحدة في أول يوم؛ يليه قرص واحد (100 ملغرام) في اليوم خلال فترة العلاج الباقية. ينبغي تناول الاقراض أثناء تناول وجبات الطعام مع قدر وافر من الماء (كأس ماء كامل). ينبغي تحذير المريض من عدم النوم لمدة ساعة واحدة على الأقل بعد تناول الدواء.

أي خمج حاد آخر يحتاج لمعاينة الطبيب،

في حال الخمج الناتج عن العقديات من نوع بيتا الخاص بحل الدم (المجموعة A) ينبغي أن يودم العلاج ما لا يقل عن عشرة أيام..

مدة العلاج متعلقة بتطور الخمج. ومع ذلك من المستحسن وقف العلاج بعد زوال الحمى والعوارض السريرية.

ويهدف ضمناً سلامة العلاج من المستحسن إجراء مخطط المضادات في كافة الحالات، من أجل التأكد من أن سلالة الجراثيم الذي ولدت الخمج تتأثر بالتيتراسيكلين.

#### الحمل والإرضاع:

ينبغي عدم معالجة النساء الحوامل والمرضعات بهذا الدواء لأن الدوكسيبيكسين قادر على خرق المشيمة وتولوث حليب الام.

#### الجرعة المفرطة:

في حال الجرعة المفرطة ينبغي غسل المعدة.

#### التأثيرات الجانبية:

من شأن العلاج بالتيتراسيكلين أن يؤد التأثيرات الجانبية التالية:

– آثار معدية معوية: غثيان، آلام على مستوى البطن، تقبوع، إسهال، فقدان الشهية، إتهاب غشاء الفم المخاطي، إتهاب اللسان، إتهاب معوي قولوني، داء المبيضات على مستوى الشرجي والاعضاء التناسلية.

– صعوبة في البلع، قرحة أو إتهاب حاد للمريء (راجع المقطع الخاص بالاحتراسات)، الناتج عن تناول الدواء مباشرة قبل النوم و/أو مع قدر قليل من الماء.

– تهيج البشرة: يمكن أن تظهر بقع حطاطية وطفح حماهي.

– حساسية مفرطة: الشرى، فرغورية تاقانية، وذمة عرقية مصيبة.

– تبدلات في الدم: حالات نادرة جداً من فقر انحلاي في الدم، نقص في الكريات البيض المتعادلة، قلة الصفيحات الدموية وكثرة الحضضات.

إن من شأن التقيد بالإرشادات الواردة هنا الحد من المخاطر.

ندعو المريض إلى إبلاغ طبيبه أو الصيدلي عن أي أثر غير مرغوب تعرض له مما لم يأت الكلام عنه هنا.

#### التخزين:

ينبغي حفظ الدواء في مكان لا تزيد حرارته عن 25 درجة مئوية.

راجع تاريخ الصلاحية المطبوع على العلية. يسري هذا التاريخ فقط في حال كان التوضيب سليماً وحفظ الدواء بشكل صحيح.

ينبغي عدم إستعمال هذا الدواء بعد تاريخ إنتضاء مدته المطبوع على العلية.

#### التوضيب:

العلية الواحدة تحتوي على 10 أقراض ووزنها 100 ملغرام.

#### لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

لايف فارما مجموعة أيبافارماكو – ايطاليا