

فليكسان كيتوروفان

التركيبة

الكبسولة: كل كبسولة تحتوي 50 ملغ من كيتوروفان؛ السواغ: ما يكفي.
التحمية: كل تحمية تحتوي على 100 ملغ من كيتوروفان؛ السواغ: ما يكفي.
الهلامة: كل 100 غرام من الهلامة تحتوي على 2,5 غرام من كيتوروفان؛ السواغ: ما يكفي.
الأنبولة: كل أنبوية تحتوي على 100 ملغ من كيتوروفان؛ السواغ: ما يكفي.
أنبولة المحلل للحقن في العضل: كحول بنزليك، ماء لمستحضر الحقن.
أنبولة المحلل للحقن في الوريد: ماء لمستحضر الحقن.

دواعي الإستعمال

الكبسولة والتحمية والهلامة: مرض الروماتيزم والإتهابات والأمم المختلفة المصادر؛ إتهاب المفاصل الروثية وإتهاب الفقار الرثائي، النقرس في المرحلة الحادة، فصال عظمي مختلف التوضع، إتهاب الجراب والأوتار وغند الوتر والغشلي الزليلي (سائل المفاصل) والغلاف، إتهاب الورك والجدر والأمم العظمي والرضات والإنتوبات والخلع والتمزق العظمي وإتهاب الوريد والوريد الختاري السطحي والأوعية المغفاوية.
الأنبولة: معالجة الأعراض الحادة الناتجة عن إتهاب النظام العظمي.

الجرعات

الكبسولة: عدد 2 كبسولة من مرتين إثنين إلى ثلاث مرات في اليوم، بعد الوجبات الرئيسية.
التحمية: من تحمية واحدة إلى تحميتين إثنين في اليوم.
الهلامة: دهن منطقة الأم مرتين إثنين إلى ثلاث مرات في اليوم.
أنبولة للحقن في العضل: أنبولة واحدة في اليوم.
أنبولة للحقن في الوريد: أنبولة واحدة أو إثنان في اليوم.
ملاحظة: ينبغي استخدام المحلول الممدد للحقن العظمي فوراً وعدم حفظه بالوريد.
ينبغي إتباع الحقن مع إتباع قواعد التعقيم والتطهير بدقة.
من الحكمة بكان خفض الجرعة عند المسنين.

النواهي عن الإستعمال

قرحة هضمية في المرحلة النشطة، سوابق إيجابية لقرحة هضمية متكررة، عسر مزمن في الهضم، إتهاب المعدة، قصور كلوي عند العلاج المكثف بمرات البول. نقص في الكريات البيضاء ونقص في الصفائح، إضطرابات في تخثر الدم عند المرضى الذين يعانون من النزف خلال العلاج وإستعداد للنزف، أثناء العلاج بمضادات التخثر.

ينبغي تجنب استعمال الحقنة بالوريد في الحالات التالية: قصور في القلب، تشمع في الكبد، إتهاب حاد في الكبد، قلة حقن الكلى بالدم، عند المسنين. فرط الحماض الكيتوروفان، كما توجد إمكانية وجود حالات فرط الحماضية منقطة مع حمض الاسيتيل ساليسليك أو مع أدوية أخرى لمضادات الإتهابات غير الأسترويدية. بالتالي عدم اعطاء كيتوروفان للذين بدت عليهم أعراض الربو وإتهاب الأنف والشري على أثر تناولهم حمض الاسيتيل ساليسليك أو أدوية أخرى مضادة للإتهابات غير الأسترويدية. نتيجة تفاعل هذا الدواء مع أيض حمض الأراشيدونيك عند المصابين بالربو والمرضى المهنين، قد تظهر تشنجات قصبية وربما صدعات وظواهر حساسية أخرى. من المستحسن عدم تناول كيتوروفان أثناء الحمل والرضاعة (راجع الفقرة) أو من قبل الأطفال.
ينبغي عدم وصف التحميلات للمرضى المصابين باضطراب البواسير أو الذين تعرضوا حديثاً لإتهاب المستقيم.

ردود فعل غير مرغوبة

كما هي الحال مع كافة مضادات الإتهابات غير الأسترويدية، يمكن ظهور اضطرابات عابرة عادة في الجهاز الهضمي، مثل الأم في العدة وغثيان وقيء وسهال وانثقاب البطن. ومن المميز في حال استعمال التحاميل أنه قد تظهر اضطرابات محلبة (حرق، مفض) وانخفاض في درجة سخاوة البراز غط في حالات استثنائية حصل نزف معدي معوي وعسر عابر في البول ووهن وصداق وشعور بالوار والطخ الظاهر. كما قد ينشأ عن إستعمال الهلامة ظهور ردود فعل جلدية محلبة من نوع الحماضية، إتهاب الجلد، الكزيما، ردود فعل ضوئية، شري.

الاحتراسات

عند المرضى المصابين بخلل في الوظائف الكلوية ينبغي استعمال كيتوروفان بحذر شديد لأن تصريف هذا الدواء يتم عادة عبر الكلية.
الأنبولة: لا بشكل كيتوروفان مسكّن إعتيادي. ينبغي تناوله تحت إشراف طبيب.
وعندما تخففي الأمم الحادة يستحسن استعمال مستحضرات ليست للحقن التي قد تعطي ردود فعل سلبية مماثلة نوعياً ولكن أقل خطورة.
وفي حال دام العلاج طويلاً يستحسن دخول المستشفى.

التفاعلات

ولما كانت وصلة إرتباط كيتوروفان بالبروتين عالية قد يلزم خفض جرعات مضادات التخثر والدفنيليدانتوين أو السلفاميد التي قد تكون قيد الاستعمال.
من شأن إستعمال هذا المستحضر قبيل الولادة أن يجرى الولادة نفسها. كما أن استعماله في نفس هذه الفترة قد يتسبب باضطراب حركة الدم في النورة الصغيرة للسودود الجديد مع ما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على التنفس. بالتالي من المستحسن عدم تناول هذا الدواء أثناء الحمل والرضاعة وخلال مرحلة الطفولة. وفي ظل غياب أية معطيات دوائية يستحسن عدم وصف هذا الدواء للنساء المرضعات.

تحذير

إن من شأن إستعمال الهلامة، لا سيما إذا جرى ذلك لفترة طويلة، أن يؤد الحماضية وفي حال حصل ذلك ينبغي وقف العلاج فوراً واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة. لتفادي ظهور أية حساسية والحماضية الضوئية ينبغي عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
لا يوجد أي تأثير معروف على درجة التيقظ أو التركيز (قيادة السيارة وإستعمال الماكينات)

الجرعة المفرطة

لا وجود حتى الآن لآية تقرير عن بيانات سريرية ناتجة عن فرط الجرعة عند الرجال. في حال تناول جرعة مفرطة بشكل عرضي أو طوعي ينبغي اللجوء لعلاج عرضي.
الحفظ

ينبغي حفظ الدواء في مكان تقل حرارته عن ٢٥ درجة مئوية.

التوضيب

متوفرة طب فيها 20 أو 24 أو 30 كبسولة كيتوروفان بوزن 50 ملغ الواحدة.
وعب فيها 10 أو 12 أو 50 أو 100 تحميلة كيتوروفان بوزن 100 ملغ الواحدة.
وعب فيها 30 غرام أو 50 غرام من هلامة الكيتوروفان بنسبة 2,5٪.
وعب فيها من 60- 60 أنبولة كيتوروفان بوزن 100 ملغ الواحدة + من 60-60 أنبولة محلل للحقن في العضل ومن 60-60 أنبولة محلل للحقن في الوريد

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

لايف فارما مجموعة إيطاليا - إيطاليا