

مترونيدازول

فرازج

التركيب التركيب

الرجاء قراءة هذه النشرة كاملة قبل تناول هذا الدواء. - إمتفظي بهزه فنشرة فقد تحتلجين إنى قراءتها مجدداً.

- إذا كان تديك أسئلة أخرى أو شكوك، إسأتي الطبيب أو الصيبلي للمزيد من المعلومات

ا لقد وصف هذا الدواء لك شخصها. لا تعظيه أبناً لشخص أهر حلى إذا كانت موارضه مماثلة لعوارضك لأنَّه

sanofi-aventis France

لتعريف بالدواء

متوني القرزجة من 2.100 ع على 500 ملغ من المترونيدازول لأسوقة دهن صلب

الشكل الصيدلاني والعبوة فرزجة إعلية من 10}

لفقة الدوائية العلاجية ها الدواه هو مضاه حيوني ومضاه للبطايريا ومضاه للطفيليات يقلمي إلى مجموعة -5 تقريبيدارول (ج. مضاعات اولقاق والمطورات باستقناه المستحضرات المحضوعة من مشتقان المشيروسات الطفررة-(بميدارول) رمز GOTAFOI ، ATC

مامل الرخسة

1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris - France

UNITHER LIQUID MANUFACTURING 1-3, allée de la Neste, Zl d'en Sigal

متى تستعمل هذا الدواء 9 ستعمل هذا الدواء للعلاج الموضعي ليعض أتوام الثهاب المهبل إهالان إنتان المهبل).

تحذيرا مثى بُمِنْع استعمال هذا الدواء؟

؛ لا تتتاولي أبدأ هذا الدواه. إذا كنن تعانين من حساسيَّة شدَّ الأدوية من مجموعة إبعيدازول (مجموعة المضادان الحيويَّة لتى تحتوى على المترونيدازول| - 9 تقتاولي اليواد بشكل علم (1) كنن تقتاولين أيضاً الريسولليزاد أو تشربين الكمول المشروبان الروسلة الأدويا لتن تحتون على الكحول) في حال النَّكُ، من الضروريِّ استشارة الطبيب أو المبيدانيّ

تحديرات خاشة

لا يجب وصف هذا العلام لأكثر من 10 أيناء ولا يجب اعطاؤه أنكر من مرتين أو 3 مران في السنة. - من الأفضل أوَّ تشربيُّ الكمول خلال فترة تناولك هذا الدواء بسبب خطر تعرَّضك لتأثيرات جانبيَّة مثل احمار الوجه والشعور بالحز والتفؤؤ وزيادة سرمة القب . يجي طيك التوقُّف عَنْ تَنَاول هذا الدواء ومراجعة الطبين إذا وجدن صعوبة في تنسيق المركان الزرابيَّة أو إذا شعرن

الِنَا كُنْتَ تَعَانَيْنَ مِنَ اصْطَرَابِاتَ مَصَيِيَّةً هَادَةً مَرْمَنَةً أَوْ مَتَرَابِدَةً اعْتَمَنِي عَنَايَةً هَاصَةً مِعَ هَنَا الدواء Bushey only

· في حَمَّلُ كَفَتَ تَعَانَيْنَ مِنَ اضْطَرَابِكَ فِي الدم أو تَلَقَّيْتَ عَلَّجِنَا مِرْتَقَعَ الجرعات وارأو طويل الأمد، قد يُضْطَرُ طبيبك إلى خضاعك لقمومنان دم دوريّة للتملق من تعيادك اليمون الكامل. في حال كلت تخلفون لعلام طويل الأمد بهذا الدواءً من المهمَ أن تعلمي طبيبك في حال تعرَّضت لأحد اشطرابات لجهاز العمين الثالية إحساس بالوهز، صعوبة في تنسيق المركات، دوار أو نوبات ان استعمال الغززجة مع الوافي الذكرن أو الحجاب الحاجز قد يزيد خطر تعزَّق التثني

في حال النت، من الشروري استشارة الطبيب أو الصيدلين.

التفاعلات الدوائية وتفاعلات أخرى نتقابي أن تقاطل بين أدوية مختلفة، بخاصة الديسولفيراد والكمول يجي عليك دائماً إعلام طبيك أو المبيدليّ بأنّ علاج أخر قد تكونى تخضعين له

لد يكون لتناول مَنا الدواء تأثير على نتائج بعض الفحوصات المخبريّة (فحص التولييّة). لان يمكن أن يؤنّي المترونيدارُول في نتائج بيجابية حاطنة لقمص تنسون الحملء الإرضاع

لحمل علد الطَّرورة. يمكن تقاول هذا الدواء هلال فترة الحمل وتكن يجب عليك دائماً استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تقاوله الإرضاع

تقاني الأرضاع هلال فلرة تناول هذا الدواء ب أو العبيدليّ قبل تفاول أن دواه خلال فترتيّ الحمل والإرضام

سانقات السيأرات ومشفلات الالات جب أن نتنبه أسريضات اللوائي يقان سيارات أو يستعمل آلات إلى خطر الإصابة بدوار وارتباك وهلوسات واختلاجات

> كيف يُستعمل هذا الدواءة لجرمات هنا الدواء مخضص للبالغات فقط

طي سبيل لدلالة تبلغ لجرعة لعاديّة Flagyl® 500 mg فرزجة ولمدة في اليوم عبر المهيل بالنزامن مع علاج عبر القبر في حال الضرورة من الشروري المضام شريكك للعلاج أيضاً. أفلون عليه الشارات سريريَّة أم 5. في مطلق الأحوال تقيدي يوصفة الطبيب

Att 500

طريقة الاستعمال بجن ادخال القراجة واثن مستلقية.

وقت وعدد مزات الاستعمال مرة في الهوم

يفضل أستعمال الغرزجة علد المساء فياز الحلود إلى النوم

يكون المختاء المجوز ها؛ فقالاً فقط في مثال استعطتهم بالقطام مسبى الجرعان الموصوفة وطوال المرَّة التي وصفها . في حال اهتفاه الحش أو أن عارض من العوارض، لا يعني ذلك أنك شفيت

وإن أنْ شعور بالتَّمَّى ليس يُسين العلاج بالمشاد الميونْ بل يسين الإلتيان. لذا فإن تطيف العلاج أو إيقافه لن يؤثرا على شعورت بالقعب بل سويذران شفاءات. تتراوم ساة المحام بين 7 و10 أيناد حسب المثالة المعالمية، ولكن يجب ان لا شور منة العلام أنظر من 10 أيناد ولا يجب

مواجهة الجرعة المقرطة به تقيَّان أو عاتبت من صعوبة في تنسيق هركات أو من فتيهان استشيري طبيت فني قد يقرَّر وصف علاج لك

التأشرات الجانبية غير المرغوب بها والمزعجة كما مع أن مادة فاطأه قد يكون لهذا الدواء تأثيرات تسبُّب لإعاجاً متقاوت الحدَّة لدي يعض المريضات التأثيران لمعينة لمعوية

• غلبان نفيَّق معس في المعدد إسهال: التهاب النسان وجفاف القب التهاب القب مناق معنني في القب قلدان الشهيئة. إستثنائية التهان البنكرياس الذي يزول بعد إيقاف العلاج.

- فتأثيران على فجلد وفقشاه المخاطئ • هيو مم احمرار الوجه حكَّة طفح جلدي مع حمَّي أحياناً: • شرى (طلح جندي ممثل لطلح القراص)، توزم تعسسني مقاجي الوجه والعنق (خزن وعاني) واستثنائياً صدمة

> • شعفُ أعصاب في التراعين والسافين: • نوبات، دول أضعف في تنسيق المركات الراديّة

- الإضطرابان النفسيّة About days. - المطريات الدو • حالان تادرة جداً من الانخفاض غير الطبيعي لتعداد كريان الدم البيض أو الصطبحات الدمويَّة.

– التأثيرات على الكيد * هالات تنادرة جداً من وطيقة الكيد غير الطبيعيّة وهي عكوسة ومن التهاب الكيد بسبب السناد المسلك الصقراوي

تأثيران أخرى • بوار محمرُ وبيِّ اللود بسبب النوام بًا كمان أنَّ تَأْثَيرُك مَرْهَيَّةً وَفَيْرَ مَرْفُونَ بِهَا فَيْرَ مَنْكُورَةً فَي هذه النَّشَرَة الرجاء أن تُحْمَى الطبيب أو الصيداني

اتبع يدقة وصضة الطبيب وأطريقة الاستعمال المتصوص عليها واتعليمات الصيدلي الذع

لا تستعملي الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحيَّة المدوِّن على العلبة الخارجيَّة.

محاذير خاصة للحقظ لا تحفظي الدواء على درجة حرارة تقوق 25 درجة منويّة

> تاريخ مراجعة النشرة مزيران 2009.

ان هذا الدواء

سرفها لك. ه الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و في نفعه و ضرره.

» لا تقطع مرة العلاج المحردة لك من تثقاء نفسك • لا تكرر صرف البواه بدون استشارة الطبيب

ه لا تقرك الادوية في متفاول الاطفال.

جلس وزراء السحة العرب واتحاد السيادلية العاب.