



500mg

ovules

sanofi aventis

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques. Cela pourrait lui être nocif.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**Composition**

Un ovule de 2.10 g contient 500 mg de métronidazole.
métronidazole 500 mg
Excipients : glycérides hémisynthétiques solides pour un ovule.

Forme pharmaceutique et présentation

Ovule (Boite de 10).

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTERIENS ANTI-PARASITAIRES de la famille des nitro-5-imidazoles. (G: Anti-infectieux et antiseptiques, associations aux corticoïdes exclues-dérivés imidazolés) Code ATC: G01AF01

Titulaire

sanofi aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris - France

Fabricant

UNITHER LIQUID MANUFACTURING
1-3, allée de la Neste, Z.I. d'en Sigan
31770 Colomiers - France

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines vaginites (infections du vagin).

ATTENTION !**DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT**

- Ce médicament ne doit jamais être utilisé en cas d'allergie aux médicaments de la famille des imidazoles (famille d'antibiotiques à laquelle appartiennent le métronidazole).
- Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec le disulfiram ou l'alcool (boissons alcoolisées, médicaments contenant de l'alcool).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

- Ce traitement ne doit pas être prescrit pendant plus de 10 jours et ne doit pas être répété plus de 2 à 3 fois par an.
- La prise de boissons alcoolisées durant ce traitement est déconseillée en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque.
- Il convient d'interrompre le traitement et de consulter un médecin en cas d'apparition d'une mauvaise coordination des mouvements volontaires, apparition de vertiges ou de confusion.

- Attention à la prise de ce médicament si vous souffrez de troubles nerveux sévères, chroniques ou qui évoluent.

Précautions d'emploi

- En cas d'antécédents de troubles sanguins, de traitement à forte dose et/ou de traitement prolongé, votre médecin peut être amené à contrôler régulièrement par des examens sanguins votre numération formule sanguine.

- En cas de traitement prolongé, il est important de prévenir votre médecin en cas de survenue de troubles nerveux (fourmillements, difficulté à coordonner des mouvements, vertiges, convulsions).

- l'utilisation de cet ovule avec des préservatifs ou des diaphragmes peut augmenter le risque de rupture du latex.

EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, ET NOTAMMENT AVEC LE DISULFIRAME ET L'ALCOOL, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

La prise de ce médicament peut perturber les résultats de certains examens de laboratoire (recherche de tréponètes) ; le métronidazole peut en effet faussement positer un test de Nelson.

Grossesse - Allaitement**Grossesse**

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Allaitement

éviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIEN IR AU COURS DE LA GROSSETE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Conducteurs et utilisateurs de machines

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de vertiges, de confusion, d'hallucinations ou de convulsions, attachés à l'emploi de ce médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**Posologie**

Ce médicament est réservé à l'adulte.
A titre indicatif, la posologie usuelle est :

1 ovule par jour pour voie vaginale en association si nécessaire avec un traitement par voie orale.
Votre partenaire doit être impérativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie vaginale.

L'ovule s'administre en position allongée.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré
1 fois par jour.

L'ovule s'administre de préférence le soir au coucher.

Durée du traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes guéri. L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

La durée de ce traitement varie de 7 à 10 jours, selon les indications. Mais ce traitement ne doit pas être prescrit pendant plus de 10 jours et ne doit pas être répété plus de 2 à 3 fois par an.

Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas de vomissements, difficile à coordonner les mouvements, désorientation, consulter votre médecin. Il peut être amené à vous prescrire un traitement.

EFFECTS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins génants :

- Manifestations digestives :
 - nausées, vomissements, crampes au niveau de l'estomac, diarrhées ;
 - inflammation de la langue avec sensation de bouche sèche, inflammation de la bouche, goût métallique dans la bouche, perte d'appétit ;
 - exceptionnellement, cas de pancréatite (inflammation du pancréas) réversible à l'arrêt du traitement.

- Manifestations au niveau de la peau et des muqueuses :
 - bouffées de chaleur avec rougeur du visage, démangeaisons, éruption sur la peau parfois accompagnée de fièvre ;
 - urticaria (éruption cutanée analogue à celle qui provoque la piqûre d'ortie), brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique (odeur de Quincke), exceptionnellement choc d'origine allergique.

- Manifestations nerveuses :
 - maux de tête ;
 - atteinte des nerfs des membres ;
 - convulsions, vertiges, mauvaise coordination des mouvements volontaires.

- Troubles psychiques :
 - confusion, hallucinations.
 - Troubles sanguins :
 - très rares cas de taux anormalement bas de globules blancs ou de plaquettes dans le sang.
 - Manifestations au niveau du foie :
 - très rares cas d'anomalies réversibles du bilan hépatique et d'hépatite due à l'obstruction des voies biliaires.
 - Autres :
 - coloration brun-rougeâtre des urines due au médicament.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Précautions particulières de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Juin 2009