

Ginkor fort®

Gélules.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT :

DÉNOMINATION: Ginkor fort, gélule.

COMPOSITION: Extrait de Ginkgo biloba standardisé titré à 24 %

d'hétérosides de Ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide	0,014 g
Troxérutine	0,300 g
Chlorhydrate d'heptaminol	0,300 g

Pour une gélule.

Stéarate de magnésium, silice colloïdale.

FORME PHARMACEUTIQUE: Gélule. Boîte de 30 gélules.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE: VASCULOPROTECTEUR-(C: système cardio-vasculaire).

EXPLOITANT : BEAUFOUR IPSEN Pharma 24, rue Erlanger - 75016 PARIS

Fabricant : BEAUFOUR IPSEN Industrie 28100 Dreux

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Ce médicament est préconisé dans les troubles de la circulation veineuse des jambes (jambes lourdes, douleurs, sensations pénibles dites "impatiences" lors du coucher,...) et dans le traitement des symptômes liés à la crise hémorroïdaire.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- hyperthyroïdie (dysfonctionnement de la thyroïde),
- association avec certains antidépresseurs : les inhibiteurs de monoamine oxydase ou IMAO (cf. rubrique Interactions).

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

MISE EN GARDE SPÉCIALE : Dans la crise hémorroïdaire, les symptômes doivent régresser rapidement.

En l'absence d'amélioration au bout de 7 jours ou en cas d'aggravation : consulter votre médecin.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une hygiène de vie : éviter l'exposition au soleil, à la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids. Sont favorables :

la marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés.

Utiliser ce médicament AVEC PRÉCAUTION en cas d'hypertension artérielle grave.

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS, notamment si vous prenez des anti-dépresseurs comme les IMAO, À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT : Prévenir votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.

SPORTIFS : L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (l'heptaminol) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles anti-dopage.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT :

POSOLOGIE : La posologie usuelle varie selon l'indication :

- troubles de la circulation veineuse : 2 gélules par jour, une le matin et une le soir.
- crise hémorroïdaire : 3 à 4 gélules par jour pendant 7 jours, réparties au cours des repas.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie orale.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ :

Le médicament est à prendre au moment des repas.


DURÉE DU TRAITEMENT : Dans la crise hémorroïdaire, ne pas dépasser 7 jours de traitement (cf. rubrique Mise en garde).

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS :

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT

CONSERVATION : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITÉE D'UTILISATION FIGURANT SUR
LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.


DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Juin 99.



1 - Evitez toutes les sources de chaleur
> Préférez les douches tièdes ou froides



3 - Evitez de rester immobile
> Pratiquez des mouvements de la cheville
> Pratiquez un sport (natation, bicyclette, marche)
> Enfin favorisez le retour veineux en
surélevant les pieds de votre lit



4 - Evitez de porter des chaussures à talons plats ou des talons aiguilles
> Préférez des talons de 3 à 4 centimètres qui soutiennent la voûte plantaire



5 - Enfin, luttez contre le surpoids et la constipation
> Optez pour une alimentation riche en fibres et en eau de boisson



BEAUFOUR IPSEN
Pharma

60555.03 RV
18.10.2000