

# HEXALYSE®

## comprimé à sucer

### IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### **COMPOSITION**

BICLOTYMOl ..... 5,0 mg  
CHLORHYDRATE DE LYSOZYME ..... 5,0 mg

ENOXOLONE ..... 5,0 mg

Excipients : Huile essentielle de citron, acide citrique monohydraté, jaune orangé S (E 110), stéarate de magnésium, gomme arabique, sucre glace pour un comprimé à sucer.

#### **FORME PHARMACEUTIQUE**

Comprimé à sucer, boîte de 30.

#### **CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE**

A VISEE ANTI-INFLAMMATOIRE et ANTISEPTIQUE  
(R : système respiratoire)

#### **NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT**

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

68, rue Marjolin - 92300 LEVALLOIS-PERRET-France

#### **DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament est préconisé dans les maux de gorge peu intense et sans fièvre.

#### **ATTENTION !**

#### **DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans le cas suivant :

- chez l'enfant de moins de 6 ans,
- antécédents d'allergie au biclotymol ou à l'un des composants du comprimé.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte dans la ration journalière de la quantité de sucre glace par comprimé : 1,1 g.

En cas de survenue de fièvre et/ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments...) :

#### **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

Ce médicament contient du biclotymol, du chlorhydrate de lysozyme et de l'énoxolone. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir posologie et mode d'administration.)

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

#### **GROSSESSE - ALLAITEMENT**

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

**LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :** Jaune orangé S (E 110).

#### **COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?**

#### **POSOLOGIE**

Sucre lentement les comprimés, sans les croquer. 6 à 8 comprimés à sucer par 24 heures, en répartissant les prises.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

#### **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

Sucre lentement les comprimés, sans les croquer.

Voie orale.

#### **DUREE DU TRAITEMENT**

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée.

## **EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : éruptions cutanées : dans ce cas, arrêter le traitement. SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

## **CONSERVATION**

**NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.**

## **PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION**

A conserver à une température inférieure à 25°C.

## **DATE DE REVISION DE LA NOTICE**

Mars 2005.

### **Ceci est un médicament**

- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions, vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

**Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants**