

# HEXAPNEUMINE® NOURRISSONS

## Sirop

### IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### COMPOSITION

Biclotymol ..... 0,100 g  
 Maléate de chlorphénamine ..... 0,005 g  
 Excipients : Extrait pour baume de sirop de tolu, alcool, jaune orangé S, saccharose, gomme guar, parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E 219), acide citrique monohydraté, citrate de sodium, arôme orange, eau purifiée. Pour 100 ml de sirop.

#### FORME PHARMACEUTIQUE

Sirop, flacon de 100 ml.

#### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTI-HISTAMINIQUE A USAGE SYSTEMIQUE

(R : système respiratoire).

#### NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI  
 68 rue Marjolin  
 92300 LEVALLOIS-PERRET - France

#### DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament contient notamment un antihistaminique, la chlorphénamine.

Il est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez le nourrisson jusqu'à 30 mois en particulier lorsqu'elles surviennent le soir ou pendant la nuit.

#### ATTENTION !

#### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie à l'un des constituants,
- difficultés pour uriner,
- certaines formes de glaucome (augmentation de la pression dans l'œil).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

#### MISE EN GARDE SPECIALES

**L'apparition d'une toux chez le nourrisson nécessite une consultation chez le médecin.**

- **Ne pas traiter une toux grasse par ce médicament.** Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.
- **Si la toux devient grasse,** s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, demandez l'avis de votre médecin.
- En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.
- Il conviendra de **ne pas associer un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques** (expectorant, mucolytique) à cet antitussif.

#### ATTENTION CE MEDICAMENT CONTIENT DE L'ALCOOL :

Le titre alcoolique du sirop est de 2,5% soit  
**49,5 mg d'alcool par cuillère-mesure de 2,5 ml**

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

En cas de maladie au long cours du foie ou des reins,  
 CONSULTEZ VOTRE MEDECIN afin qu'il puisse adapter la posologie.

La prise de ce médicament nécessite un AVIS MEDICAL en cas d'asthme ou de reflux gastro-œsophagien, PREVEENEZ VOTRE MEDECIN avant de donner ce médicament à votre enfant.

S'abstenir d'associer à ce traitement d'autres médicaments contenant de l'alcool.

En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenir compte dans la ration journalière de la teneur en sucre : 1,875 g par cuillère-mesure de 2,5 ml.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN**

Ce médicament contient notamment un antihistaminique, la chlorphénamine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir posologie et mode d'administration)

#### LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Saccharose (1,875 g/cuillère-mesure), alcool (49,5 mg/cuillère-mesure) et parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E 219).

#### COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

##### POSOLOGIE

RESERVE AUX NOURRISSONS (jusqu'à 30 mois).

L'apparition d'une toux chez votre nourrisson nécessite une consultation chez le médecin.

**Utiliser la cuillère-mesure de 2,5 ml fournie avec ce sirop et respectez la prescription de votre médecin.** A titre indicatif : 2 à 6 cuillères-mesure de 2,5 ml à répartir dans la journée.

**Laver la cuillère-mesure après emploi.**

**CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :**

- **IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS**
- **NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE**

#### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

VOIE ORALE.

#### FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

#### DUREE DU TRAITEMENT

Le traitement doit être court (quelques jours) et limité aux moments où survient la toux

#### CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Consultez un médecin.

#### EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

**COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINDER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :**

**Certains effets nécessitent d'ARRÊTER IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT ET D'AVERTIR UN MEDECIN :**

- **Réactions allergiques :**
  - de type éruption cutanée (érythèmes, eczéma, purpura, urticaire),
  - œdème de Quincke (urticaire avec brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une gêne respiratoire),
  - choc anaphylactique,
- Baisse importante des globules blancs dans le sang pouvant se manifester par **l'apparition ou la recrudescence d'une fièvre** accompagnée ou non de signes d'infections,
- Diminution anormale des plaquettes dans le sang pouvant se traduire par **des saignements de nez ou des gencives.**

#### D'autres sont plus fréquents :

- Somnolence, baisse de la vigilance, plus marquée en début de traitement,
- Baisse de la concentration, vertiges,
- Incoordination motrice, tremblements,
- Confusion, hallucination,
- Sécheresse de la bouche, troubles visuels, rétention d'urine, constipation, palpitations, baisse de pression artérielle.

**Plus rarement, mais notamment chez le nourrisson,** des signes d'excitation (agitation, nervosité, insomnie) peuvent survenir.

**SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE**

#### CONSERVATION

**NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR**

#### DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Septembre 2004.