

هيكسابيري

غسول للحلق معبأ تحت الضغط

يجرى قراءه كامل هذه النشرة بتمعن قبل استعمال هذا الدواء - احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون إلى قراءهها مرة أخرى. - إذا كان لديكم أسئلة أخرى أو إذا كان لديكم شك فاطلبوا مزيداً من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني. - لفتو وصف هذا الدواء لكم شخصياً. يجب عدم إعطائه لشخص آخر حتى لو كانت الأعراض المرضية متشابهة، فقد يسبب له ذلك أذى.

التعريف بالدواء

البيكلوتيومول 750 ملغ
السواغات : كحول بنزيليك، إديتات ثنائي الصوديوم، ميتيل البراين (E218)، زيت مستخلص اليناسون العطري، غليسير هيزينات الأمونيوم، سكارين صودي، سلولوز بللوري دقيق وكاربوكسي ميتيل السلولوز الصودي، ليسيتين الصويا، غليسيرين، كحول إيثيلي، ماء نقي كمية كافية لغاية 30 غ.
نترو جين (كفاز دافع).

الشكل الصيدلي

غسول للحلق. قارورة معبأة تحت الضغط سعة 30 غ.

التصنيف الدوائي العلاجي

مظهر موضعي.

اسم وعنوان المسوق

مختبرات بوشارا - ريكورداتي

68 شارع مارجولان،

92300 فالوا - بيرييه، فرنسا.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها هذا الدواء ؟

يستعمل هذا الدواء كعلاج موضعي داعم لآلام الحلق البسيطة غير المصحوبة بحمى.

انتبهوا !

ما هي الحالات التي لا يستعمل فيها هذا الدواء ؟

يجب عدم استعمال هذا الدواء في الحالات التالية :

- سوابق فرط الحساسية لأحد مكونات الدواء.

- يمنع استعمال غسولات الفم المعبأة تحت الضغط عند الرضيع

(خطر شنج الحنجرة)

عند الشك، فإتة من الضروري مراجعة الطبيب أو الصيدلاني.

تحذيرات خاصة

لا تتركوا هذا الدواء في متناول الأطفال.

العلاجه المطولة (أكثر من 5 أيام) غير مرغوب فيها إذ أنها قد تسبب اختلالاً في توازن النبت الجرثومي الطبيعي في الحلق. ينبغي تجنب استعمال عدة مطهرات معاً وبالتتابع لاحتمال حدوث تداخلات (تضاد أو تعطيل الفعالية).

احتياطات استعمال خاصة

يجب استشارة الطبيب في حال ظهور حمى أو قشع (بصاق) قيحي أو عسر في بلع الأغذية، كذلك في حال تفاقم المرض أو عدم وجود تحسن بعد 5 أيام من العلاجه.

التداخلات الدوائية وغيرها من التداخلات

لتفادي أية تداخلات دوائية محتملة ينبغي بانتظام إبلاغ الطبيب أو الصيدلاني عن كل علاج آخر قيد التناول.

هذا الدواء يحوي البيكلوتيومول. أدوية أخرى تحتوي عليه. يجب عدم المشاركة بمنتجاتها لتجنب تجاوز الجرعات القصوى الموصى بها (راجعوا كيفية الاستعمال - المقادير..).

الحمل والإرضاع

يجب عدم استعمال هذا الدواء قبل استشارة الطبيب أو الصيدلاني

من باب الحيطة، يستحسن عدم استعمال البيكلوتيومول أثناء الحمل. بصفة عامة ينبغي دائماً أثناء فترة الحمل أو الإرضاع استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

بيان بالسواغات لولا اجب معرفتها لاستعمال بدون عواقب عند بعض المرضى: ميتيل البراين (E218)

كيف يستعمل هذا الدواء ؟

المقادير

دواء مخصص للبالغ وللطفل فوق 30 شهراً من العمر

رنتان ثلاث مرات في اليوم.

كيفية الاستعمال وطريق الإعطاء

عن طريق الفم.

رجوا القارورة قبل كل استعمال

لرذ المحلول يكفي بإدارة ساعد المرذ ربع دورة

امسكوا القارورة في وضع عمودي عند الرذ.



نعم

2

1

أدر
إضغط

مدة العلاجه

يجب أن لا تتجاوز مدة العلاجه عن 5 أيام.

التأثيرات غير المرغوبة والمزعجة

مثل كل مستحضر فعال، قد يسبب هذا الدواء عند بعض الأشخاص تأثيرات نوعاً ما مزعجة.

ظو امر تحسسية محتملة: انتفاخ الشفاه، الشري، الطفح الجلدي، الحماصي، الحزب الوعائي العصبي.

و جود ميتيل البراين (E218) وليسيتين الصويا في الدواء قد يكون مصدراً لارتكاسات تحسسية.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلاني عن كل تأثير غير مرغوب أو مزعج غير مذكور في هذه النشرة.

حفظ الدواء

لا تتجاوزوا تاريخ انتهاء الصلاحيه المذكور على العبوة الخارجية.

احتياطات خاصة للحفظ

يجب عدم تعريض الدواء للحرارة.

تاريخ اخر مراجعة للنشرة

سبتمبر 2005

ان هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفه الطبيب وطريقة الأستعمال المنصوص، عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء. بنفعو ضرره.

- لا تقطع مدة العلاجه المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تعد، ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال