

Hexaspray®

Collutoire en flacon pressurisé

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION :

Biclotymol 750 mg.
Excipients : Alcool benzylique, édétate disodique, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), huile essentielle d'anis, glycyrrhizinate d'ammonium, saccharine sodique, cellulose microcristalline et carboxyméthylcellulose sodique, lécithine de soja, glycérol, alcool éthylique, eau purifiée q.s.p. 30 g. Azote (gaz propulseur).

FORME PHARMACEUTIQUE : Collutoire. Flacon pressurisé de 30g.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE : Antiseptique local.

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT :

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI
68 rue Marjolin - 92300 LEVALLOIS-PERRET - France

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement local d'appoint des maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

- Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans le cas suivant :
- En cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants du collutoire.
- Les collutoires pressurisés sont contre-indiqués chez le nourrisson (risque de laryngospasme).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

NE PAS LAISSER CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS. L'usage prolongé (plus de 5 jours) n'est pas souhaitable, car il est susceptible de modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.

L'utilisation simultanée ou successive d'antiseptiques est à éviter compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation).

PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : CONSULTER VOTRE MEDECIN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN

Ce médicament contient du biclotymol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi, posologie).

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Grossesse

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser le biclotymol pendant la grossesse.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS : Parahydroxybenzoate de méthyle (E218).

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE : RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS 30 MOIS.
2 pulvérisations 3 fois par jour.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie orale.

AGITER AVANT CHAQUE UTILISATION
Pour pulvériser, il suffit de faire pivoter la tige de l'embout d'un quart de tour
PULVERISER EN TENANT LE FLACON DEBOUT



1
Pivoter



2
Appuyer



OUI



NON

DUREE DU TRAITEMENT

Le traitement ne dépassera pas 5 jours.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : Possibilité de manifestations allergiques : œdème des lèvres, urticaire, éruptions cutanées, érythème, œdème de Quincke. La présence de parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et de lécithine de soja peut être à l'origine de réactions allergiques.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS LA NOTICE

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

Ne pas exposer à la chaleur

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : Septembre 2005

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions, vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants