

HYDROCORTISONE LEURQUIN 100 mg

Lyophilisat (flacon) et solution pour usage parentéral

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

HEMISUCCINATE D'HYDROCORTISONE

quantité correspondant à hydrocortisone 100 mg

Excipients : bicarbonate de sodium, hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté, acide phosphorique concentré.
pour un flacon

Composition du solvant : eau pour préparations injectables 2 ml
pour une ampoule

FORME PHARMACEUTIQUE : Lyophilisat et solution pour usage parentéral

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE : HORMONE GLUCOCORTICOÏDE

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT : **Laboratoires LEURQUIN MEDIOANUM**

68-88, Rue Ampère - Z.I. des Chanoux

93330 NEUILLY SUR MARNE - France

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est indiqué en cas d'insuffisance surrénale (diminution ou arrêt de la sécrétion des hormones sécrétées par les glandes surrénales).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPÉCIALES

Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser l'apparition de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle).

Prévenir votre médecin en cas d'apparition de douleur tendineuse.

Régime : il est impératif de conserver un régime normalement salé en cas d'insuffisance surrénale.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Informez rapidement votre médecin de tout facteur d'agression (fièvre, infection, maladie, intervention chirurgicale, traumatisme), car il peut être nécessaire d'augmenter les doses.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN

GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Pendant l'allaitement, ce médicament est à éviter.

SPORTIFS

Sportifs attention : cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles antidopage.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

La posologie et la durée de traitement sont variables suivant l'affection en cause. Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie intraveineuse, intramusculaire possible.

Le lyophilisat contenu dans le flacon doit obligatoirement être dissous par addition du contenu de l'ampoule de solvant. Si besoin est, on peut ultérieurement diluer la solution obtenue au moyen d'un soluté isotonique stérile. Les solutions ainsi préparées doivent être utilisées dans un délai maximum de 24 heures. Cette spécialité s'emploie par voie intraveineuse en injection lente ou en perfusion. Elle peut être utilisée par voie intramusculaire à la même posologie.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Conformez-vous à l'ordonnance de votre médecin traitant.

DURÉE DU TRAITEMENT : Elle est déterminée par le médecin traitant.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

COMME TOUT MÉDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS

Quelques cas de ruptures tendineuses ont été décrits de manière exceptionnelle, en particulier en co-prescription avec les fluoroquinolones. Rares cas de réactions allergiques générales.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE

CONSERVATION : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Avant reconstitution : A conserver à une température ne dépassant pas 30° C.

Après reconstitution : La solution doit être utilisée dans les 24 heures.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Juin 2007