نشرة دوائية | معلومات للمستعمل

أمارييل® 1 ملغ، 2 ملغ، 3 ملغ و4 ملغ أقراص

غليمبيريد

Amaryl®

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بدقة قبل أخذ هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك

- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجددا.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافية، اطرحها على الطبيب أو الصيدلي.
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تعطه أبدا إلى شخص آخر حتى إذا كانت عوارضه مماثلة لعوارضك لأنه قد يؤذيه.
- إذا أصبت بأي تأثيرات جانبية، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة.

في هذه النشرة:

1. ما هو أمارييل وما هي دواعي استعماله
2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أخذ أمارييل
3. كيف يُؤخذ أمارييل
4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة
5. كيف يُحفظ أمارييل
6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

1. ما هو أمارييل وما هي دواعي استعماله

الفئة الدوائية العلاجية

أمارييل هو دواء يخفّض سكر الدم يُؤخذ عن طريق الفم ويبتلع إلى مجموعة من الأدوية تخفض مستويات السكر في الدم تدعى السلفونيل يوريا. يعمل أمارييل عبر زيادة كمية الأنسولين التي يطلقها البنكرياس. ومن ثمّ يخفض الأنسولين مستويات السكّر في دمك.

دواعي الاستعمال العلاجية

لماذا يُستعمل أمارييل:

- يُستعمل أمارييل لعلاج نوع معيّن من السكّري (داء السكري من النوع الثاني) عندما لم تكف الحمية الغذائيّة والتمارين الرياضية وفقدان الوزن للتحكم بمستويات سكّر الدم.

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أخذ أمارييل

موانع الاستعمال

لا تأخذ أمارييل واعلم الطبيب:

- إذا كنت تعاني من حساسيّة ضدّ الغليمبيريد، أو مركّبات سلفونيل يوريا أخرى (أدوية تخفّض سكر الدم في السلفاميدات) أو أدوية السلفوناميد (أدوية تعالج عوارضك الخ) الكبريتية مثل السلفاميدوكزازول) أو أي مركّب آخر من مركّبات هذا الدواء (المذكورة في القسم 6).
- إذا كنت تعاني من داء السكري المعتمد على الأنسولين (داء السكري من النوع 1).
- إذا كنت تعاني من الحماض الكيتوني السكري (مضاعفة من مضاعفات السكري يرتفع فيها مستوى الحمض في جسمك وقد تسبّب بعض العوارض التالية: تعب وغثيان وتيبّوس منكرّر وتيبّس عضلي).
- إذا كنت في غيبوبة السكري.
- إذا كنت مصاباً بعرض كيدي خطير.
- إذا كنت مصاباً بعرض كبدي خطير.
- إذا كنت مصاباً بمرض كبدي خطير.

لا تأخذ هذا الدواء إذا كانت إحدى الحالات أعلاه تنطبق عليك. في حال الشكّ، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أمارييل.

محاذير مناسبة للاستعمال؛ تحذيرات خاصة

تحذيرات ومحاذير

تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ دوائك إذا:

- كنت تعاني من جرح أو من جراحة أو من حالة خمج مصحوبة بالحمى أو من أيّ شكل آخر من الضغط، أعلم الطبيب لأنّه قد يكون من الضروري تغيير العلاج تغييراً مؤقّتاً.
- كنت تعاني من اضطراب خطير في الكبد أو الكليتين.

إذا لم تكن متأكّداً ممّا إذا كانت إحدى هذه الحالات تنطبق عليك، تحدّث إلى الطبيب أو إلى الصيدلي قبل أخذ أمارييل.

يمكن أن يحصل انخفاض في مستويات السكّر في الدم (فقر الدم الانحلالي) لدى المرضى الذين يفتقرون إلى الإنزيم نازعة هيدروجين الغلوكوز – 6- فوسفات.

المعلومات المتوافرة حول استعمال أمارييل لدى المرضى ما دون 18 عامًا محدودة. لذلك، لا يُنصح باستعماله لدى هؤلاء المرضى.

معلومات مهمة حول نقص سكر الدم (انخفاض مستوى السكر في الدم)

عندما تأخذ أمارييل، قد تتعرّض لنقص سكّر الدم (انخفاض مستوى السكّر في الدم). الرّجاء راجع الفقرة أدناه لتحصل على معلومات إضافيّة حول نقص سكّر الدم وعوارضه وعلاجه.

يمكن أن تزيد العوامل التالية من خطر التعرّض لنقص سكّر دمك:

- نقص التغذية، عدم انتظام أوقات الوجبات، تغويت وجبات أو تأخيرها أو عدم انتظام في تناول الطعام.
- تغييرات في النظام الغذائي.
- أخذ أقراص أمارييل أكثر من حاجتك.
- ضعف في الوظيفة الكلويّة.
- ضعف في الوظيفة الكبديّة.
- مرض خطير في الكبد.
- إذا كنت تعاني من بعض الاضطرابات الهرمونيّة (مثلاً اضطرابات في الغدّة الدرقيّة أو الغدّة النخاميّة أو قشرة الغدّة الكظريّة).
- شرب الكحول (بخاصة عند تغويت وجبة).
- أخذ بعض الأدوية الأخرى (راجع فقرة «الأدوية الأخرى وأمارييل»).
- إذا زدت التمارين الرياضيّة التي تقوم بها وإذا كنت لا تأكل ما يكفي من الطعام أو إذا كنت تأكل طعامًا يحتوي على كمية كربوهيدرات أقلّ من المعتاد.

تتضمّن عوارض نقص سكر الدم ما يلي:

- شعور مفاجئ بالجوع، عياء، عثيان، تقيّؤ، خمول، تعاس، اضطرابات في النوم، عدم راحة، عدائيّة، صعوبة في التركيز، ضعف في الانتباه وفي الاستجابة، بطء في التفاعل، اكتئاب، تشوّش ذهني، اضطرابات في النطق والبصر، تلعثم في الكلام، رُعاش، شلل جزئي، اضطرابات حسيّة، دوار، الشعور بحذر.
- يمكن حصول العوارض التالية أيضًا: تعرّق كليب، بشرة دبقة، قلق، تسارع دقّات القلب، ارتفاع ضغط الدم، خفقان، ألم مضايق وقويّ في الصدر قد ينتشر إلى مناطق مجاورة (ذبحة صدريّة) واضطرابات في النظم القلبي).

إذا استمرّت مستويات السكّر في دمك بالانخفاض، قد تصاب بتشوّش ذهني كبير (هذيان) وباختلاجات وبفقدان السيطرة على الذات وقد يصبح نفَسك سطحيًا وتتباطأ ضربات قلبك وتفقد الوعي. قد تشبه الصورة السريريّة لنقص سكّر الدم حالة الجدة السكتة الدماغيّة.

طريقة أخذ هذا الدواء

- خذ هذا الدواء عن طريق الفم قُبيل الوجبة الأساسية الأولى في اليوم أو معها (المتناول عادة).
- إذا كنت لا تأخذ المنظور يجب عليك أخذ الدواء في الوقت المحدد حسب وصفة الطبيب.
- من المهم عدم تفويت أيّ وجبات عندما تأخذ أمارييل.
- إبلع الأقراص كاملة مع نصف كوب من الماء، على الأقلّ. لا تسحق الأقراص أو تمضغها.

مقدار الجرعة

يتوقّف مقدار جرعة أمارييل على حاجاتك ويحدده طبيبك بناء على مستويات السكّر التي تُظهرها فحوصات الدم والبول المخبريّة. لا تأخذ أقراصًا أكثر من تلك التي وصفها طبيبك.

- تبلغ جرعة البداية العادية قرصًا واحدًا من أمارييل 1 ملغ مرّة واحدة في اليوم.
- عند الضرورة، يمكن أن يزيد الطبيب الجرعة بعد أسبوع إلى أسبوعين من العلاج.
- تبلغ الجرعة القصوى الموصى بها 6 ملغ من أمارييل في اليوم.
- يمكن البدء بالعلاج بجمع ما بين الغليمبيريد والمتفورمين أو الغليمبيريد والأنسولين. في هذه الحالة، سوف يحدّد طبيبك جرعات كل من الغليمبيريد أو المتفورمين أو الأنسولين التي تحتاج إليها.
- إذا تغيّر وزنك أو إذا تغيّرت نمط حياتك أو إذا كنت تخضع لضغط ما، قد يكون من الضروري تعديل جرعة أمارييل. لذلك، أعلم طبيبك.
- إذا شعرت أن مفعول دوائك ضعيف جدًا أو قويّ جدًا، لا تغيّر الجرعة من تلقاء نفسك بل استشر الطبيب.

إذا أخذت كمية مفرطة من أمارييل

إذا أخذت جرعة مفرطة أو إصابتك من أمارييل تتعرّض لخطر الإصابة بنقص سكّر الدم (عوارض نقص سكّر الدم راجع القسم 2). لذلك، يجب عليك أن تستهلك على الفور كمية كافية من السكر (مثلاً مكعّب سكّر أو عصير حلو أو شاي محلّى) وأعلم الطبيب على الفور. عند علاج نقص سكّر الدم إذا أخذ طفل ما الدواء عن طريق الخطأ، يجب التحقق بدقة من كمية السكر التي أخذها الطفل لتفادي إمكانيّة فرط سكّر الدم الذي يكون خطيرًا. لا ينبغي إعطاء شخص فاقد الوعي طعامًا أو شرابًا.

بما أنّ نقص سكّر الدم قد يدوم لبعض الوقت، يجب مراقبة المريض بدقّة إلى أن يزول الخطر. قد يكون من الضروري إدخال المريض المستشفى على سبيل الحيطة كذلك. أثر الطبيب العلية أو الأقراص الباقية. كي يعرف الكمية التي تمّ أخذها.

قد يتراوح نقص سكّر الدم الخطير مع فقدان الوعي ومع شلل عصبيّ خطير وهائل هذا حالتان طبيّتان طارئتان تتطلّبان علاجًا طبيًا فوريًا ودخول المستشفى. تأكّد دائمًا من أنّ أحد الأشخاص حولك يعرف ونصفك الصحي لكي يتصل بالطبيب عند حصول حالة طارئة.

إذا نسيت أخذ أمارييل

إذا نسيت أخذ جرعة، لا تأخذ جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة التي نسيتها.

إذا توقّفت عن أخذ أمارييل

إذا فكّرت العلاج أو أوقفته يجب أن تعرف أنّه لا يعود من الممكن الحصول على المفعول المخفّض لسكر الدم وقد يتفاقم داء السكري الذي تعاني منه. استمرّ بأخذ أمارييل إلى أن يقلب منك الطبيب التوقّف عن أخذه. إذا كان لديك أيّ أسئلة إضافيّة حول استعمال هذا الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة

مثل الأدوية كلّها، قد يسبّب هذا الدواء تأثيرات جانبيّة لا تصيب المرضى كلّهم.

أعلم الطبيب على الفور إذا أصبت بأحد العوارض التالية :

- ارتكاسات تحسسيّة (تتضمّن التهاب الأوعية الدمويّة وغالبًا طفحًا جلديًا).

قد تتفاقم هذه الارتكاسات وتسبّب صعوبة في التنفّس وهبوطًا في ضغط الدم وتتطوّر لكي تصبح صدمة حتّى.

- اضطراب في وظيفة الكبد يتضمّن اصفرار البشرة والعينين (يرقان) ومشاكل في دفق المرّة (زكود الصفراء)، التهاب الكبد أو قصور الكبد.
- عوارض حساسيّة جلديّة (طفح حساسيّ) مثل الحكّة والطفح والشّرى وزيادة الحساسيّة تجاه الشمس. قد تتفاقم بعض الارتكاسات التحسسيّة المعتدلة وتصبح ارتكاسات خطيرة.
- نقص سكر حاد مع فقدان وعي أو نوبات أو سبات.

أصيب بعض المرضى بالتأثيرات الجانبيّة التالية في خلال فترة أخذهم أمارييل:

التأثيرات الجانبيّة النادرة (تصيب مريضًا واحدًا على الأكثر من أصل 1000 مريض)

- نسبة سكر الدم أدنى من النسبة الطبيعيّة (تنقص سكر الدم) (راجع القسم 2).
- انخفاض في عدد خلايا الدم:
- صفيحات الدم (مما يزيد خطر النزف أو الارتفاق).
- كريات الدم البيضاء (مما قد يزيد نسبة التعرّض للإصابات خمج).
- كريات الدم الحمراء (مما قد يجعل بشرتك تبدو أكثر شحوبًا ويسبّب التعب أو صعوبة في التنفّس).

بشكل عام، تتحسّن هذه المشاكل بعد التوقّف عن أخذ أمارييل.

التأثيرات الجانبيّة النادرة جدًا (تصيب مريضًا واحدًا على الأكثر من أصل 10000 مريض)

- ارتكاسات تحسسيّة (تتضمّن التهاب الأوعية الدمويّة وغالبًا طفحًا جلديًا).

قد تتفاقم هذه الارتكاسات لتصبح طفحًا وتسبّب صعوبة في التنفّس وهبوطًا في ضغط الدم وصدمة حتّى. إذا أصبت بأحد هذه العوارض، **أعلم الطبيب على الفور.**

- اضطرابات في وظيفة الكبد تتضمّن اصفرار البشرة والعينين (يرقان) ومشاكل في دفق المرّة (زكود الصفراء)، التهاب الكبد أو قصور الكبد. إذا أصبت بأحد هذه العوارض، **أعلم الطبيب على الفور.**
- غثيان، تقيّؤ إسهال، الشعور بالانتفاخ أو بالتخمة، ألم في البطن.
- انخفاض في كميّة الصوديوم في دمك (تُظهره فحوصات الدم).

التأثيرات الجانبيّة الأخرى بما يلي:

قد تحصل عوارض حساسيّة جلديّة (طفح حساسيّ) مثل الحكّة الطفح والشّرى وزيادة الحساسيّة تجاه الشمس. قد تتفاقم بعض الارتكاسات التحسسيّة المعتدلة لتصبح طفحًا جلديًا مع تقيّؤ وتوتّر الشعور المتفشّي أو الحلق أو اللسان. لذلك إذا أصبت بأحد هذه التأثيرات الجانبيّة، **أعلم الطبيب على الفور.**

قد تحصل ارتكاسات تحسسيّة مع أدوية السلفونيل يوريا والسلفوناميد. أو الأدوية ذات الصلة.

قد تحصل اضطرابات بصريّة عندما تعالج بأمارييل بسبب التغييرات في مستويات سكّر الدم ويجب أن تتحسّن هذه الاضطرابات سريعًا.

- زيادة في تَرِيعات الكبد.
- نزف أو ارقاقٌ حاد غير طبيعي تحت الجلد.

الافادة عن التأثيرات الجانبية

إذا عانَيْتَ أيّ تأثيرات جانبيّة، أعلم الطبيب أو الصيدلي أو المرض(ة). ويتضمّن هذا أيّ تأثيرات جانبيّة محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. بالإفادة عن التأثيرات الجانبيّة، يمكنك المساعدة على توزيد المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيف يُحفظ أمارييل

إحفظ الدواء بعيدًا عن نظر الأطفال ومتناولهم.

لا تستعمل الدواء بعد انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحيّة المدوّن بعد كلمة 'EXP' على الظّرف وعلبة الكرتون. يشير تاريخ انتهاء الصلاحيّة إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

أقراص أمارييل 1 ملغ و2 ملغ و3 ملغ و4 ملغ: لا تحفظها بأيّ حرارة فوق 30 درجة مئويّة.

إحفظ الدواء في علبته الأصليّة لحمايته من الرطوبة.

لا تستعمل هذا الدواء إذا لاحظت إشارات تلف ظاهرة.

لا ينبغي رمي الأدوية في المياه المبتذلة أو مع النفايات المنزليّة. اطلب من الصيدلي التخلّص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

ماذا يحتوي أمارييل

- المادة الفاعلة هي الغليمبيريد.

يحتوي كلّ قرص على 1 ملغ أو 2 ملغ أو 3 ملغ أو 4 ملغ من الغليمبيريد حسب العيار المدوّن على الظرف وعلبة الكرتون.

- المركّبات الأخرى هي لاكتوز وحيد التميّه، غليكولات نشا الصوديوم (النوع أ)، سيتارات المغنيزيوم، سيلولوز دقيق البلورية، بوفيدون 25000.
- تحتوي الأقراص كذلك على مواد ملوّنة:
- الأقراص الـ 1 ملغ تحتوي على أكسيد الحديد الأحمر (إي 172).
- الأقراص الـ 2 ملغ تحتوي على أكسيد الحديد الأصفر (إي 172) ولك الألومنيوم النيلي القرمزي (إي 132).
- الأقراص الـ 3 ملغ تحتوي على أكسيد الحديد الأصفر (إي 172).
- الأقراص الـ 4 ملغ تحتوي على لك الألومنيوم النيلي القرمزي (إي 132).

كيف هو شكل أمارييل ومحتويات العلبة

كلّ قرص من أمارييل هو مستطيل الشكل مع خطّ للقطع من الجهتين. يمكن قطع الأقراص الى نصفين متساويين.

الأقراص مختلفة الألوان:

- أقراص الـ 1 ملغ زهريّة اللون.
- أقراص الـ 2 ملغ خضراء اللون.
- أقراص الـ 3 ملغ لونها أصفر ياهت.
- أقراص الـ 4 ملغ لونها أزرق فاتح.

تأتي الأقراص في علب ظروف من 30 و120 قرصًا.

قد لا تكون أحجام العلب كلها مسوّقة.

الشركة حاملة رخصة التسويق والشركة المصنّعة

حامل رخصة التسويق:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
65926 Frankfurt am Main, Germany

الشركة المصنّعة:

Sanofi-Aventis S.p.A.
Strada Statale 17, Km 22
67019 Scoppito (L'Aquila), Italy

تاريخ المراجعة الأخيرة لهذه النشرة: تشرين الأوّل 2013.

من هذا الدواء

مستحضر يوثر على صحتك و استعماله خلال التجارب يعرفك لمخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و في نفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج و المحدودة الذ من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء دون استشارة الطبيب.
- لا تشرك الادوية في متناول الاطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
و اتحاد الصيدالنة العرب.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.

علاج نقص سكر الدم:

في الكثير الحالات، تختفي عوارض نقص سكّر الدم بسرعة كبيرة بعد استهلاك السكر مثلاً مكعّبات السكر أو شراب حلو أو شاي محلّى.

لذلك يجب عليك دائمًا أخذ شكل من أشكال السكر معك (مثلاً مكعّبات سكر). والجدير ذكره أن المحلّيات الاصطناعيّة غير فعّالة. اتصل بالطبيب أو اذهب إلى المستشفى في حال لم يساعدك أخذ السكر أو في حال عاودتك العوارض.

الفحوصات المخبرية

يجب التحقق بانتظام من مستوى السكّر في دمك، قد يطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دم لمراقبة تعداد خلايا الدم والوظيفة الكبديّة لديك.

الأطفال والمراهقون

لا يُنصح باستعمال أمارييل لدى الأطفال ما دون الثامنة عشرة من العمر.

الأدوية الأخرى وأمارييل

أعلم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ حاليًا أو أخذت مؤخّرًا أو إذا كان من المحتمل أن تأخذ أيّ أدوية أخرى.

قد يُضطرّ طبيبك إلى تغيير الجرعة التي تأخذها من أمارييل إذا كنت تأخذ أدوية أخرى لأنها قد تضعف أو تقوّي مفعول أمارييل على مستوى السكّر في دمك.

يمكن للأدوية التالية أن تزيد المفعول المخفض لسكر الدم لأمارييل مما قد يؤدي إلى خطر التعرّض لنقص سكّر الدم (إنخفاض مستوى السكّر في الدم):

- أدوية أخرى لعلاج داء السكري (مثل الأنسولين أو المتفورمين)
- أدوية علاج الألم أو الالتهاب (الفينيلبوتازون، الأوكسيفينبوتازون، الأدوية الشبيهة بالأسبرين).
- أدوية علاج حالات الخمج البوليّة (مثل بعض أدوية السلفوناميد الطويلة المفعول)
- أدوية علاج حالات الخمج البكتيرية والفطرية (التتراسيكلين، الكلورامفينيكول، الفلوكونازول، الميكونازول، الكيتوكونازول، الكلاريثروميسين).
- الأدوية المثبّطة لتخثّر الدم (مشتقات الكومرين مثل الوارفارين).
- الأدوية التي تعزّز بناء العضلات (الإيثانيثلون).
- الأدوية المستعملة لعلاج البديل من الهورمون الجنسي الذكري.
- أدوية علاج الاكتئاب (الفلوكسيتين، مثبّطات أكسيداز المَنين الأحادي).
- الأدوية المخفّضة لمستويات الكولسترول العالية (الفيبرات).
- الأدوية المخفّضة لضغط الدم العالي (مثبّطات الأنزيم المحوّل للأنجيوتنسن).
- الأدوية المسبّاة مضادات اللانظمية المستعملة للتحكّم بعدم انتظام ضربات القلب (البروبيرامید).
- أدوية علاج التقرّس (الأوبيوريتول، البروبينيسيد، السلفينبيرازون).
- أدوية علاج السرطان (السيكلوفوسفامید، الإيفوسفامید، التروفوسفامید).
- الأدوية المستعملة لتخفيض الوزن (الفنفلورامين).
- الأدوية المستعملة لتحسين الدوران عندما تُحقن داخل الوريد بجرعات عالية (البنتوكسيفيلين).
- أدوية علاج الحساسيات الأنفيّة مثل حمى القش (الترتيوكلاتين).

الأدوية المسبّاة حالات الوذي لعلاج عوارض ضغط الدم المرتفع والقصور القلبي واضطراب البروستات.

يمكن للأدوية التالية أن تُضعف المفعول المخفّض لسكّر الدم لأمارييل مما قد يؤدّي إلى خطر التعرّض لفرط سكّر الدم (ارتفاع مستوى السكّر في الدم):

- الأدوية التي تحتوي على الهورمونات الجنسيّة الأنثويّة (الأستروجين، المركّبات البروجستينيّة المعمول).
- أدوية مدرّة البول (مدرّات البول من الثيازايد).
- الأدوية المستعملة لتنشيط الغدّة الدرقية (مثل الليفوثيروكسين).
- أدوية علاج الحساسيّة والالتهاب (الشفرانات السكريّة).
- أدوية علاج الاضطرابات العقليّة الحادة (الكلوربرومازين ومشتقّات فينوثيازين أخرى).
- الأدوية المستعملة لزيادة سرعة القلب وبطاء الربو واحتقان الأنف والسعال والزكام، والأدوية المستعملة لخسارة الوزن أو تلك المستعملة في الحالات الطارئة التي تهدّد الحياة (الأدرينالين ومقلّدات الودي).
- أدوية علاج مستويات الكولسترول المرتفعة (حمض النيكوتينيك).
- الأدوية المستعملة لأمد طويل لعلاج الإسهالات (المهلّدات).
- أدوية علاج الصرع (الفينيتوين).
- أدوية علاج التوتّر واضطرابات النوم (البانزوديزبّات).
- أدوية علاج الضغط المنزايد داخل العين (الأزيتازولاميد).
- أدوية علاج ضغط الدم المرتفع أو انخفاض نسبة سكّر في الدم (الديازوكسيد).
- أدوية علاج حالات الخمج ومرض السلّ (الريفامبيسين).
- أدوية علاج نقص سكر الدم الحاد (الغلوكاغون).

يمكن للأدوية التالية أن تزيد أو تُضعف المفعول المخفّض لسكّر الدم لأمارييل:

- أدوية علاج القرحة المعدّية (تُسمّى مضادات إيتش 2 H2).
- أدوية علاج ضغط الدم المرتفع أو القصور القلبي من حاصرات البيتا والكلونيدين والفينوثييدين والرزربين. يمكن لهذه الأدوية أيضًا إخفاء عوارض نقص سكر الدم لذلك يجب اعتماد حذر خاص عند أخذ هذه الأدوية.

يمكن لأمارييل زيادة أو إضعاف مفعول الأدوية التالية:

- الأدوية المثبّطة لتخثّر الدم (مشتقات الكومرين مثل الوارفارين).

الكلوبيملايد دواء يستعمل لتخفيض الكوليستيرول لديه تأثير على امتصاص أمارييل. لتفادي هذا الاثر يجب عليك اخذ أمارييل قبل تناول الكلوبيملايد بأربع ساعات على الاقل.

أخذ أمارييل مع الطعام والشراب والكحول

يمكن لاستهلاك الكحول أن يزيد، أو أن يخفّض مفعول أمارييل المخفّض لسكر الدم بطريقة لا يمكن توقّعها.

الحمل والارضاع

الحمل

لا ينبغي أخذ أمارييل في خلال فترة الحمل. استشيري الطبيب إذا كنت حاملاً أو تعتقدين نفسك حاملاً أو كنت تنوين الحمل.

الارضاع

يمكن أن يمرّ أمارييل إلى حليب الثدي. لا ينبغي أخذ أمارييل في خلال فترة الإرضاع. استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أيّ دواء.

قيادة السيارات واستعمال الآلات

قد تضعف قدرتك على التركيز أو التفاعل إذا انخفض مستوى السكر في دمك (نقص سكر الدم) أو ارتفع (فرط سكر الدم) أو إذا كنت تعاني من مشاكل في البصر كتتبعة لهاتين الحالتين. يجب أن تعرف أنّك قد تعرّض نفسك أو آخرين للخطر (مثلاً عند قيادة سيّارة أو استعمال آلات). استشر طبيبك حول ما كان يمكن أن تقود إذا:

- كنت كثيب باستمرار بنوبات نقص سكّر الدم.
- إذا كانت عوارض نقص سكر الدم قليلة أو غائبة.

يحتوي أمارييل على اللاكتوز

إذا قال لك طبيبك إنّك لا تستطيع تحمّل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل أخذ هذا الدواء.

3. كيف يُؤخذ أمارييل

خذ أمارييل دائمًا حسب وصفة الطبيب تمامًا. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكّدًا.