

أيسوتركسين نشرة معلومات للمريض

يرجى قراءة هذه النشرة قبل البدء في استعمال أيسوتركسين إذا كانت هناك أي معلومات غير مفهومة أو إذا كنت تزيد المزيد من المعلومات أو المشرورة يرجى مراجعة الطبيب أو الصيدلاني.

ما هي محتويات أيسوتركسين؟

يحتوي أيسوتركسين على إريبوسيروميسين 2% وأيميريتين 0.05% في الجل. بعد استعمال أيميريتين مماثلاً للبنادق، حيث أنه يؤثر على خلايا الجلد ويهدى القالب أقل مرحلة لاستساد المسمم، وبالتالي يمنع تكون البقع، إريبوسيروميسين مسكن جندي فعال ضد البكتيريا التي تساعد على تكون حب الشباب، أيميريتين يحمي أيضاً على إريبوسيروميسين هيدروكسيسيلى وأمين هيدروكسيسيلى بيبوتين.

أيميريتين متواجد في أنابيب تضمن على 30 جم يتم تزويدها من قبل:

ستيفيل لبروريز(المملكة المتحدة) ليمتد
هولتسبير لندن
ويوجن جردن
هي ووكوك
بكش إتش بي 10 آب يو

ذريخن المنتج رقم: 0174/0204
هذا الدواء لا يصرف إلا بوصفة طبية
رقم التسجيل: 144/37

هذا المنتج يتم تضمينه من قبل ستيفيل لبروريز(إيرلندا) ليمتد

ما هي استخدامات أيسوتركسين وكيف يعمل؟

يستخدم أيسوتركسين في علاج حب الشباب، حيث أنه يساعد على:
- تقليل نسبة الدهون بالبشرة
- عدم انتشار البكتيريا ذات الرؤوس السوداء والبيضاء وبالتالي يسهل إزالتها
- إيقاف تكون البقع والبثور ذات الرؤوس السوداء والبيضاء
- تقليل البكتيريا المسببة لحب الشباب
- تقليل عدد بقع حب الشباب الحمراء المنوية

قبل استعمال أيسوتركسين

أيسوتركسين قد لا يكون العلاج المناسب لبعض الأشخاص إذا كانت أجوبتك زناعمه على أي سؤال من الآتي التالي يرجى مراجعة الطبيب أو الصيدلاني قبل البدء في استعمال المنتج
- هل لديك حساسية لأي من مكونات أيسوتركسين المذكورة أعلاه?
- هل تستخدم أي علاج آخر لحب الشباب ولبيك لا يعلم بذلك?
- هل أنت حامل أو تخوضين ذلك?
- هل أنت مرضعة؟

تاريخ إعداد النشرة

يجب إبعاد أيسوتركسين عن عينيك وشفتيك، وأن مناطق بها تهيج لديك مثل الأماكن التي بها تقطنات أو كشكش أو حرقوق شمسين أو إكزيما.

أثناء فترة الحفاظ على أيسوتركسين يرجى عدم تعریض أجزاء البشرة التي يتم علاجها للشمس لفترة طويلة، كما يجب عليه تجنب استخدام مستحضرات التجميل.

كما هو الحال بالنسبة لبعض الأدوية يجب إبعاد أيسوتركسين بعيداً عن متناول الأطفال.



يجب استعمال أيسوتركسين مرة أو مرتين في اليوم سوف يخبرك طبيبك بالجرعة الملائمة.

تشتمل كمية قليلة من الجل بطراف أصابعه بدبب وضع طبقة رقيقة على كل المنطقة التي بها حب الشباب في بطيء ولكن فقط على كل مكان، وكمالية يمكن الاستمرار بها فإن كمية يقدر طرف الإصبع من الجل (كثافة الجل التي يتم إدخالها من الأصابع) تختلف من الماء لكنني انتظرة الريح والظهور، إن كان الجل لا ينحل دعك على الجسم فهو يعني أنه تستخدمن كمية أكثر من الماء، أفضل ودائع بعد استعمال الجل

معلومات أخرى عن استعمال أيسوتركسين

قد تختلف من 6 إلى 8 أسابيع قبل أن ترى الأذى الكافلة لـأيسوتركسين على جب الشباب، ينصح ذلك أمراً لم يعيها بالنسبة لعلاج حب الشباب يجب عليك استمار في الملاج لمدة 3 أشهر على الأقل إلا إذا ملأ منه الطبيب خلاف ذلك.

يجب إزالة المكياج جيداً قبل وضع الجل بعد أن يجف الجل يمكنك استخدام مكياج غير دهني
الأذى غير المرغوب فيه

قد يسبب أيسوتركسين لبعضاً بسيطاً ويجعلك تشعر بان بشرتك داكنة، لامبساً عند وضعه للمرة الأولى، وقد تلاحظ أيضاً تغيراً واحداراً الجلد خلال الأسابيع الأولى من استعماله، ولكن هذه آثار طبيعية فإذا شعرت بالقلق من ذلك حاول تقليل مرات استعمال المنتج لفترة من الزمن أو التوقف بضعة أيام ثم حاول مرة أخرى.

إذا كنت تعانى من حرقة شديدة أو تقرّب أو حكة أو أية آثار أخرى غير مذكورة في هذه النشرة يجب عليك التوقف عن استعمال أيسوتركسين واستشارة الطبيب.

شروط الخذون

يجب تخزين أيسوتركسين في درجة حرارة الغرفة (أقل من 25 درجة مئوية).

تاريخ انتهاء الصلاحية مطبوع على الأنابيب والعلبة لا يستخدم الجل بعد هذا التاريخ

الحصول على المزيد من المعلومات

إذا كان لديك أي استفسار عن أيسوتركسين أو إذا لم تكن متأكدة من أي معلومات واردة في هذه النشرة يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلاني.