

Essentiale® FORTE 300 mg

إيسينسيال® فورت 300 ملغ

شحوم هوفسورية من فول الصويا
كيسولات صلبة

اقرأ كامل هذه النشرة بدقة لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

- انتظف يديك هذه النشرة قبل تحتاج إلى قرائتها جيداً.
- اسأل الصيدلاني في حال كنت تحتاج إلى المزيد من المعلومات أو النصائح.
- يجب عليك استشارة الطبيب في حال ساءت أعراضك أو لم تتحسن بعد أيام قليلة.
- في حال أصبح أحد التأثيرات الجانبية خطيراً أو في حال لاحظت تغيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلاني.

في هذه النشرة،

1. ما هي الكيسولات الصلبة إيسينسيال فورت 300 ملغ وما هي دواعي استعمالها
2. قبل أن تأخذ الكيسولات الصلبة إيسينسيال فورت 300 ملغ
3. كيف تؤخذ الكيسولات الصلبة إيسينسيال فورت 300 ملغ
4. التأثيرات الجانبية المحتملة
5. كيف تُحفظ الكيسولات الصلبة إيسينسيال فورت 300 ملغ
6. معلومات إضافية

1. ما هي الكيسولات الصلبة إيسينسيال فورت 300 ملغ وما هي دواعي استعمالها

إيسينسيال فورت 300 ملغ هو دواء عضلي لأعراض الكبد. يستعمل إيسينسيال فورت 300 ملغ لتحسين الأعراض الناتجة من فقدان الشهية أو شعور بالضعف في الجزء الأعلى الأم من البطن، لدى المرضى الذين يعانون من ضرر في الكبد بسبب مواد موزونة للكبد وسبب نظام غذائي سيئ (تأثيرات سامة لبعض الأطعمة) ولدى المرضى الذين يعانون من التهاب مزمن في الكبد (التهاب الكبد).

2. قبل أن تأخذ الكيسولات الصلبة إيسينسيال فورت 300 ملغ

لا تأخذ الكيسولات الصلبة إيسينسيال فورت 300 ملغ

إذا كنت مصاباً بحساسية معروفة ضد مستحضرات تحتوي على فول الصويا أو ضد أي مركب آخر من مركبات هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على زيت الصويا، لذلك يمكن أن يسبب في حالات نادرة ارتكاسات تحسسية حادة.

اعتمد عناية خاصة مع إيسينسيال فورت 300 ملغ

- في حال ساءت الأعراض أو في حال ظهرت أعراض أخرى غير واضحة، يجب عليك استشارة الطبيب.

ليس هذا العلاج الدوائي بديلاً عن تقادي مواد مسكرة بالكبد (الكحول مثلاً).

إذا كنت تعاني من التهاب مزمن في الكبد، لا يُنظر العلاج الداعم بالشحوم الهوفسورية من فول الصويا إلا إذا لوحظ تحسن في الإشارات الذاتية لحالتك تحت العلاج.

الأطفال

لا تتوفر دراسات كافية حول استعمال إيسينسيال فورت 300 ملغ لدى الأطفال، وبالتالي لا يجوز استعماله لدى الأطفال (أقل من 12 سنة).

تناول أو استعمال أدوية أخرى

الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلاني إذا كنت تأخذ أو أخذت مؤخراً أدوية أخرى، بما فيها تلك التي حصلت عليها من دون وصفة طبية.

لا يمكن نفي حصول تفاعل بين إيسينسيال فورت 300 ملغ والأدوية التي تُشَبِّطُ تخثر الدم. وبالتالي قد يكون من الضروري تعديل مقدار جرعة هذا الدواء، لذلك إذا كنت تأخذ إيسينسيال فورت 300 ملغ في الوقت نفسه مع هذا النوع من الأدوية يجب عليك استشارة الطبيب.

الحساسات والحمل والرضعات

حتى اليوم لم يُعط الاستعمال الرائج لفول الصويا كإعلاج ذي دليل على الفعالية بمخاطره على الحمل والإرضاع. ولكن لا تتوفر دراسات كافية حول الموضوع وبالتالي لا ينصح باستعمال هذا الدواء في خلال فترة الحمل والإرضاع.

التباعدة واستعمال الآلات

ما من محاذير خاصة ضرورية.

3. كيف تُؤخذ الكيسولات الصلبة إيسينسيال فورت 300 ملغ

خذ دوائاً إيسينسيال فورت 300 ملغ كما هو مذكور في هذه النشرة تماماً. إذا كان لديك أي شك، الرجاء أن تستشير الطبيب أو الصيدلاني.

إلا إذا وصف الطبيب غير ذلك، تكون الجرعة العادية على النحو الآتي:

العمر (وزن الجسم)	الجرعة الفردية	الجرعة اليومية (الكاملة)
الأطفال (عمر من 12 سنة إلى 17 سنة)	كيسولات سلتان (600 ملغ من الشحوم الهوفسورية)	كيسولات سلتان 3 مرات في اليوم (1800 ملغ من الشحوم الهوفسورية من فول الصويا)
الأطفال (أقل من 12 سنة)	كيسولات سلتان (600 ملغ من الشحوم الهوفسورية)	كيسولات سلتان 3 مرات في اليوم (1800 ملغ من الشحوم الهوفسورية من فول الصويا)

إبلع الأقراص كاملة مع الطعام مع كمية سائل كافية (يفضّل كوب من الماء [200 مل]).

مبدئياً ما من مدة زمنية معينة لأخذ هذا الدواء. الرجاء مراجعة المعلومات الواردة في القسم 2.

الرجاء أن تستشير الطبيب أو الصيدلاني إذا كنت تعتقد أن معلول إيسينسيال فورت 300 ملغ قوي جداً أو ضعيف جداً.

إذا أخذت جرعة مفرطة من إيسينسيال فورت 300 ملغ

ما من أعراض معروفة لفرط جرعة إيسينسيال فورت 300 ملغ أو للتسمم منه.

من المحتمل حصول التأثيرات الجانبية المذكورة أدناه ولكن بحدّة أكبر في هذه الحالة. الرجاء أن تعلم الطبيب الذي يمكنه أن يقرّر ما إذا كان من الضروري اتخاذ أي إجراءات.

إذا نسبت أخذ إيسينسيال فورت 300 ملغ

إذا أخذت القليل من إيسينسيال فورت 300 ملغ أو نسيت أخذ جرعة، لا تأخذ جرعة مضاعفة بل المزمّة المقبلة بل واصل أخذ هذا الدواء حسب وصفة الطبيب أو حسب ما هو مذكور في النشرة الدوائية.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، الرجاء أن تستشير الطبيب أو الصيدلاني.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل الأدوية كلها قد يسبب إيسينسيال فورت، 300 ملغ تأثيرات جانبية لا تُصيب المرضى كالمثل.

تستعمل لفئات التالية لتحديد عدد مرات حصول التأثيرات الجانبية:

التأثيرات الشائعة جداً، أكثر من مريض واحد من أصل 10 مرضي معالجين.
التأثيرات الشائعة، من مريض إلى 10 مرضي من أصل 100 مريض معالج.
التأثيرات غير الشائعة، من مريض إلى 10 مرضي من أصل 1000 مريض معالج.
التأثيرات النادرة، من مريض إلى 10 مرضي من أصل 10000 مريض معالج.
التأثيرات النادرة جداً، أقل من مريض من أصل 10000 مريض معالج.
التأثيرات غير المعروفة، لا يمكن تحديد عدد مرات الحصول استناداً إلى المعلومات المتوفرة

العوارض أو التأثيرات الجانبية المهمة التي يجب عليك الانتباه إليها والتدابير التي يجب اتخاذها في حال الإصابة بتأثير جانبي،

بصورة غير شائعة، يمكن حصول اضطرابات هضمية مثل اضطرابات في المعدة أو براز رخو أو إسهال.

نادراً جداً، يمكن حصول ارتكاسات تحسسية مثل الطفح الجلدي أو الحرق.

يمكن حصول هرائش (حكة) ولكن عدد مرات حصوله غير معروفة.

إذا لاحظت أنك مصاب بأي من التأثيرات الجانبية المذكورة أعلاه، لا سيما الارتكاسات التحسسية، تتوقف عن أخذ إيسينسيال فورت 300 ملغ وأعلم الطبيب لكي يحدد حدة التأثير الجانبي ويقرّر ما إذا كان من الضروري اتخاذ أي إجراءات.

إذا تفاقم أحد التأثيرات الجانبية المذكورة أعلاه أو إذا لاحظت تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلاني.

5. كيف تُحفظ الكيسولات الصلبة إيسينسيال فورت 300 ملغ

احفظ هذا الدواء بعيداً من متناول الأطفال وانظرهم.

يجب التوقف عن استعمال هذا الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المطبوع على العبوة والعلبة بعد كلمة "EXP" . يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

شروط الحفظ،

احفظ الدواء في حرارة ما بين 25 درجة مئوية.

احفظ الدواء في عبوة الأصلية لحماية المحتويات من الرطوبة.

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي إيسينسيال فورت 300 ملغ،

300 ملغ من شحوم الصويا الهوفسورية المنبّهة المنزوعة الزيت.

المركبات الأخرى في إيناتول 96%، شحم صلب، زيت الصويا (مستور الصيغة الأوروبية)، زيت الخروع المهدرج،

فانيلين الإيثيل، إينسيل، أسيتازيتول، ألفا-توكوفيرول، حامد، مادة ملونة E171، سلفات ديسيل الصوديوم، ماء منقى.

كيف هو شكل إيسينسيال فورت 300 ملغ ومحتويات العبوة،

علبة معيارية تحتوي على 50 كبسولة صلبة.

الشركة المصنعة

A. Nattermann & Cie. GmbH
Nattermannallee 1
50829 Cologne
Germany

تاريخ المراجعة الأخيرة لهذه النشرة، آب / أغسطس 2009.

ان هذا الدواء

مستحضر يور على صحتك واستهلاكه خلاف التعليمات يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة استعمال المنتجوس عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

• الطبيب أو الصيدلي هما المسؤولان في الدواء وفي نفعه و ضرره

• لا تطعم دواء المهددة لك من شفاء نفسك

• لا تترك صرف الدواء بدون استشارة الطبيب

• لا تترك الادوية في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
والنهاد الصيدلانية العرب.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.