

Notice : information de l'utilisateur

Melrosum® Sirop S

Extrait liquide de thym : 15 g pour 100 ml de sirop

Médicament destiné aux enfants de plus d'un an, aux adolescents et aux adultes.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Pour une efficacité maximale, veuillez prendre ce médicament conformément aux instructions.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après quelques jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Melrosum Sirop S et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Melrosum Sirop S ?
3. Comment prendre Melrosum Sirop S
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Melrosum Sirop S
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE MELROSUM SIROP S ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Melrosum Sirop S est un médicament à base de plantes utilisé pour traiter l'inflammation des voies respiratoires lorsque celle-ci s'accompagne d'une production de mucus.

Melrosum Sirop S est employé dans le cadre des affections respiratoires s'accompagnant de sécrétions épaisses et pour soulager les symptômes de la bronchite aiguë.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MELROSUM SIROP S ?

Contre-indications

Ne prenez pas Melrosum Sirop S

- si vous êtes allergique au thym ou à d'autres lamiacées (fleurs labiées) ou à l'un des autres composants du Melrosum Sirop S.
- si vous souffrez d'un trouble héréditaire rare appelé intolérance au fructose, d'une malabsorption du glucose-galactose ou d'un déficit en sucrase-isomaltase (troubles particuliers du métabolisme).

Précautions d'emploi - Mises en garde

Faites attention avec Melrosum Sirop S :

Si les symptômes persistent plus d'une semaine ou en cas de gêne respiratoire, de fièvre ou de crachats purulents ou sanguinolents, consultez immédiatement votre médecin.

10 ml de Melrosum Sirop S contiennent l'équivalent de 0,6 unité-pain. Vous devez en tenir compte si vous suivez un régime pour le diabète.

Enfants :

Étant donné qu'il n'existe pas de données suffisantes concernant l'administration de Melrosum Sirop S chez l'enfant de moins d'un an, ce médicament ne doit pas être utilisé dans ce cas.

Prise d'autres médicaments

Aucune interaction n'est connue.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Malgré l'usage répandu de thym en tant que médicament ou dans les aliments, il n'existe à ce jour aucun indicateur suggérant un risque lié à son utilisation.

Toutefois, du fait de données insuffisantes sur l'utilisation du thym pendant la grossesse et l'allaitement, il est déconseillé de prendre Melrosum Sirop S si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune mesure de précaution particulière n'est nécessaire.

Informations importantes concernant certains composants de Melrosum Sirop S

Melrosum Sirop S contient 4,9 % d'éthanol.

3. COMMENT PRENDRE MELROSUM SIROP S

Posologie

Respectez toujours les instructions indiquées dans cette notice.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Sauf prescription contraire de votre médecin, la dose habituelle est :

Âge (poids corporel)	Posologie	Dose journalière totale
Jeunes enfants de 1 à 4 ans (env. 8-15 kg)	5 ml 3 fois par jour	15 ml
Enfants de 5 à 12 ans (env. 19-43 kg)	7,5 ml 3 fois par jour	22,5 ml
Adolescents de 13 ans et plus et adultes	10 ml 3 fois par jour	30 ml

Méthode et voie d'administration

Voie orale. Bien agiter le flacon avant utilisation.

Fréquence d'utilisation

Dans la mesure du possible, le sirop doit être pris à intervalles réguliers au cours de la journée.

Durée du traitement

La prise du médicament n'est pas limitée dans le temps. Toutefois, veuillez consulter les informations données aux rubriques 2 et 4.

Si vous avez l'impression que l'effet du sirop est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de Melrosum Sirop S que vous n'auriez dû

Aucune manifestation d'intoxication consécutive à un surdosage accidentel après absorption de thym ou d'extraits de thym n'a été observée.

Si vous oubliez de prendre Melrosum Sirop S

Si l'on vous arrive d'oublier de prendre Melrosum Sirop S, prenez la dose habituelle dès que possible, puis poursuivez le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Melrosum Sirop S peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Echelle de fréquence utilisée pour les effets indésirables :

Très fréquent	plus d'une personne sur 10
Féquent	entre 1 et 10 personnes sur 100
Occasionnel	entre 1 et 10 personnes sur 1 000
Rare	entre 1 et 10 personnes sur 10 000
Très rare	moins d'une personne sur 10 000
Indéterminée	ne peut être déterminée sur la base des données disponibles

Effets secondaires notables ou signes à prendre en compte et mesures correspondantes :

Si vous ressentez l'un des effets indésirables mentionnés ci-dessous, arrêtez de prendre Melrosum Sirop S et prévenez immédiatement votre médecin.

Des réactions allergiques peuvent survenir très rarement comme par exemple gêne respiratoire, éruption cutanée, urticaire ou gonflement du visage, de la bouche et/ou de la gorge.

Si l'un des effets mentionnés survient et vous apparaît comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER MELROSUM SIROP S

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser Melrosum Sirop S après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et sur la boîte. Cette date fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation :

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Durée de conservation après ouverture :

Après ouverture du flacon, Melrosum Sirop S peut être conservé 6 mois à 25°C.

Tout flacon ouvert ne doit plus être utilisé au-delà de ce délai.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient Melrosum Sirop S

La substance active est : l'extrait liquide de thym.

100 ml (correspondant à 126,3 g) de sirop contiennent : 15,0 g d'extrait liquide de thym (1:2-2,5) agent d'extraction : solution d'ammoniaque à 10 % (m/m), glycérol à 85 %, éthanol à 90 % (v/v), eau (1:20:70:109).

Les autres composants sont : solution de saccharose, sirop de glucose, sirop de sucre inverti, arôme de miel concentré, huile de rose, concentré de jus de cerise, benzoate de sodium, eau purifiée.

Qu'est-ce que Melrosum Sirop S et contenu de l'emballage extérieur

Flacon contenant 100 ml (126,3 g) de sirop.

Remarque générale :

La couleur et le goût du sirop peuvent varier légèrement en raison de la présence de composants à base de plantes. Ces variations n'ont aucun effet sur l'efficacité du traitement ni sur la qualité du produit.

Fabricant :

A. Nattermann & Cie GmbH, Nattermannallee 1
D 50829 Cologne, Allemagne

Pour sanofi-aventis

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est juin 2009.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.

• The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.

• Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.

• Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

• Keep all medications out of reach of children.
Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.