

## Batrafen® Nail Lacquer

# باترافين لّك للأظافر

المركب الفاعل: سيكلوبيروكس

**sanofi aventis**

تحذّث النشرة المدرجة هذه باستعمالها، لذا يرجى قراءتها بدقة  
قبل استعمالها على جسمك.

التركيب يحتوي كل غرام من لك للأظافر باترافين على 80 ملجم من المركب الفاعل سيكلوبيروكس.  
الأسوجة: كوبوليمر الميثيلفينيليتراستر وستر مونوبوتيل حمض الماليك، خلات الإيتيل، 2-بروبانول.

الخصائص طور لك للأظافر باترافين خصيصاً لعلاج الالتهابات الفطرية التي تصيب الأظافر. يدخل المركب الفاعل سيكلوبيروكس صفيحة الظفر ويبلغ المعرض الفطري بعد وقت قصير لا يتعدي 48 ساعة بعد دهن اللك.  
يتمتع سيكلوبيروكس بفعالية مبكرة للغطورة ضد كل الممرضات المسؤولة عن الالتهابات الفطرية التي تصيب الأظافر.

دواعي الاستعمال دواعي الاستعمال  
الالتهابات الفطرية التي تصيب الأظافر

### ان هذا الدواء

- مستحضر يوشّر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرّضك للخطر.
  - اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرّفها لك.
  - الطبيب والصيدلي هما الخبران في الدواء وفي نفسه وضرره.
  - لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
  - لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
  - لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.
- مجلس وزراء الصحة العرب  
واتحاد الصيادلة العرب.

### THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.  
Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,  
Union of Arab Pharmacists.

الاستعمال. وبقية من الغطاء من التصاق بالقنية، لا توضع محلول على أسنان الجزء الملول.

موقع الاستعمال  
بسبب نقص التجارب السريرية، لا يستعمل لك للأظافر باترافين لدى الأطفال.

### المحاذير

في حال وجب استعمال لك للأظافر باترافين خلال فترة الحمل أو الإرضاع، يجب استعماله فقط عند الضرورة القصوى.

### العارضات الجانبية

في حالات قليلة نادرة، تفتّت مراقبة احمرار وتقرّش حيث لا مس للاظافر باترافين البisterة المحاذية للتقرّش.  
في حال لاحظت أي عوارض جانبية، الرجاء استشارة طبيبك.

### الجرعة وطريقة الاستعمال

قبل دهن لك للأظافر باترافين للمرة الأولى، يجب إزالة أكبر جزء ممكن من الظفر المصاب بواسطة مقصٍّ مثلاً ويجب برد الجزء المتبقّي من الظفر المريض بواسطة مبرد.

يوضع لك للأظافر باترافين على ظفر المريض بطبيعة رقيقة كل يومين خلال الشهر الأول، إلا إذا أشار الطبيب بغير ذلك، فهذا يضمن إشباع التقرّش بالمركب الفاعل. في الشهر الثاني من العلاج، يمكن تقليل عدد الدهنات لمرتين في الأسبوع كحد أدنى ولمرة واحدة في الأسبوع ابتداءً من الشهر الثالث من العلاج.

خلال فترة دهن الدواء، تُنزع طلبة اللك كلّها مرة في الأسبوع بواسطة مزيل تجاري لطلاء الأظافر. خلال هذه العملية يجب من جديد إزالة أكبر جزء ممكن من الظفر المصاب بواسطة مبرد أظافر في حال تصرّرت طلبة اللك في غضون ذلك، يكفي دهن لك للأظافر باترافين مجدداً على الأجزاء المتضرّرة.  
تنوّق فترة الدهن على حدة الالتهاب، ولكن يجب عدم تخطي ستة أشهر من العلاج.

### ملاحظات خاصة

يغيبة تفادى أن يجف محلول، يجب إغلاق الغطاء بدقة بعد