

سببت * ٠.٢ ملغ أعراض مختلفة بطرفة وبقيلة

٠.٢ ملغ موكسوليندين

أبوت

إفرا كامل هذه النشرة بشأن قبول البنية بتناول هذا الدواء
إحتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لأن تقرأها مجدداً وإذا كانت لديك أية أسئلة لا تجيب عنها هذه النشرة، الرجاء مراجعة طبيبك أو الصيدلي، لقد تم وصف هذا الدواء لك شخصياً ولا يجدر بك أن تعطيه للغير، فقد يسبب لهم الأذى حتى لو كانت الأعراض التي يشعرون بها مشابهة لعوارضك.

سببت * ٠.٢ ملغ هي أعراض مدودة ومحتمية ولونها زهري فاتح ومعلقة بطبقة رقيقة مع طبعة * ٠.٣ على جهة واحدة يحتوي كل قرص على ٠.٢ ملغ موكسوليندين

يجب تناول أقراصه.
سببت غير القم فقط

الأسوية (المكونات غير النشطة)
لب القراص: لاكازول وحيد التسمية.يو فيدون K25.
كروميويدودنة، إندترات المفسنوم.
غلاف القراص: فيموربولون، طيلوز الأبل.
ماكروغول ٦٠٠٠.
حقن: أكسيد حديدي أحمر (E 172)، ناسي أكسيد التيتانيوم (E 171)

قواعي الاستعمال
يستعمل سببت في علاج ضغط الدم المرتفع (فقط ضغط الدم)

الجرعة وكيفية تناول
دلتنا تناول، سببت تماما كما يصنف الطبيب لك. إن كان لديك أي أسئلة، راجع طبيبك أو الصيدلي قبلتنا ول الدواء.

في حال نسيت تناول قرصك/ أقراصك، لا تتناول جرعة مزدوجة للتعويض عن ذلك.

إن جرعة المباشرة المعتادة لسببت هي ٠.٢ ملغ بوجبة الحزمة القصوى اليومية هي ٠.٦ ملغ على أن تؤخذ على دفتين منفصلتين لا يجب أن تتناول أكثر من ٠.٤ ملغ دفعة واحدة.
مببب استجابتهك للعلاج، يمكن تعديل الجرعة بيو ة فواتر (التناول من قبل طبيبك.

إذ كانت تتناول حاصرات β (β-blocker) بالتزامن مع سببت وفرط طبيبك إيقاف العلاج، يجب إيقاف حاصرات β أولا ولن تم سببت

يمكن تناول سببت مع أو دون طعام

إن كنت تعاني من داء كروي معتدل أو حاد (تصور كروي) فإذن كنت تتعصب لإزالة الدم (الانقباض الميكانيكي للدم). سيؤدي ذلك جرعة أولية بوجبة تبلغ ٠.٢ ملغ عند الضرورة وفي حال وجود دقة أعلى، التمدل، يمكن تعديل الجرعة أن يزيد جرعتك اليومية إلى ٠.٤ ملغ

بسبب التمس في المعطيات حول السلامة والفعالية، لا ينصح باستعمال سببت من قبل الأطفال أو البالغين دون سن الثامنة عشر.

موانع الاستعمال
لا تتناول سببت إن كنت تعاني من إحدى الحالات التالية
حساسية مطردة على المادة الفعالة (موكسوليندين) أو على أي من الأسوية (راجع الفقرة أعلاه "الأسوية")
أمراض الجيوب الرئوية (عدم الانتظام في إقلاب بسبب مرض الالتهاب الجيبيّ)

بدء القابل (تسكين سرعة القلب، إلى أقل من ٥٠ دقة في الدقيقة)
أحوا أو أدنى بطونتي من الدرجة الثانية أو الثالثة (AV-block)

(اختلالات في نظم القلب تؤدي إلى قباطع دقات القلب ويمكن أن تجعل عضلة القلب أقل فعالية)

تصور القلب (عضلة قلب ضعيفة)

التحذيرات والتدابير الوقائية الخاصة بالاستعمال
إذا تم اكتشاف لديك حالة إحصار أدبتي بطونتي من الدرجة الأولى، غلاف القراص، فيموربولون، طيلوز الأبل، ماكروغول ٦٠٠٠، حقن، أكسيد حديدي أحمر (E 172)، ناسي أكسيد التيتانيوم (E 171)

إن كنت تعاني من داء شرايخي قلبي خطير (داء الشريان التاجي) أو من ألم في الصدر غير ثابت (ذبحة صدرية) سيكون طبيبك حذر لدى وصف سببت لك وذلك لأن تجارب سببت على أشخاص يعانون من هذه الحالات محدودة. في هذه الظروف، تستعمل على هذا الدواء إن كان ذلك ضروريا جدا.

بالإضافة، سيأخذ طبيبك الحذر عند تحديد جرعة سببت إن كنت تعاني من مرض كروي وذلك لأن المادة الفعالة (موكسوليندين) تفرز أساسا من جسمك من خلال الكلى. في الإجمال، ستبدأ بجرعة بوسمة تبلغ ٠.٢ ملغ من الموكسوليندين ولن تزيد (حتى جبه ة لسبة ٠.٤ ملغ بوجبة) إلا في حال تم تعديها بشكل جبه وكان ضرورية.

إذا كنت تتناول حاصرات β (β-blocker) بالتزامن مع سببت وفرط طبيبك إيقاف العلاج، يجب إيقاف حاصرات β أولا ولن تم سببت

بعد مضي بضعة أيام

بالرغم من عدم توفر دليل حول الآثار الجانبية على ضغط الدم التي يمكن أن تحدث على إثر إيقاف العلاج بسببت بشكل مفاجئ، إلا أنه لا يُنصح بالقيام بذلك، إن وجب إيقافه، علاجه، يجب عليك دقة ٢٤ ساعة وذلك تدريجيا على فترة أسبوعين.

إن هذا المنتج يحتوي على اللاكازول إن كنت لا تتحمل اللاكازول (عدلا نفس في لاكتاز الألب أو سوء امتصاصه)أو بكو ٠٠٠ (غلاكتوز) لا يجب أن تتناول هذا أو أي

المنفصلات مع أخرى
أخطر هيبة أو التسمية إذا كنت تتناول أو سبق أن تناولت مضرا أية أسوية أخرى، بما فيها الأسوية التي يمكنك الحصول عليها من دون وصفة طبيب أو المستحضرات الصيدية

الأدوية التي تحتوي على أسوية أخرى لضغط الدم، مضادات الكآبة، مسكنات ومهدئات، بالإضافة إلى الكحول، يمكن أن تتفاعل مع الموكب و نديين ذلك، من إعلام طبيبك إن كنت تتناول أي من هذه الأدوية، لا تترب الكحول عند تناول سببت.

عدا استعمال موكسوليندين بالتزامن مع أسوية أخرى مضادة لفرط ضغط الدم (أسوية أخرى تخفض ضغط الدم) لا تتفاعل الأسوية مع بعضها لتسبب أي انخفاض في ضغط الدم يوقع تأثيرك دواء على حدا (يؤدي إلى تأثير إضافي)

يمكن لبعض دات الكآبة الثلاثية الطقات (مثلا: الأنجيتياملين) أن تقلص فعالية سببت (كذلك المواد المضادة لفرط ضغط الدم الفعالة حركي)، لا ينصح بتناول هذه الأدوية مع بعضها

إن الممكن أن يزيد موكسوليندين تأثير مضادات الكآبة الثلاثية من الطقات، المسكنات، الكحول، المهدئات والمنومات، لا ينصح بتناول هذه الأدوية مع موكسوليندين

بالإضافة، سيأخذ طبيبك الحذر عند تحديد جرعة سببت إن كنت تعاني من مرض كروي وذلك لأن المادة الفعالة (موكسوليندين) تفرز أساسا من جسمك من خلال الكلى. في الإجمال، ستبدأ بجرعة بوسمة تبلغ ٠.٢ ملغ من الموكسوليندين ولن تزيد (حتى جبه ة لسبة ٠.٤ ملغ بوجبة) إلا في حال تم تعديها بشكل جبه وكان ضرورية.

إذا كنت تتناول حاصرات β (β-blocker) بالتزامن مع سببت وفرط طبيبك إيقاف العلاج، يجب إيقاف حاصرات β أولا ولن تم سببت

من الممكن أن يتعارض الموكسوليندين مع أسوية أخرى فترز بنفس الطريقة

الحمل والرضاعة

الرجاء إعلام طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مضرا أي أسوية أخرى بما في ذلك أسوية حصلت عليها من دون وصفة.

الحمل
لم تجر أي دراسات على النساء الحوامل: لهذا لم يتم الحصول على معلومات محددة حول هذه المجموعة. أما الدراسات على الحيوانات فقد أظهرت تأثيرات سؤوية على الجنين (أثار سؤوية للجنين). بالرغم من أن الحمل ذو مخروف على الإنسان، لا يجب أن تتناول سببت إن كنت حاملا إلا في حال قرر طبيبك أن ذلك ضروريا جدا

الرضاعة

يتم فرز الموكسوليندين في حليب الأم وبالتالي لا يجب تناوله خلال الرضاعة. إن ترب طبيبك أو المعالجة بسببت ضرورية جدا عندئذ عليه التوقف من إرضاع طفلك.

التفاعلات مع أخرى
أخطر هيبة أو التسمية إذا كنت تتناول أو سبق أن تناولت مضرا أية أسوية أخرى، بما فيها الأسوية التي يمكنك الحصول عليها من دون وصفة طبيب أو المستحضرات الصيدية

الأدوية التي تحتوي على أسوية أخرى لضغط الدم، مضادات الكآبة، مسكنات ومهدئات، بالإضافة إلى الكحول، يمكن أن تتفاعل مع الموكب و نديين ذلك، من إعلام طبيبك إن كنت تتناول أي من هذه الأدوية، لا تترب الكحول عند تناول سببت.

عدا استعمال موكسوليندين بالتزامن مع أسوية أخرى مضادة لفرط ضغط الدم (أسوية أخرى تخفض ضغط الدم) لا تتفاعل الأسوية مع بعضها لتسبب أي انخفاض في ضغط الدم يوقع تأثيرك دواء على حدا (يؤدي إلى تأثير إضافي)

يمكن لبعض دات الكآبة الثلاثية الطقات (مثلا: الأنجيتياملين) أن تقلص فعالية سببت (كذلك المواد المضادة لفرط ضغط الدم الفعالة حركي)، لا ينصح بتناول هذه الأدوية مع بعضها

إن ممكن أن يزيد موكسوليندين تأثير مضادات الكآبة الثلاثية من الطقات، المسكنات، الكحول، المهدئات والمنومات، لا ينصح بتناول هذه الأدوية مع موكسوليندين

بالإضافة، سيأخذ طبيبك الحذر عند تحديد جرعة سببت إن كنت تعاني من مرض كروي وذلك لأن المادة الفعالة (موكسوليندين) تفرز أساسا من جسمك من خلال الكلى. في الإجمال، ستبدأ بجرعة بوسمة تبلغ ٠.٢ ملغ من الموكسوليندين ولن تزيد (حتى جبه ة لسبة ٠.٤ ملغ بوجبة) إلا في حال تم تعديها بشكل جبه وكان ضرورية.

إذا كنت تتناول حاصرات β (β-blocker) بالتزامن مع سببت وفرط طبيبك إيقاف العلاج، يجب إيقاف حاصرات β أولا ولن تم سببت

الاتصال بطبيبك على الفور، أو التوجه إلى المستشفى.

عوارض الحساسية الزائدة

قد تحدث حالات قليلة جدا من الحرجة الزائدة إلا أنه في ملذ، شبيه واحد، تم ابتلاع جرعة ٤ من ١٦.٦ ملغ بالكامل من دون التمسير. بوقاة وتضخمت الغلماة،و الأمراض المطبق عنها: صداع، تسكين، تعاس، نقص الضغط (ضغط دم منخفض)، دوام، ضعف عام (الوهن)، بطة في نغم القلب، جفاف الدم، تقين، ذوب وألم في المعدة (أم في الجزء الأمامي من البطن)

اضطرابات الجهاز العصبي:
الثائمة الصداع* (ألم الرأس)، والدوار/الدوام والتعاس غير الثائمة (إسهال، غثيان) * (ألم الرأس)

بالإضافة إلى ذلك، وبالإستناد إلى بعض الدراسات على الحيوانات التي خضعت لجرعة زائدة قد يحصل فرط ضغط دم، ضغط الدم، ارتفاع في دقات القلب و/أو ارتفاع سكر الدم

معلومات لطبيب
في حال فرط الموكسوليندين في حليب الأم وبالتالي لا يجب تناوله خلال الرضاعة. إن ترب طبيبك أو المعالجة بسببت ضرورية جدا عندئذ عليه التوقف من إرضاع طفلك.

اضطرابات الجهاز الهضمي:
الثائمة جذاً، جفاف الدم، الثائمة الإسهال، الغثيان، التقين، والثخمة

علاج الجوه الزائدة

ما من تريق معروف لذلك

معلومات لطبيب
في حال انخفاض ضغط الدم، من الأفضل وصف داعم لتدوير الدم كالسوائل والديوامين. يمكن معالجة بطة دقات القلب، و ابطء الأتوبويين. يمكن إيواسل مستقبلات α (α-Receptor) بالاضادة أن نقص أو نزول، تأثيرات فرط ضغط الدم، أو صعوبة التي تسببها جرعة الموكسوليندين الزائدة

معلومات لطبيب
في حال انخفاض ضغط الدم، من الأفضل وصف داعم لتدوير الدم كالسوائل والديوامين. يمكن معالجة بطة دقات القلب، و ابطء الأتوبويين. يمكن إيواسل مستقبلات α (α-Receptor) بالاضادة أن نقص أو نزول، تأثيرات فرط ضغط الدم، أو صعوبة التي تسببها جرعة الموكسوليندين الزائدة

اضطرابات عداة و ردود الفعل في مواقع تلقي العلاج
ثائمة، ضعف عام (وهن)
غير ثائمة، تورم عام في الأطراف الجسم (أوريدما)

الاضطرابات الضلعية الهيكلية و اضطرابات التصح الضام
ثائمة، أيام الظهر
غير، ثائمة، ألم الرقبة

اضطرابات نفسية
ثائمة، أرق
غير، ثائمة، حسدية

الآثار الجانبية المصنفة حسب الجهاز العضوي
(كما عرفت خلال التجارب السريرية العميقة بالديلاسيو والتي ضمت ٤٨٨ مريضا تناولوا موكسوليندين):

* لا ارتفاع بالوتيرة بالمقارنة مع البلاسيبو

تصف وتغيرات الدواء ة المتعلقة بالتأثير، أت الجانبية وذا التالي الثائمة جدا (أكثر من ١٠ حالات عد، ١٠٠٠ مريض معالج)، الثائمة (بين حالقرا عدة و ١٠٠ حالات عد، ١٠٠٠ مريض معالج)، غير الثائمة (إذ تتناول(أو اعتقد، أنه تناول) كمية كبيرة جدا من سببت، يجدر بك

مركزة في اللب البطني الجانبي المتقاربي(rostral ventrolateral medulla)، وهي منطقة خطيرة للجهاز المركزي التابع للجهاز العصبي المحيطي الوردي وتبين أن حد مستقللات الإيميدازولين يقلص النشاط الوردي (sympathetic activity) ويخفف ضغط الدم.

يتميز الموكسوليندين عن غيره من العقاوير السهثائية المضادة لادرج ضغط الدم (sympatholytic antihypertensives) بفعالية عبر إبطال أفة منخفضة للمستقبلات الكثرية α2 المضادة –α2 adrenoceptors، مقارنة مع مستقبلات الإيميدازولين. ويرجع حدوث قلبي من الآثار الجانبية مثل ضعف القلب وتسكين أثناء استعمال موكسوليندين إلى ذلك، حيث أن الممر المتصف، الذي هو موكسوليندين α2-adrenoceptors

لدى البشر، يؤدي ويؤدي ويؤدي إلى انخفاضه في المقاومة الوعائية الجهازية (systemic vascular resistance) وبالتالي ضغط الدم الشرياني. وقد تم إظهار تأثير الموكسوليندين المضاد لفرط ضغط الدم في الدراسات العمياء المزدوجة والعشوائية والمراقبة بالبلاسيبو.

معلومات لطبيب

في حال فرط ضغط الدم، من الأفضل وصف داعم لتدوير الدم كالسوائل والديوامين. يمكن معالجة بطة دقات القلب، و ابطء الأتوبويين. يمكن إيواسل مستقبلات α (α-Receptor) بالاضادة أن نقص أو نزول، تأثيرات فرط ضغط الدم، أو صعوبة التي تسببها جرعة الموكسوليندين الزائدة

معلومات لطبيب
في حال انخفاض ضغط الدم، من الأفضل وصف داعم لتدوير الدم كالسوائل والديوامين. يمكن معالجة بطة دقات القلب، و ابطء الأتوبويين. يمكن إيواسل مستقبلات α (α-Receptor) بالاضادة أن نقص أو نزول، تأثيرات فرط ضغط الدم، أو صعوبة التي تسببها جرعة الموكسوليندين الزائدة

اضطرابات عداة و ردود الفعل في مواقع تلقي العلاج
ثائمة، ضعف عام (وهن)
غير ثائمة، تورم عام في الأطراف الجسم (أوريدما)

الاضطرابات الضلعية الهيكلية و اضطرابات التصح الضام
ثائمة، أيام الظهر
غير، ثائمة، ألم الرقبة

اضطرابات نفسية
ثائمة، أرق
غير، ثائمة، حسدية

الآثار الجانبية المصنفة حسب الجهاز العضوي
(كما عرفت خلال التجارب السريرية العميقة بالديلاسيو والتي ضمت ٤٨٨ مريضا تناولوا موكسوليندين):

* لا ارتفاع بالوتيرة بالمقارنة مع البلاسيبو

تصف وتغيرات الدواء ة المتعلقة بالتأثير، أت الجانبية وذا التالي الثائمة جدا (أكثر من ١٠ حالات عد، ١٠٠٠ مريض معالج)، الثائمة (بين حالقرا عدة و ١٠٠ حالات عد، ١٠٠٠ مريض معالج)، غير الثائمة (إذ تتناول(أو اعتقد، أنه تناول) كمية كبيرة جدا من سببت، يجدر بك

إن النشاط المنطق يفعل المتقاربه هو حوالي ١٠/٦ لدى الموكسوليندين المتفرج منه المهدروجين (dehydrogenated moxonidine)

مقارنة مع الموكسوليندين الأساسي.

يتميز الموكسوليندين عن غيره من العقاوير السهثائية المضادة لادرج ضغط الدم (sympatholytic antihypertensives) بفعالية عبر إبطال أفة منخفضة للمستقبلات الكثرية α2 المضادة –α2 adrenoceptors، مقارنة مع مستقبلات الإيميدازولين. ويرجع حدوث قلبي من الآثار الجانبية مثل ضعف القلب وتسكين أثناء استعمال موكسوليندين إلى ذلك، حيث أن الممر المتصف، الذي هو موكسوليندين α2-adrenoceptors

لدى البشر، يؤدي ويؤدي ويؤدي إلى انخفاضه في المقاومة الوعائية الجهازية (systemic vascular resistance) وبالتالي ضغط الدم الشرياني. وقد تم إظهار تأثير الموكسوليندين المضاد لفرط ضغط الدم في الدراسات العمياء المزدوجة والعشوائية والمراقبة بالبلاسيبو.

معلومات لطبيب

في حال فرط ضغط الدم، من الأفضل وصف داعم لتدوير الدم كالسوائل والديوامين. يمكن معالجة بطة دقات القلب، و ابطء الأتوبويين. يمكن إيواسل مستقبلات α (α-Receptor) بالاضادة أن نقص أو نزول، تأثيرات فرط ضغط الدم، أو صعوبة التي تسببها جرعة الموكسوليندين الزائدة

معلومات لطبيب
في حال انخفاض ضغط الدم، من الأفضل وصف داعم لتدوير الدم كالسوائل والديوامين. يمكن معالجة بطة دقات القلب، و ابطء الأتوبويين. يمكن إيواسل مستقبلات α (α-Receptor) بالاضادة أن نقص أو نزول، تأثيرات فرط ضغط الدم، أو صعوبة التي تسببها جرعة الموكسوليندين الزائدة

اضطرابات عداة و ردود الفعل في مواقع تلقي العلاج
ثائمة، ضعف عام (وهن)
غير ثائمة، تورم عام في الأطراف الجسم (أوريدما)

الاضطرابات الضلعية الهيكلية و اضطرابات التصح الضام
ثائمة، أيام الظهر
غير، ثائمة، ألم الرقبة

اضطرابات نفسية
ثائمة، أرق
غير، ثائمة، حسدية

الآثار الجانبية المصنفة حسب الجهاز العضوي
(كما عرفت خلال التجارب السريرية العميقة بالديلاسيو والتي ضمت ٤٨٨ مريضا تناولوا موكسوليندين):

* لا ارتفاع بالوتيرة بالمقارنة مع البلاسيبو

تصف وتغيرات الدواء ة المتعلقة بالتأثير، أت الجانبية وذا التالي الثائمة جدا (أكثر من ١٠ حالات عد، ١٠٠٠ مريض معالج)، الثائمة (بين حالقرا عدة و ١٠٠ حالات عد، ١٠٠٠ مريض معالج)، غير الثائمة (إذ تتناول(أو اعتقد، أنه تناول) كمية كبيرة جدا من سببت، يجدر بك

بالمقارنة مع الأسوية التي الذين يعانون من فرط ضغط الدم مع عمل طبيعي للكلية. لدى المرضى الذين يعانون من ضعف في الكلى، يفرج تسيير الجرعة وتواترها بحسب مستويات الشخص. يتم التخلص من الموكسوليندين إلى حد بسيط بواسطة عملية الدم.

الأدوية:
خلال فترة ٢٤ ساعة، تم إحصار ٢٨% من كامل الجرعة في البول كموكسوليندين أساسي وتم إحصار ٢١% من الجرعة كموكسوليندين متفرج منه (dehydrogenated moxonidine)، وبقت أخصاص ضئيلة أخرى في البول حوالي ٢٨% من الجرعة، وتم التخلص من أقل من ٢١% بواسطة البراز إن الممر المتصف، الذي هو موكسوليندين وأيضه هو حوالي ٢.٤ ساعة ود ساعات على التوالي

حركات الدواء لدى المرضى الذين يعانون من فرط ضغط الدم
لم يلاحظ أي تغيير في حركات الدواء لدى المرضى الذين يعانون من فرط ضغط الدم مقارنة مع المتفرجين الطبيعيين.

حركات الدواء لدى السنتين
تم مراقبة تغيرات متعلقة بالمر في حركات الدواء، ناتجة على الأرجح من نشاط أبطي منخفض و/أو شعور حيوي أعلى بشكل بسيط لدى السنتين. ولكن هذه القدرات في حركات الدواء لا تعتبر مهمة سروريا

معلومات إضافية
يجب التخلص من أي دواء غير مستعمل أو دواء قاسدة وفقاً لشروط المحافظة.

تصنع الشرائط (أثلفة من الفعالمات) من PVC/PVDC/Al

معلومات إضافية
يجب التخلص من أي دواء غير مستعمل أو دواء قاسدة وفقاً لشروط المحافظة.

تاريخ المصنوعات
كانتو الثاني/يناير ٢٠١٠

مصنفة من قوق
أبوت هيلثكيرس أس
١٤٠٠، شانتون سورشايلون، فرنسا

أبوت هيلثكيرس أس
١٤٠٠، شانتون سورشايلون، فرنسا

أبوت هيلثكيرس أس
١٤٠٠، شانتون سورشايلون، فرنسا

أبوت هيلثكيرس أس
١٤٠٠، شانتون سورشايلون، فرنسا

أبوت هيلثكيرس أس
١٤٠٠، شانتون سورشايلون، فرنسا

هذا الدواء
يؤثر على صحته وتناوله بشكل متزايد للتعليمات قد يحرّك الخطر

التي بدت بعدة وحدة الطبيب وطريقة الإبتصال وتعليمات الصيدلي الذي ياعط الدواء

إلى الطبيب والصيدلي هما المشوران في الأدوية وهو، فواتها وحماها

لا تؤقف من تلقاء نفسك فترة العلاج المصنفة في الوصفة الطبية من دون استشارة الطبيب

لا تفرّج الدواء على حرارة تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

إحتفظ كافة الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

جلس وذا الصحة العربي
إتعد الحيدارة للدرج