

Désonide 0,1 %

## ■ IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

**Dénomination :** LOCATOP® 0,1 %, crème

**Composition qualitative / composition quantitative :**

Désonide ..... 0,1000 g  
Vaseline, paraffine liquide, alcool cétylstéarylique et éther cétostéarylique de macrogol 1000 (EMULGADE 1000 NI), gallate de propyle, édétate de sodium, acide sorbique, eau purifiée. Pour 100 g.

**Forme pharmaceutique :** Crème, tube de 30 g.

**Classe pharmaco-thérapeutique :**

GLUCOCORTICOIDE TOPIQUE (D: Dermatologie)

**Nom et adresse de l'exploitant :**

Pierre Fabre Dermatologie  
45, Place Abel-Gance, 92100 Boulogne

**Nom et adresse du fabricant :**

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION  
45, Place Abel-Gance, 92100 Boulogne

## ■ DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans certaines maladies de peau comme l'eczéma de contact, la dermatite atopique, le psoriasis, mais votre médecin peut le prescrire dans d'autres cas.

## ■ ATTENTION !

**Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament**

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

allergie à l'un des composants du médicament; lésions ulcérées; acné; rosacée; maladies infectieuses de la peau d'origine virale (herpès, zona, varicelle...), bactérienne (exemple : impétigo...), mycosique (dues à des champignons microscopiques) ou parasitaire.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Mises en garde spéciales :**

- Ne pas appliquer sur les muqueuses.
- Si aucune amélioration n'est constatée en fin de traitement, consulter votre médecin.

**Précautions d'emploi :**

Ne pas appliquer sur le visage sauf en cas de prescription formelle de votre médecin.

Les recommandations suivantes doivent être suivies :

- éviter les applications sur une grande surface, sous un pansement occlusif en raison de la possibilité de passage d'une partie du principe actif dans le sang;
- éviter l'application prolongée, sur les paupières, le visage, dans les plis;
- toute irritation ou infection doit être signalée à votre médecin;
- si une réaction d'intolérance apparaît, le traitement doit être arrêté.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### **Interactions médicamenteuses et autres interactions :**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

#### **Grossesse - Allaitement :**

En cas de grossesse ou d'allaitement, prévenir votre médecin.

### **■ COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**

#### **Posologie :**

Ce médicament doit être utilisé en respectant les conseils de votre médecin.

La posologie est de 2 applications par jour en couches minces, suivies d'un léger massage.

Ne pas augmenter le nombre d'applications par jour.

#### **Mode et voie d'administration : USAGE LOCAL**

Il est conseillé d'appliquer le produit en touches espacées, puis de l'étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce qu'il soit entièrement absorbé.

En cas d'application manuelle, se laver les mains après l'application.

#### **Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré :**

2 applications par jour selon l'ordonnance de votre médecin.

### **■ EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

En cas d'utilisation prolongée, il y a risque d'amincissement et de fragilité de la peau, dilatation de petits vaisseaux sanguins, vergetures, poussée d'acné, rougeurs et irritations autour de la bouche.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

### **■ CONSERVATION**

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

### **■ DATE DE REVISION DE LA NOTICE Janvier 2004.**



Les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



Pierre Fabre