



النشرة الداخلية: معلومات للمستخدم



ديفلوكان® 150 مغ كبسولات صلبة
فلوكونازول

اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، فاسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.
- لقد تم وصف هذا الدواء لك أنت فقط. فلا تعمله لآخرين. فقد يسبب لهم ضرراً، حتى وإن كانوا يعانون من نفس الأعراض المرضية التي تعاني منها.
- إذا أصبت بأي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يشمل هذا أي آثار جانبية محتملة وغير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم 4.

محتويات هذه النشرة:

1. ما هو ديفلوكان وفيه يستخدم
2. ما تتركز معرفته قبل تناول ديفلوكان
3. كيفية تناول ديفلوكان
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين ديفلوكان
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو ديفلوكان وفيه يستخدم

ينتمي ديفلوكان لمجموعة من الأدوية تُدعى "مضادات الفطريات". المادة الفعالة هي فلوكونازول.

يُستخدم ديفلوكان لعلاج حالات العدوى التي تسببها الفطريات ويمكن أن يُستخدم أيضاً لمنع إصابتك بعدوى المبيضات (كانديدا). أكثر مسببات حالات العدوى الفطرية شيوعاً هي خميرة يُطلق عليها المِثْيِضَةُ (كانديدا).

البالغون

- قد يصف لك طبيبك هذا الدواء لعلاج أنواع العدوى الفطرية التالية:
- التهاب السحايا بالمستخفيات - عدوى فطرية في الدماغ
 - حمى الصحراء (الطائر الكرواني) - مرض يصيب الجهاز القضي الرئوي
 - حالات العدوى التي تسببها المبيضة (كانديدا) والتي تحدث بمجرى الدم أو أعضاء الجسم (مثل، القلب، الرئتين) أو الممالك البولية
 - القلاع المخاطي - عدوى تصيب بطانة الفم والحلق وتسبب التهاب الفم تحت تركيبات الأسنان الصناعية
 - القلاع التناسلي - عدوى في المهبل أو القضيب
 - عدوى الجلد - مثل، قدم الرياضي أو السعفة أو جُكَّة اللُجَب (سعفة الفخذ) أو عدوى الأظفار

- قد يوصف لك ديفلوكان أيضاً من أجل:
- منع تكرار الإصابة بالتهاب السحايا بالمستخفيات
 - منع تكرار الإصابة بالقلاع المخاطي
 - الحد من تكرار الإصابة بالقلاع المهبلي
 - منع إصابتك بعدوى تسببها المبيضة (كانديدا) (إذا كان جهازك المناعي ضعيفاً ولا يعمل كما ينبغي)

الأطفال والمراهقون (0 إلى 17 عاماً)

- قد يصف لك طبيبك هذا الدواء لعلاج أنواع العدوى الفطرية التالية:
- القلاع المخاطي - عدوى تصيب بطانة الفم والحلق
 - حالات العدوى التي تسببها المبيضة (كانديدا) والتي تحدث بمجرى الدم أو أعضاء الجسم (مثل، القلب، الرئتين) أو الممالك البولية
 - التهاب السحايا بالمستخفيات - عدوى فطرية في الدماغ
- قد يوصف لك ديفلوكان أيضاً من أجل:
- منع إصابتك بعدوى تسببها المبيضة (كانديدا) (إذا كان جهازك المناعي ضعيفاً ولا يعمل كما ينبغي).
 - منع تكرار الإصابة بالتهاب السحايا بالمستخفيات

2. ما تتركز معرفته قبل تناول ديفلوكان

- لا تتناول ديفلوكان
- إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه فلوكونازول أو أي أدوية أخرى تناولتها لعلاج حالات العدوى الفطرية أو تجاه أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم 6). يمكن أن تتضمن الأعراض الحكة، أو احمرار الجلد، أو صعوبة في التنفس
 - إذا كنت تتناول أستيميزول أو تيرفينادين (أدوية مضادة للهستامين لعلاج الحساسية)
 - إذا كنت تتناول سيسباريد (يستخدم لعلاج متاعب المعدة)
 - إذا كنت تتناول بيموزيد (يستخدم لعلاج الأمراض العقلية)
 - إذا كنت تتناول كينيدين (يستخدم لعلاج اضطراب نظم القلب)
 - إذا كنت تتناول إريثروميسين (مضاد حيوي لعلاج حالات العدوى)
 - إذا كنت تتناول أمبودارون (يستخدم لعلاج نبضات القلب غير المنتظمة "اضطرابات نظم القلب")

تحذيرات واحتياطات

- تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول ديفلوكان
- إذا كنت تعاني من مشكلات بالكبد أو الكلى
 - إذا كنت تعاني من مرض بالقلب، بما في ذلك مشكلات نظم القلب
 - إذا كانت مستويات البوتاسيوم، أو الكالسيوم، أو المغنيسيوم في دمك غير طبيعية
 - إذا أصبت بنفاعات جلدية شديدة (الحكة، أو احمرار الجلد، أو صعوبة في التنفس)
 - إذا أصبت بأعراض "قصور الغدتين الكظريتين"، حيث لا تنتج الغدتان الكظريتان كميات ملائمة من بعض الهرمونات الستيرويدية مثل الكورتيزول (الإلحاق الزمن أو الذي يستمر لفترة طويلة، ضعف العضلات، فقدان الشهية، فقدان الوزن، ألم البطن)

الأدوية الأخرى وديفلوكان

أخير طبيبك على الفور إذا كنت تتناول أستيميزول أو تيرفينادين (دواء مضاد للهستامين لعلاج الحساسية) أو سيسباريد (يستخدم لعلاج متاعب المعدة) أو بيموزيد (يستخدم لعلاج الأمراض العقلية) أو كينيدين (يستخدم لعلاج اضطراب نظم القلب) أو إريثروميسين (مضاد حيوي لعلاج حالات العدوى)، حيث ينبغي عدم تناول هذه الأدوية بالتزامن مع ديفلوكان (انظر القسم: "لا تتناول ديفلوكان").

هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تتفاعل مع ديفلوكان. احرص على إطلاع طبيبك إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية:

- ريفامبين أو ريفانوتين (مضادات حيوية لعلاج حالات العدوى)
- فينيتال، فينتانيل (يستخدم كمادة مخدرة)
- أميتريبتيلين، نورترينبتيلين (تستخدم كمضادات للاكتئاب)
- أمفوتريسين ب، فوريكونازول (مضاد للفطريات)
- الأدوية التي تعمل على تسهيل الدم لمنع تكون جلطات الدم (وارفارين أو الأدوية المشابهة)
- اليزوديازيبينات (ميدازولام أو تريازولام أو الأدوية المشابهة) التي تستخدم لمساعدتك على النوم أو للحد من القلق
- كاربامازيبين، فينيتوين (التي تستخدم لعلاج النوبات)
- نيفيديبين، إسمارديبين، وأموديبين، وفليديبين ولوسارتان (تستخدم لعلاج

ارتفاع ضغط الدم)

- سيكلوسبورين أو إيفيروليموس أو سيروليموس أو تاكروليموس (لمنع رفض الجسم للأعضاء المزروعة)
- سيكلوفوسفاميد، فلويدات الفينكا (فينكريستين أو فينبلاستين أو الأدوية المشابهة) التي تستخدم لعلاج السرطان
- هالوفانترين (يستخدم لعلاج الملاريا)
- السانتات (أتورفاستاتين، وسيمفاستاتين، وفلوفاستاتين أو الأدوية المشابهة) التي تستخدم لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة
- ميتادون (يستخدم لتخفيف الآلام)
- سيليكوكسيب، فلوريبروفين، نابروكسين، إيبوبروفين، لورنوكسيكام، ميلوكسيكام، ديكلوفيناك (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية-NSAID)
- موانع الحمل التي تؤخذ عبر الفم
- بريدينزون (من الستيرويدات)
- زيدوفيرين، المعروف كذلك باسم AZT؛ ساكينافير (يستخدم لعلاج المرضى المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV))
- أدوية علاج السكري مثل كلوربروباميد، أو جليبنكلاميد، أو جليبيزيد، أو توليوتاميد
- ثيوفيلين (يستخدم للتحكم في الربو)
- فيتامين (مكمل غذائي)
- إيفاكافور (يستخدم لعلاج التليف الكيسي)
- أمبودارون (يستخدم لعلاج نبضات القلب غير المنتظمة "اضطراب نظم القلب")

أخير طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

ديفلوكان مع الطعام والشراب

يُمكنك تناول هذا الدواء مع الطعام أو بدونه.

الحمل والرضاعة والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو ترضعين رضاعة طبيعية، أو تعتقدن أنك ربما تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. ينبغي عليك عدم تناول ديفلوكان أثناء فترة الحمل إلا إذا سمح لك طبيبك بذلك. يمكنك الاستمرار في الإرضاع رضاعة طبيعية بعد تناول جرعة فردية من ديفلوكان تصل إلى 200 مغ. ينبغي عليك عدم الإرضاع رضاعة طبيعية إذا كنت تتناولين جرعة متكررة من ديفلوكان.

القيادة واستخدام الآلات

عند قيادة المركبات أو استخدام الآلات، ينبغي أن تضع في الحسبان إمكانية حدوث دوار أو نوبت أحياناً.

يحتوي ديفلوكان على اللاكتوز (سكر اللبن)

يحتوي هذا الدواء على كمية صغيرة من اللاكتوز (سكر اللبن). إذا أخبرك طبيبك أنك لا تستطيع تحمل بعض السكريات، يرجى الاتصال به قبل تناول هذا الدواء.

3. كيفية تناول ديفلوكان

احرص دوماً على تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك طبيبك. ينبغي عليك الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا مما عليك فعله.

قم بابتلاع الكبسولة كاملة مع كوب ماء. من الأفضل تناول الكبسولات في نفس الوقت كل يوم.

الجرعات الموصى بها لهذا الدواء لعلاج حالات العدوى المختلفة مدرجة أدناه:

البالغون

الحالة	الجرعة
لعلاج التهاب السحايا بالمستخفيات	400 مغ في اليوم الأول ثم 200 مغ إلى 400 مغ مرة واحدة يومياً لمدة 6 إلى 8 أسابيع أو أكثر إذا لزم الأمر. في بعض الأحيان تتم زيادة الجرعة لما يصل إلى 800 مغ
لمنع تكرار الإصابة بالتهاب السحايا بالمستخفيات	200 مغ مرة واحدة يومياً حتى تتلقى تعليمات بالتوقف
لعلاج حمى الصحراء (الطائر الكرواني)	200 مغ إلى 400 مغ مرة واحدة يومياً لمدة تتراوح ما بين 11 شهراً لما يصل إلى 24 شهراً أو أكثر إذا لزم الأمر. في بعض الأحيان تتم زيادة الجرعة لما يصل إلى 800 مغ
لعلاج حالات العدوى الفطرية التي تسببها المبيضة (كانديدا)	800 مغ في اليوم الأول ثم 400 مغ التي تسببها المبيضة (كانديدا) بالتوقف
لعلاج حالات العدوى المخاطية التي تصيب بطانة الفم والحلق وتسبب التهاب الفم تحت تركيبات الأسنان الصناعية	200 مغ إلى 400 مغ في اليوم الأول ثم 100 مغ إلى 200 مغ إلى أن تتلقى تعليمات بالتوقف
لعلاج القلاع المخاطي - الجرعة على موضع العدوى	50 مغ إلى 400 مغ مرة واحدة يومياً لمدة تتراوح بين ٧ أيام و30 يوماً إلى أن تتلقى تعليمات بالتوقف
لعلاج حالات العدوى المخاطية التي تصيب بطانة الفم والحلق	100 مغ إلى 200 مغ مرة واحدة يومياً، أو 200 مغ 3 مرات أسبوعياً، عندما يكون هناك خطر لإصابتك بعدوى
لعلاج القلاع التناسلي	150 مغ كجرعة فردية
الحد من تكرار الإصابة بالقلاع المهبلي	150 مغ كل ثلاثة أيام من إجمالي 3 جرعات (يوم 1 و4 و7) ثم مرة واحدة أسبوعياً لمدة 6 أشهر عندما يكون هناك خطر لإصابتك بعدوى
لعلاج العدوى الفطرية التي تصيب الجلد والأظفار	اعتماداً على موقع العدوى، تكون الجرعة 50 مغ مرة واحدة يومياً، أو 150 مغ مرة واحدة أسبوعياً، أو 300 مغ إلى 400 مغ مرة واحدة أسبوعياً لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى 4 أسابيع (قد تصل فترة علاج قدم الرياضي إلى 6 أسابيع، وبالنسبة لعدوى الأظفار يستمر العلاج إلى أن يحد ظفر جديد محل الظفر المصاب)
منع إصابتك بعدوى تسببها المبيضة (كانديدا) (إذا كان جهازك المناعي ضعيفاً ولا يعمل كما ينبغي)	200 مغ إلى 400 مغ مرة واحدة يومياً عندما يكون هناك خطر لإصابتك بعدوى

المراهقون من 12 إلى 17 عاماً

اتبع الجرعة التي وصفها لك طبيبك (سواء المخصصة للبالغين أو الأطفال).

الأطفال حتى 11 عاماً

تبلغ الجرعة القصوى للأطفال 400 مغ يومياً.

الحالة	الجرعة اليومية
القلاع المخاطي وحالات عدوى الحلق التي تسببها المبيضة (كانديدا) – تعتمد الجرعة والمدة على حدة العدوى وموضعها	3 مع لكل كغ من وزن الجسم (قد يتم إعطاء 6 مع لكل كغ من وزن الجسم في اليوم الأول)
التهاب السحايا بالمستغفيات أو حالات العدوى الفطرية الداخلية التي تسببها المبيضة (كانديدا)	6 مع إلى 12 مع لكل كغ من وزن الجسم
منع إصابة الأطفال بعدوى تسببها المبيضة (كانديدا) (إذا كان جهازهم المناعي لا يعمل كما ينبغي)	3 مع إلى 12 مع لكل كغ من وزن الجسم

ستعتمد الجرعة على وزن الطفل بالكيلو غرام.

5. كيفية تخزين ديفلوكان

- احتفظ بهذا الدواء بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.
- لا تستخدم ديفلوكان بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الممنون على العبوة بعد كلمة "EXP". يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في ذلك الشهر.
- يخزن في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية

لا تتخلص من أي أدوية عبر مياه الصرف أو في المخلفات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

مكونات ديفلوكان

- المادة الفعالة هي فلوكونازول.
- تحتوي كل كبسولة صلبة على 150 مغ من فلوكونازول.
- المكونات الأخرى هي:
- **محتوى الكبسولة:** لاكتوز أحادي الهيدرات ونشا الذرة والسيليك الغروانية اللامائية وستيرات المغنسيوم ولوريل سلفات الصوديوم.

مكونات غلاف الكبسولة:

كبسولات 150 مغ صلبة: جيلاتين، وثاني أكسيد التيتانيوم (E171)،وصبغة طعام زرقاء 5 (E131)

حبر الطباعة: صمغ الالك (الطبقة اللامعة)، وأكسيد الحديد الأسود، وكحول بيوتيلي عادي، وكحول مجفف، وماء منقى، وبروبيلين جليكول، وكحول ميثيل صناعي، وكحول أيزوبروبيلي، ومحلول أمونيا قوي، وهيدروكسيد البوتاسيوم

شكل ديفلوكان ومحتويات العبوة

- كبسولات ديفلوكان 150 مغ الصلبة لها جسم أزرق تركوازي وغطاء من نفس اللون. توجد على الكبسولات كمنشأ "150-FLU" و"Pfizer" مطبوعتان بالحبر الأسود.

تحتوي عبوات ديفلوكان 150 مغ على 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو 7 أو 10 أو 12 أو 14 أو 20 أو 28 أو 30 أو 42 أو 50 أو 60 أو 100 أو 500 كبسولة صلبة.

قد لا تُطرح جميع أحجام العبوات في الأسواق.

مالك تصريح التصويق

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
United Kingdom، المملكة المتحدة

الجهة المصنعة

Fareva Amboise
Zone Industrielles
29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في: أكتوبر/تشرين الأول 2015

الإبلاغ عن أي آثار (آثار) جانبية:	
المملكة العربية السعودية: المركز الوطني للتفتظ والسلامة الدوائية (NPC) لاتصال بالمركز الوطني للتفتظ والسلامة الدوائية هاتف: 2038222 11 00966 تحويلة: 2317-2356-2353-2354-2334 2340 الهاتف المجاني: 8002490000 فاكس: 205 7662 11 966+ npc.drug@sfd.a.gov.sa الموقع الإلكتروني: www.sfd.a.gov.sa/npc	الإمارات العربية المتحدة (UAE): الموقع الإلكتروني: www.moh.gov.ae هاتف: 80011111 0097142301448 البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae ص. ب 1853 دبي
العراق: الموقع الإلكتروني: www.moh.gov.iq هاتف: 0096265632000 - 0096264602550 فاكس: 0096265105916 - 0096265105893 البريد الإلكتروني: info@jfda.iq	الأردن: الموقع الإلكتروني: www.jfda.jo هاتف: 0096265632000 - 0096264602550 فاكس: 0096265105916 - 0096265105893 البريد الإلكتروني: info@jfda.jo
الكويت: الموقع الإلكتروني: www.moh.gov.kw/kdfe ص. ب. 22575، الصفاة 13086 الكويت	لبنان: الموقع الإلكتروني: www.moph.gov.lb
عمان: الموقع الإلكتروني: www.moh.gov.om هاتف: 0096824601044 0096824602287 :فاكس البريد الإلكتروني: mohphar@omantel.net.om	قطر: الموقع الإلكتروني: www.sch.gov.qa البريد الإلكتروني: info@sch.gov.qa
اليمن: الموقع الإلكتروني: www.sbd-ye.org هاتف: 009671619174 009671619173 :فاكس البريد الإلكتروني: sbdma@y.net.ye	السودان: المجلس القومي للأدوية والسموم (NMPB) 08352263:فاكس (249+) البريد الإلكتروني: info@nmpb.gov.sd الموقع الإلكتروني: www.nmpb.gov.sd
إيران: الموقع الإلكتروني: www.behdasht.gov.ir	

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي قام بصرف الدواء.
- الطبيب والصيدلي خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطر ها.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف نفس الدواء دون استشارة طبيبك.

احتفظ بجميع الأدوية بعيداً عن متناول ومرأى الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

الاستخدام مع الأطفال من 0 إلى 4 أسابيع من العمر

الاستخدام مع الأطفال من 3 إلى 4 أسابيع من العمر:

نفس الجرعة المذكورة أعلاه ولكن تعطى مرة واحدة كل يومين. الحد الأقصى للجرعة هو 12 مع لكل كغ من وزن الجسم وذلك كل 48 ساعة.

الاستخدام مع الأطفال الذين يقل عمرهم عن أسبوعين:

نفس الجرعة المذكورة أعلاه ولكن تعطى مرة واحدة كل 3 أيام. الحد الأقصى للجرعة هو 12 مع لكل كغ من وزن الجسم وذلك كل 72 ساعة.

المسنون

ينبغي أن تعطى نفس الجرعة الخاصة بالبالغين ما لم تكن تعاني من مشكلات بالكلى.

المرضى الذين يعانون من مشكلات بالكلى

قد يقوم طبيبك بتغيير الجرعة التي تتلقاها وفقاً لحالة وظائف الكلى لديك.

في حالة تعاطيك جرعة من ديفلوكان أكبر مما ينبغي

إن تناولك للعديد من الكبسولات في أن واحد يمكن أن يسبب لك التو عك. اتصل بطبيبك أو بقسم الإسعافات في أقرب مستشفى على الفور. قد تتضمن أعراض الجرعة المفرطة المحتملة سماع أشياء غير حقيقية أو رؤيتها أو الشعور بها أو التفكير بها (الهوس) والسلوك الارتبابي). قد يكون علاج الأعراض (مع تطبيق التدابير الداعمة وإجراء غسيل للمعدة إذا لزم الأمر) كافياً.

في حالة نسيانك تناول ديفلوكان

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض جرعة منسية. إذا نسيبت تناول إحدى الجرعات، فتناولها بمجرد تذكرها. إذا كان موعد جرعتك التالية قد أو شك، فلا تتناول الجرعة التي فاتتك.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة بشأن استخدام هذا الدواء، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال بالنسبة لجميع الأدوية، قد يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، غير أنها لا تصيب الجميع.

يسبب عدد ضئيل من الأشخاص **تفاعلات حساسية** بالرغم من ندرة حدوث تفاعلات الحساسية الخطيرة. إذا أصبت بأي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. يشمل هذا أي آثار جانبية محتملة وغير مدرجة في هذه النشرة. إذا أصبت بأي من الأعراض التالية، **فأخبر طبيبك على الفور.**

- الحالات المفاجئة من الأزيز، أو صعوبة التنفس، أو ضيق في الصدر
- تورم الجفنين، أو الوجه، أو الشفتين
- الشعور بحكة في جميع أنحاء الجسم أو احمرار الجلد أو بقع حمراء مسببة للحكة
- الطفح الجلدي
- التفاعلات الجلدية الشديدة، مثل الطفح الجلدي الذي يسبب التئثر (قد تصيب الفم واللسان).

قد يؤثر ديفلوكان على كبدك. تتضمن علامات وجود مشكلات بالكبد ما يلي:

- التعب
- فقدان الشهية
- القيء
- اصفرار جلدك أو الأجزاء البيضاء من عينيك (البرقان)

قد يؤثر ديفلوكان على غديتك الكظريتين وعلى مستويات الهرمونات الستيرويدية التي يتم إنتاجها. تتضمن علامات وجود مشكلات بالغديتين الكظريتين ما يلي:

- التعب
- ضعف العضلات
- فقدان الشهية
- فقدان الوزن
- ألم البطن

في حالة حدوث أي من هذه الأعراض، توقف عن تناول ديفلوكان وأخبر طبيبك على الفور.

الآثار الجانبية الأخرى:

إضافة إلى ذلك، إذا تفاقت شدة أي من الآثار الجانبية التالية بشكل خطير، أو إذا لاحظت ظهور أي آثار جانبية غير واردة في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي بذلك.

الآثار الجانبية الشائعة (قد تصيب ما يصل إلى شخص واحد بين كل 10 أشخاص) هي:

- الصداع
- اضطرابات بالمعدة، إسهال، غثيان، قيء
- زيادات في نتائج فحوصات الدم الخاصة بوظائف الكبد
- طفح جلدي

الآثار الجانبية غير الشائعة (قد تصيب ما يصل إلى شخص واحد بين كل 100 شخص) هي:

- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، الأمر الذي يمكن أن يجعل لون الجلد شاحبًا ويسبب الضعف أو عُسر التنفس
- ضعف الشهية
- عدم القدرة على النوم، الشعور بالنعاس
- نوبات أو دوام أو شعور بدوخة أو وخز أو نخذ أو تميل أو تغيرات في حاسة التذوق
- إمساك، صعوبة الهضم، امتلاء البطن بالغازات، جفاف الفم
- ألم العضلات
- تلف الكبد واصفرار الجلد والعينين (يرقان)
- برثا، ظهور بُثورات (الشرى)، حكة، زيادة العرق
- تعب، شعور عام بالتو عك، حمى

الآثار الجانبية النادرة (قد تصيب ما يصل إلى شخص واحد بين كل 1000 شخص) هي:

- انخفاض عن المعدل الطبيعي في عدد خلايا الدم البيضاء التي تساعد في حماية الجسم من العدوى وخلايا الدم التي تساعد على وقف النزيف
- تغير لون الجلد إلى اللون الأحمر أو الأرجواني والذي قد ينتج عن انخفاض تعداد الصفائح الدموية، تغيرات أخرى في خلايا الدم
- تغيرات في كيمياء الدم (ارتفاع مستويات الكوليسترول، أو الدهون في الدم)
- انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم
- رغبة
- نتائج غير طبيعية لرسم القلب ((ECG)، تغير في معدل ضربات القلب أو نظم القلب

- قُشل الكبد
- تفاعلات حساسية (أحياناً ما تكون شديدة)، بما في ذلك قُشعر الجلد والطفح الجلدي التئثري المنتشر، تفاعلات جلدية شديدة، تورم الشفتين أو الوجه
- تساقط الشعر

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا أصبت بأي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يشمل هذا أي آثار جانبية محتملة وغير مدرجة في هذه النشرة. بالإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.