

# برميكسون® 160 ملغ، كبسولات صلبة

ليبيدوستيروليك مستخرج من البليميط المنشاري الراحل

على علبة الكرتون. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور. لا ينبغي التخلص من الأدوية عبر المياه المبتدلة أو مع النفايات المنزلية. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

## 6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

- المادة الفاعلة هي الليبيدوستيروليك المستخرج من البليميط المنشاري الراحل\*. 160 ملغ.
- \* زيت مستخرج من ثمار البليميط المنشاري الراحل (بارترام الصغير). نسبة استخلاص الدواء 7:1.
- مذيب الاستخلاص: مذيب من الهيكسان.
- المكونات الأخرى هي ماكروغول 10000، هلام، حديد الأكسيد الأصفر إي 172، إنديغوفين إي 132، ثاني أكسيد النيتنيوم إي 171.

كيف هو شكل برميكسون ومعلومات العلبة  
تحتوي كل علبة من برميكسون على 30 أو 60 كبسولة صلبة. في ظرف من بولي كلوريد الفينيل / الألومنيوم. لون الكبسولات الصلبة أخضر باهت وتحتوي على معجون أصفر-أخضر.

## الشركة صاحبة رخصة التسويق

Pierre Fabre Medicament  
45, Place Abel Gance  
92100 Boulogne - FRANCE

## الشركة المصنعة

Pierre Fabre Medicament Production  
45, Place Abel Gance  
92100 Boulogne - FRANCE

تمت مراجعة هذه النشرة للمرة الأخيرة بتاريخ (ماي/أيار 2014).



بالطبيب أو بالصيدلي.  
إذا نسيتأخذ برميكسون  
لا تأخذ جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة التي نسيتها.  
تابع العلاج بدون تغيير مقدار الجرعة.  
إذا كان لديك أيّ أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، اطرحها على الطبيب أو الصيدلي.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة  
مثل الأدوية كثُلها، يمكن أن يسبب برميكسون تأثيرات جانبية  
لا تُصيب المرضى كلّهم.

التأثيرات الجانبية التي يمكن حصولها هي:

الشائعة (تصيب من شخص إلى 10 أشخاص من أصل 100)  
- صداع.  
- ألم البطن.

غير الشائعة  
(تصيب من شخص إلى 10 أشخاص من أصل 1000)  
- غثيان.

- زيادة في ناقلة الجاما غلوتاميل. زيادة معتدلة في ناقلات الأمين (إنزيمات الكبد).  
- أحمرار الجلد (طفح).  
- تشدي الرجال (تضخم الغدد الثديية لدى الرجال).

يزول هذا التأثير عند إيقاف العلاج.  
غير المعروفة معدل الحصول  
(لا يمكن تقدير معدل حصولها استناداً إلى البيانات المتوفرة)  
- أدوية.

الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية  
إذا أصبحت بأيّ تأثير جانبي، أعلم طبيبك أو الصيدلي. ينطبق  
هذا أيضًا على أيّ تأثير جانبي غير مذكور في هذه النشرة.  
يمكنك أيضًا الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية مباشرةً عبر نظام  
الإبلاغ الوطني. بالإبلاغ عن التأثيرات الجانبية، يمكنك المساعدة  
على تزويد المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيف يحفظ برميكسون  
يحفظ هذا الدواء في حرارة ما دون 25 درجة مئوية.  
يحفظ هذا الدواء بعيدًا عن نظر الأطفال ومتناولهم.  
لا تستعمل هذا الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدون

إقرأ كامل هذه النشرة بدقة قبل البدء بأخذ هذا الدواء لأنّها تحتوي على معلومات مهمة لك.

- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قرائتها مجددًا.
- إذا كان لديك أسئلة إضافية، أسأل الطبيب أو الصيدلي.
- لقد وصف هذا الدواء لك لأنّك أنت شخصياً. لا تتعطّه لأيّ أحد آخر فقد يؤذيه حتى ولو كانت عوارضه مائلة لعوارضك.
- إذا شعرت بأيّ تأثير جانبي، أعلم طبيبك أو الصيدلي. ينطبق هذا أيضًا على أيّ تأثير جانبي غير مذكور في هذه النشرة.

الرجاء مراجعة القسم 4.

## في هذه النشرة:

- ما هو برميكسون وما هي دواعي استعماله
- ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تأخذ برميكسون
- كيف يؤخذ برميكسون
- التأثيرات الجانبية المحتملة
- كيف يحفظ برميكسون
- معلومات العلبة ومعلومات أخرى

تفاعل برميكسون مع أدوية أخرى  
أعلم طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تستعمل أو استعملت  
مؤخرًا أيّ أدوية أخرى.

لم تلاحظ أيّ تفاعلات مع أدوية أخرى تُستعمل كثيراً لعلاج  
هذا المرض (المضادات الحيوية البولية، مانعات الإنثالان، مضادات  
الالتهاب). لتفادي أيّ تفاعلات محتملة بين عدّة أدوية، يجب أن  
تعلم طبيبك أو الصيدلي بكل العلاجات الأخرى التي تتبعها.

برميكسون مع الطعام والشراب  
يُنصح بأخذ برميكسون مع الطعام ومع كوب من الماء بدون  
مضغه.

الحمل والإرضاع والخصوبة  
لا يوصى هذا الدواء للنساء.  
استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال أيّ دواء.  
قيادة السيارات واستعمال الآلات

لم تلاحظ أيّ تأثيرات على قيادة السيارات أو استعمال الآلات.

3. كيف يؤخذ برميكسون  
إذا كنت تعاني من حساسية ضدّ المادة الفاعلة  
خذ برميكسون دائمًا حسب وصفة الطبيب تمامًا. إذا كان  
لديك أسئلة أخرى، اطرحها على الطبيب أو الصيدلي.  
تبلغ الجرعة الموصى بها كبسولة واحدة مرتين في اليوم مع  
ال الطعام مع بعض الماء.

الاستعمال لدى الأطفال والراهقين  
لا يوصى هذا الدواء للأطفال والراهقين.  
إذا أخذت كمية زائدة من برميكسون  
تظهر عوارض اضطرابات معدية معوية عابرة (ألم في البطن).  
في حال أخذ جرعة مفرطة أو ابتلاع الدواء عرضيًّا، اتصل  
خلال العلاج يجب أن تكون خاتمة مراقبة طبية مستمرة.

1. ما هو برميكسون وما هي دواعي استعماله  
ينتمي برميكسون إلى مجموعة من الأدوية تُستعمل لعلاج  
تضخم البروستات الحميد ويعمل على مستوى البروستات  
محسنًا العوارض المتعلقة بتضخم البروستات الحميد.  
يُستعمل برميكسون لدى الرجالين الذين يعانون من تضخم البروستات الحميد.

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تأخذ برميكسون  
لا تأخذ برميكسون

إذا كنت تعاني من حساسية ضدّ المادة الفاعلة  
الليبيدوستيروليك المستخرج من البليميط المنشاري الراحل  
أو ضدّ أيّ مكون آخر من مكونات هذا الدواء (المذكورة في  
القسم 6).

التحذيرات وأمراض  
حدثت إلى طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ برميكسون.  
فلا يُسبب أحد الدوائين على معدة فارغة غثيانًا وبالتالي يجب  
أخذ الدواء مع الطعام.  
لا يمكن أن يحلّ برميكسون محلّ استئصال البروستات. وفي  
حال العلاج يجب أن تكون خاتمة مراقبة طبية مستمرة.