

PRAZINIL 50 mg

Comprimés pelliculés sécables

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est préconisé dans certains troubles de l'humeur.

CONTRE-INDICATIONS

Atteinte hépatique ou rénale grave.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISE EN GARDE

Prévenir le médecin en cas de grossesse.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Prévenir le médecin en cas de trouble du rythme cardiaque.

S'abstenir de boissons alcoolisées pendant la durée du traitement.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, EN PARTICULIER EN CAS DE PRISE DE MEDICAMENT CONTRE LA DEPRESSION (DE LA CLASSE DES IMAO).

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS SUR LA CAPACITE DE CONDUIRE DES VEHICULES OU D'UTILISER DES MACHINES.

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machine sur les risques éventuels d'altération de la vigilance.

557501 B

057 175 W

AUTRES EFFETS POSSIBLES DU MEDICAMENT

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- hypotension orthostatique (sensation de vertige au lever brutal).
- troubles hormonaux : troubles des règles, tension des seins.
- difficulté d'endormissement.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

CONDITIONS DE DELIVRANCE

AMM : 320 437.0 (24 comprimés pelliculés sécables).

Ce médicament est inscrit sur la liste I - Remb. SS. Admis aux collectivités.

NE PEUT ETRE OBTENU QUE SUR ORDONNANCE MEDICALE.

DUREE DE STABILITE

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUEE EN CLAIR SUR L'ETUI.

Laboratoires Pierre Fabre
Pierre Fabre Médicament

45, place Abel Gance - 92100 Boulogne