

Dermofix creme

Sertaconazole 2%

Action pharmacologique

Le Sertaconazole est un nouvel antimycosique topique doté d'une puissante activité fongicide, avec un large spectre d'activité dans lequel on inclut les levures pathogènes (*Candida albicans*, *C. tropicalis*, *C. spp.* *Pityrosporum orbiculare*), les dermatophytes (*Trichophyton*, *Epidermophyton* et *Microsporum*) et d'autres agents causants et accompagnants des infections de la peau et des membranes muqueuses comme les germes gram-positifs (*Staphylocoques* et *Streptocoques*).

Composition

Par g. de crème:

Sertaconazole nitrato 20 mg

Excipients (palmito stéarate d'éthyléneglycol et polyéthyléneglycol, lauroyl macroglycériles, isostéarate de glycérol, paraffine liquide légère, nipagin, acide sorbique, eau) q.s.

Indications

Traitement topique des mycoses superficielles de la peau, comme les dermatophytoses, *Tinea pedis* (pied d'athlète), *Tinea cruris* (eczéma de Hébra), *Tinea corporis* (herpès circinatus), *Tinea barbae* (mycose de la barbe) et *Tinea manus*, *Candidiase* (*Moniliose*) et *Pityriasis versicolor* (*Pityrosporum orbiculare*, *Malassezia furfur* auparavant).

Posologie

Appliquer la crème une ou deux fois par jour (de préférence le soir ou le matin et le soir), doucement et uniformément sur la lésion, en tâchant, en outre, de couvrir 1 cm de peau saine (environ) autour de la zone affectée. La durée du traitement pour obtenir la guérison varie d'un patient à un autre, en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection. En général, on recommande quatre semaines de traitement pour assurer une guérison clinique et microbiologique complète et la non apparition de récurrences, bien que, dans beaucoup de cas, cette guérison clinico-microbiologique apparaît avant, entre deux et quatre semaines de traitement.

Contre-indications

Ne pas administrer en cas d'allergie connue au produit ou à l'un des constituants de l'excipient.

Précautions

DERMOFIX ne doit pas être utilisé pour des traitements ophtalmologiques.

Interactions médicamenteuses

On n'a pas rapporté d'interactions.

Effets indésirables

Sa sécurité en traitement local est excellente; on n'a pas observé d'effets toxiques ou photosensibles. Il y a eu des rapports isolés de réaction érythémateuse locale légère et passagère pendant les premiers jours de traitement; il n'a pas été nécessaire d'arrêter le traitement.

Utilisation pendant la grossesse

Après l'application topique de grandes quantités, on ne détectera pas de niveaux plasmatiques; malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée chez les femmes enceintes; par conséquent, on doit évaluer la relation risque-bénéfice avant son utilisation pendant la grossesse et chez les mères qui allaitent.

Surdosage et son traitement

En considérant la concentration de substance active et la voie d'administration, l'intoxication est impossible; cependant, en cas d'ingestion accidentelle, on doit appliquer le traitement symptomatique adéquat.

Présentation

Crème à 2%.

Emballages contenant 20 g et 30 g.

Gardez à une température inférieure à 30°C.

On doit garder les médicaments hors de la portée et de la vue des enfants.

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94
08028 Barcelona (España)

5002361/9-0702