

Inongan

CRÈME

DÉNOMINATION : INONGAN, Crème

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

SALICYLATE DE MÉTHYLE : 12,50 g

CAMPHRE RACEMIQUE : 1,00 g

pour 100 g de crème.

EXCIPIENTS :

Sédéflos 75 ® (distéarate d'éthylène et de diéthylène glycol associé à un phosphate d'alcools gras polyoxyéthyléné), Labrafil M2130 ® (glycérides polyglycosylés saturés), paraffine liquide, menthol racémique, huile essentielle d'eucalyptus, eau purifiée.

FORME PHARMACEUTIQUE : Crème, tube de 55 g.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :
à visée antalgique (M. Système locomoteur).

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

TraITEMENT local d'appoint des douleurs d'origine musculaire et tendino-ligamentaire de l'adulte.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Allergie aux salicylés, à un médicament apparenté (AINS, aspirine) ou à un autre des composants.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux, sur une plaie, une lésion suintante, une lésion infectée ni sous pansement occlusif.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES :

Cette spécialité contient du camphre et du menthol (dérivés terpéniques) qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.

Respectez les conseils d'utilisation :

- Ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée (Cf. Rubrique POSOLOGIE),
- Ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- Respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ce médicament est réservé à l'adulte.
- En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.
- Après usage, il est nécessaire de se laver les mains pour éviter tout contact involontaire du produit avec les yeux et les muqueuses.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Inongan

CRÈME

INTÉRACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTÉRACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTÉRACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et, en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT :

POSOLOGIE : RÉSERVÉ À L'ADULTE

En massages locaux sur la zone douloureuse, 1 à plusieurs fois par jour.
Se laver les mains après utilisation.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie cutanée.

DURÉE DU TRAITEMENT : Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS :

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- Éventuelle réaction allergique locale nécessitant l'arrêt du traitement,
- Possible rougeur cutanée normale au point d'application,
- En cas de non respect des doses préconisées, possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés (en raison de la présence de camphre et de menthol).

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION :

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure ou égale à 25° C.

MÉDICAMENT AUTORISÉ 341 589-4

EXPLOITANT :

SOFIBEL : 110-114 rue Victor-Hugo – 92686 Levallois-Perret Cedex – France

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Septembre 1997.