

أوريلوكس® 100 ملغ

سيفيدوكسيم

قرص مغلف بطبقة رقيقة

التعريف بالدواء

التركيب

سيفيدوكسيم بروكسيتيل 130.45 ملغ
الكمية المعادلة لسيفيدوكسيم 100.00 ملغ
الأسوة: ستيرات المغنيزيوم، كاربوكسيمثيل سلولوز الكالسيوم، هيدروكسيبروبيلسلولوز،
سلفات لوريل الصوديوم، لكتوز، ثاني أكسيد التيتانيوم، طلق، هيدروكسيبروبيل سلولوز
الميثيل لقرص واحد مغلف بطبقة رقيقة.

الشكل الصيدلاني

قرص مغلف بطبقة رقيقة. (علبة من 10 أقراص).

الفئة الدوائية العلاجية

هذا الدواء هو مضاد حيوي مضاد للبكتيريا وينتمي لمجموعة المضادات الحيوية بيتالكتام.

الشركة الموزعة

sanofi-aventis france
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris - France

المصنع

Sanofi Winthrop Industrie
56, route de Choisy-au-Bac
60205 Compiègne - France

متى يُستعمل هذا الدواء؟

يُستعمل هذا الدواء لدى كبار لعلاج بعض الالتهابات البكتيرية التي تسببها جرثومات حساسة.

تحذير!

متى يُمنع استعمال هذا الدواء؟

يُمنع استعمال هذا الدواء في حال الإصابة بحساسية معروفة ضد المضادات الحيوية التي تنتمي إلى مجموعة السيفالوسبورين.

في حال الشك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة

- يجب إعلام الطبيب فوراً بأي عوارض حساسية (طفح جلدي، حكة...) تظهر خلال العلاج.
- قد يصاب المرضى الذين يعانون من حساسية ضد البنيسيلين (5% إلى 10% من الحالات) بحساسية ضد هذا الدواء.
- أعلم الطبيب بأي حساسية أو عوارض تحسسية أصبت بها خلال العلاج بالمضادات الحيوية التي تنتمي إلى فئة البنيسيلين.
- يجب عدم معالجة الإسهال الذي يحصل خلال علاج بعضاً حيوي من دون استشارة الطبيب.
- بسبب احتواء هذا الدواء على اللاكتوز، يُمنع استعماله لدى المرضى الذين يعانون من من وجود الغالاكتوز في الدم ومن تتأثر سوء امتصاص الغلوكوز والغالاكتوز أو من نقصان اللاكتاز (أمراض أيضية نادرة).

محاذير الاستعمال

- بسبب حاجة تكيف العلاج، من المهم إعلام الطبيب بأي مرض كلوي.
- يمكن أن يعطي هذا الدواء نتائج إيجابية خاطئة لبعض التحاليل المخبرية (الغلوكوز في البول، الفحص المضاد للغلوبولين).

احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

عند الشك لا تتردد باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

التفاعلات الدوائية وتفاعلات أخرى:

بغية تفادي التفاعلات الممكنة مع أدوية أخرى، يجب عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي بأي علاج حالي آخر.

الحمل والإرضاع

الحمل:

يمكنك استعمال هذا الدواء خلال الحمل بناءً على نصيحة طبيبك فقط.
في حال اكتشفت أنك حامل أثناء علاجك بهذا الدواء، استشير طبيبك الذي يقرر وحده بشأن استكمال تناول هذا الدواء.

الإرضاع:

يمكنك الإرضاع في حال كنت تخضعين لعلاج بهذا الدواء.
ولكن في حال حصول اضطرابات في الجهاز الهضمي (إسهال، داء المبيضات) أو ظهور طفح جلدي لدى طفلك، توقفي عن الإرضاع وأخذ هذا الدواء واستشير طبيبك على وجه السرعة.

كقاعدة عامة، يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي دائماً قبل تناول أي دواء خلال فترتي الحمل أو الإرضاع.

قيادة السيارات وتشغيل الآلات

إذا شعرت بالدوار بعد تناول هذا الدواء، يجب عليك ألا تقود السيارة أو تشغل آلة ما.

لاحة الأسوة التي يجب أخذها بعين الاعتبار للاستعمال الآمن لدى بعض

المرضى
اللاكتوز

أعلم الطبيب أو الصيدلي بأي تأثيرات غير مرغوب بها أو مزعجة غير مذكورة في هذه النشرة.

الحفظ

لا تستعمل الدواء بعد انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة الخارجية.

محاذير خاصة للحفظ

احفظ الدواء في مكان لا تفوق درجة حرارته 25 درجة مئوية.

تاريخ مراجعة النشرة

تموز 2008.

رقم التسجيل: 08/13B 332/376

ان هذا الدواء

مستحضر يوتر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر. اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و في نفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الادوية في متناول الاطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

الجرعات

يتوقف مقدار الجرعة على الدواء العلاجي. للمعلومات فقط تبلغ الجرعة العادية من 200 إلى 400 ملغ باليوم. يجب تعديل الجرعة لدى المرضى الذين يعانون من قصور كلوي.

في مطلق الأحوال تقيد بدقة بوصفة الطبيب.

طريقة الاستعمال

عبر الفم.

وقت وعدد مرات الاستعمال

يجب تناول هذا الدواء مرتين في اليوم مع الطعام.

مدة العلاج

كأن يكون المضاد الحيوي هذا فعّالاً، يجب أن يستعمل بانتظام حسب الجرعات وطول المدة التي وصفها طبيبك. في حال اختفاء الحمى أو أي عارض من العوارض، لا يعني ذلك أنك شفيت تماماً. وإن أي شعور بالتعب ليس بسبب العلاج بالمضاد الحيوي بل بسبب الالتهاب لذا فإن تخفيف العلاج أو إيقافه لن يؤثر على شعورك بالتعب بل سيؤخران شفاؤك. حالات خاصة، يجب أن يدوم علاج بعض حالات التهاب الجيب والتهاب اللوزتين لخمسة أيام.

الخطوات التي يجب اتخاذها في حال فرط الجرعة

أعلم طبيبك فوراً.

التأثيرات الجانبية المزعجة وغير المرغوب بها

بصورة أساسية:

- العوارض الهضمية: إسهال، غثيان، تقيؤ، ألم في البطن.
بصورة نادرة أكثر:

- العوارض الهضمية: كما مع المضادات الحيوية الأخرى ذات الطيف العريض، أفيد عن حالات نادرة من التهاب المعى الدقيق والقولون (التهاب معوي) مع إسهال دموي والتهاب القولون الغشائي الكاذب (مرض يصيب المعى الخليط يتميز بمرور الأغشية الكاذبة أو المخاط السميك في البراز ويرافقه إمساك وألم في البطن).
- ارتفاع بسيط في معدلات انزيم الكبد.
- عوارض تحسسية: طفح جلدي، حكة، تنفط جلدي، أوديم و عائية عصبية، (تورم تحسسي مفاجيء في الوجه والعنق) وصدمة إرجية،
- حالات جلدية: عدة أنواع من الطفح، طفح نفاطني موضعي، حمامي متشككة، (مرض يرافقه حمامي جلدية)، تنانير ستيفنز- جونسون وتنانير ليل (انفلاق جلدي يمكن أن ينتشر بسرعة وبخطورة في الجسم كله).

- صداع،

- دوار،

- ارتفاع طفيف في معدلات البولة والكرياتينين في الدم.

- الحالات المتعلقة بالدمويات: انخفاض أو ارتفاع معدل اللويحات وعدد كريات الدم البيض، انخفاض كبير ولكن استثنائي في عدد بعض كريات الدم البيض (المحببات).