كوردارون® 200 ملغ

Cordarone ® 200 mg

أميودارون

قرص قابل للقطع

الرجاء قراءة هذه النشرة كاملة، قبل استعمال هذا الدواء.
- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى أو شكوك، إسأل الطبيب أو الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصيًّا. لا تعطه أبداً إلى شخص آخر حتّى إذا كانت عوارضه مماثلة لعوارضك لأنّه قد يؤذيه.
- في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبيّة أو في حال لاحظت تأثيرات جانبيّة غير مذكورة في هذه النشرة، أعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هي أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع وما هي دواعي استعمالها
2. قبل أن تأخذ أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع
3. كيف تأخذ أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع
4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة
5. كيف تُحفظ أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع
6. معلومات إضافيّة

1. ما هي أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع وما هي دواعي استعمالها

مضادات اللانظميّة، الفئة III

يُستعمل هذا الدواء للوقاية من بعض اضطرابات النظم القلبي وعلاجها.

2. قبل أن تأخذ أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع

إذا قال لك طبيبك إنّك لا تتحمّل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل أخذ هذا الدواء.

يُمنع استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:
- حساسيّة معروفة ضدّ الإيودين أو الأميودارون أو ضدّ أحد المركّبات الأخرى في الدواء،
- التدرقن،
- بعض اضطرابات النظم القلبي و/أو التوصيل القلبي،
- بطء كبير في سرعة القلب،
- ابتداء من الفصل الثاني من الحمل،
- الإرضاع،
- بالتزامن مع بعض الأدوية التي يُحتمل أن تسبّب التواء أطراف البطينين بسبب كثرة خفقانها (اضطرابات خطيرة في النظم القلبي):
  - – مضادات اللانظميّة من الفئة Ia (كينيدين، هيدروكينيدين، ديسوبيراميد)،
  - – مضادات اللانظميّة من الفئة III (سوتالول، دوفيتيليد، إيبوتيليد)،
  - – أدوية أخرى (ثلاثي أكسيد الزرنيخ وبيبريديل وسيزابرايد وديفيمانيل ودولازيترون داخل الوريد وايريثرومايسين داخل الوريد وميزولاستين وموكسيفلوكساسين وسبيراماسين داخل الوريد وتوريميفين وفينكامين داخل الوريد) (راجع فقرة «أخذ أو استعمال أدوية أخرى»).

إعتمد عناية خاصة مع أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع

تحذيرات خاصة

أعلم طبيبك المعالج إذا عانيت من ضيق نفس غير عادي أو من صعوبة في التنفّس أو من سعال جاف لوحده أو من تدهور طويل الأمد أو غير مبرّر في الصحّة العامة أو من تعب أو من حرارة مرتفعة أو إذا أصبت بإسهال أو بخسارة وزن أو بألم عضلي أو بضعف في النظر أو إذا بدأ معدّل ضربات القلب بالتسارع.
لا يجدر بك أخذ هذا الدواء إذا كنت تعاني من عدم تحمّل الغالاكتوز أو من نقص لاب لاكتاز أو من تنادر سوء امتصاص الغلوكوز–غالاكتوز (أمراض وراثيّة خطيرة).
لا يُنصح باستعمال الأميودارون بالتزامن مع السيكلوسبورين والديلتيازيم (حقن) والفيراباميل (حقن) وبعض مضادات الطفيليّات (هالوفانترين، لوميفانترين، بنتاميدين) وبعض المهدّئات العصبيّة (أميسولبرايد، كلوربرومازين، سياميمازين، دروبيريدول، فلوفينازين هالوبيريدول، ليفوميبرومازين، بيموزيد، بيبامبيرون، بيبوتيازين، سرتندول، سولبيريد، سولتوبريد، تيابريد، زوكلوبنثيكسول) والميثادون (راجع فقرة «أخذ أو استعمال أدوية أخرى»).

محاذير الاستعمال

إحم نفسك من الشمس طيلة مدّة العلاج لتفادي ردّة فعل من نوع «ضربة الشمس».
في خلال مدّة العلاج، قد يُطلب منك إجراء فحوصات دم لمراقبة غدّتك الدرقيّة أو كبدك.
إذا كنت تضع ناظمة لضربات القلب أو زُرع لك مزيل رجفان ومقوّم للنظم القلبي يجب عليك أن تطلب من طبيبك التأكّد مما إذا كان الجهاز يعمل كما يجب قبل البدء بالعلاج بالأميودارون وعدّة مرّات في خلال العلاج وفي أيّ وقت يتمّ فيها ضبط الجرعة.
قبل الخضوع لجراحة، قل لطبيب التخدير إنّك تتلقّى علاجًا بالأميودارون.
إنّ سلامة أميودارون وفعاليّته غير معروفين لدى الأطفال.

أخذ أو استعمال أدوية أخرى

لا ينبغي استعمال هذا الدواء بالتزامن مع بعض الأدوية التي يُحتمل أن تسبّب التواء أطراف البطينين بسبب كثرة خفقانها (اضطرابات خطيرة في النظم القلبي) مثل الأدوية التي توصف في علاج اللانظميّة (كينيدين، هيدروكينيدين، ديسوبيراميد، دوفيتيليد، إيبوتيليد، سوتالول) وأدوية أخرى (مثل ثلاثي أكسيد الزرنيخ وبيبريديل وسيزابرايد وديفيمانيل ودولازيترون داخل الوريد وايريثرومايسين داخل الوريد وميزولاستين وموكسيفلوكساسين وسبيراماسين داخل الوريد وفينكامين داخل الوريد).
يجب تفادي استعمال هذا الدواء بالتزامن مع السيكلوسبورين والديلتيازيم القابل للحقن والفيراباميل القابل للحقن وبعض الأدوية المضادة للطفيليّات (هالوفانترين، لوميفانترين، بنتاميدين) وبعض المهدّئات العصبيّة (أميسولبرايد، كلوربرومازين، سياميمازين، دروبيريدول، فلوفينازين هالوبيريدول، ليفوميبرومازين، بيموزيد، بيبامبيرون، بيبوتيازين، سرتندول، سولبيريد، سولتوبريد، تيابريد، زوكلوبنثيكسول) والميثادون (راجع فقرة «تحذيرات خاصة»).
لتفادي التفاعلات الممكنة بين عدّة أدوية، يجب عليك أن تُعلم طبيبك أو الصيدلي دائماً بأيّ علاج آخر قد تكون تتلقّاه.

الحمل والإرضاع

الحمل

يُمنع استعمال هذا الدواء ابتداء من الفصل الثاني للحمل لأنّه يحتوي على الإيودين.
استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أيّ دواء.

الإرضاع

يُمنع الإرضاع خلال فترة استعمال هذا الدواء.
استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أيّ دواء.

لائحة الأسوغة التي لها تأثيرات خاصة: لاكتوز.

3. كيف تأخذ أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع

مقدار الجرعة

تتغيّر الجرعة العاديّة حسب الشخص ولكنّها تكون عادة على النحو الآتي:
- العلاج الأوّلي (جرعة التحميل): 3 أقراص يوميًا لمدّة 8 إلى 10 أيّام،
- علاج الصيانة: من نصف قرص إلى قرصين يوميًا.

يجب عليك دائمًا التقيّد بالوصفة تقيّدًا تامًا وعدم تغيير مقدار الجرعة بدون استشارة الطبيب. وكذلك لا يجدر بك إيقاف العلاج من دون استشارة الطبيب.

طريقة للاستعمال

عن طريق الفم.

عدد مرّات الاستعمال

يمكن بلع الأقراص قبل الطعام أو في خلاله أو في وقت بعيد عنه. لا تتغيّر خواص القرص إذا سُحق.

مدّة العلاج

تقيّد بدقّة بوصفة الطبيب.

إذا أخذت كميّة مفرطة من أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع

إذا أخذت جرعة مفرطة من هذا الدواء، اتصل فورًا بطبيبك أو بمركز معالجة تسمّم في منطقتك.

إذا نسيت أخذ أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع

لا تتعرّض لأيّ خطر إذا نسيت أخذ قرص. لا تأخذ جرعة مضاعفة للتعويض عن القرص الذي نسيت أخذه.

4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة

مثل الأدوية كلّها يمكن أن تسبّب أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع تأثيرات جانبيّة لا تصيب المرضى كلّهم.
يجب أن تُعلم طبيبك بالتأثيرات الجانبيّة وسوف يقول لك إذا كان عليك مواصلة العلاج أو إيقافه.

التأثيرات الشائعة جداً:
- اضطرابات بصريّة (شعور بالتواجد داخل الضباب أو رؤية هالات ملوّنة حول الأشياء)،
- حساسيّة جلديّة من الشمس،
- تغييرات في الغدد الدرقيّة بدون إشارات سريريّة تدلّ على مرض في الغدة الدرقيّة،
- ارتفاع في بعض انزيمات الكبد في الدم (ناقلات الأمين)،
- اضطرابات معديّة معويّة حميدة (غثيان، تقيّؤ، طعم سيّئ في الفم).

التأثيرات الشائعة:
- بشرة رماديّة اللون،
- مرض في الغدة الدرقيّة (زيادة وزن، الشعور بالبرد وبالتعب، أو على العكس خسارة كبيرة في الوزن وإسهال)،
- صعوبات في التنفّس (صعوبة في التنفّس، ضيق نفس، حمى، سعال جاف) يمكن أن تكون خطيرة جدًا،
- رُعاش،
- صعوبة في النوم وكوابيس،
- صعوبات في السير (ضرر في أعصاب الساقين)،
- ضرر حاد في الكبد و/أو يرقان يمكن أن يكون خطيرًا جدًا،
- تباطؤ سرعة القلب.

التأثيرات غير الشائعة:
- اضطرابات في التوصيل القلبي،
- تضرر عضلات الذراعين والساقين.

التأثيرات النادرة جدًا:
- عدم وضوح الرؤية أو ضعفها،
- ارتكاسات جلديّة مع احمرار وحكّة،
- تساقط الشعر،
- صعوبات في التنفّس لدى المرضى المصابين بالربو أو خلال الجراحة مما يمكن أن يكون خطيرًا جدًا،
- ضرر مزمن في الكبد،
- تباطؤ كبير في سرعة القلب،
- انخفاض في عدد الصفيحات الدمويّة،
- ضرر كلوي،
- صداع (إذا أصبت بصداع استشر الطبيب)،
- انخفاض في صوديوم الدم.

التأثيرات غير المعروفة:
- نزف رئوي غالبًا ما يترافق مع صعوبات في التنفّس،
- ارتكاس تحسسي مع تورّم الوجه والعنق.

إذا لاحظت أيّ تأثيرات جانبيّة غير مذكورة في هذه النشرة، أو إذا تفاقم أحد التأثيرات الجانبيّة الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي.

5. كيف تُحفظ أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع

إحفظ الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال ونظرهم.
لا تستعمل أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع بعد انقضاء تاريخ الصلاحيّة المدوّن على العلبة.
إحفظ هذا الدواء في حرارة ما دون30 درجة مئويّة.
لا ينبغي رمي الأدوية في المياه المبتذلة أو مع النفايات المنزليّة. إسأل الصيدلي ما الذي يجب فعله بالأدوية غير المستعملة، فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. معلومات إضافيّة

ماذا تحتوي أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع

المادة الفاعلة هي:

هيدروكلوريد الأميودارون...200 ملغ
في القرص الواحد القابل للقطع.

المكوّنات الأخرى هي:

لاكتوز، نشا الذرة، بوفيدون، سيليكا غروانيّة لامائيّة، ستيارات المغنيزيوم.

كيف هو شكل أقراص كوردارون 200 ملغ القابلة للقطع ومحتويات العلبة

هذا الدواء هو قرص قابل للقطع. علبة من 30 قرصًا.

الشركة الحاملة رخصة التسويق والشركة المشغّلة

sanofi-aventis France
1- 13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris – France

الشركة المصنّعة

Sanofi Winthrop Industrie
1, Rue de la Vierge,
Ambares & Lagrave
33565 Carbon Blanc Cedex – France

تاريخ المراجعة الأخيرة لهذه النشرة: حزيران 2011.

ان هذا الدواء

مستحضر يوثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و في نفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الادوية في متناول الاطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلـة العرب.