



الوريد وأورديروماسين داخل الوريد وميزو-لاستين وموكسيفلوكاسين وسيبراماسين داخل الوريد وفيكتامين داخل الوريد). لا تتحقق موانع الاستعمال هذه في حال استعمال الأدوية دون في الانتعاش القلبي النبوي بالتزامن مع الرجحان النطفي المقاوم للصدمة الكهربائية الخارجية (راجع فقرة «موانع الاستعمال»). يجب تفادى استعمال هذا الدواء بالتزامن مع السوكلسورفين والدبلاتيزام القابل للحقن والغيرقابل القابل للحقن وبعض الأدوية المساعدة للطفيليات (هالوفاترين، لوبيفاترين، بنيكتدين)، بعض المهدئات المصمية (أسيتيلبارابايت، كلوروهورازين، ساميمازين، دروبوريديول، فلوفونيتازين، سارندول، سوليوريد، تياباريد، زوكافونتيكسول) والميثادون (راجع فقرة «التطبيقات الخاصة»). تفادى التفاعلات الممكنة بين مدة أدوية يجب عليك أن تحلم طلبتك أو السيدلاتي داماً باى خرق في ذلك تكون تناقض.

الحمل والإرضاع

باستثناء الحالات الطارئة التي تكون فيها حياة المريض معرضة للخطر، بسبب احتواء الدواء على الإيودين، يمنع استعمال هذا الدواء ابتداء من الفحص الثاني للحمل.

الإرضاع

يمنع الإرضاع خلال فترة استعمال هذا الدواء.
استشيري الطبيب أو السيدلاني قبل استعمال أي دواء.
لانحة الأسوغة التي لها تأثيرات محددة، تحكم بنزيل.

3. كيفر يستعمل كوردارون 150 ملغ / 3 مل، محلول الحقن داخل الوريد، في أنيولات يجب بانتها استعمال كوردارون 150 ملغ / 3 مل محلول الحقن داخل الوريد في أنيولات في محظي استثنائي متخصص مع مراقبة دائمة لمحظي كهربائية القلب وضغط الدم،
باستثناء الحالات الطارئة التي تكون فيها حياة المريض معرضة للخطر.
ما هي كمية كوردارون 150 ملغ / 3 مل، محلول الحقن داخل الوريد في أنيولات التي يجب استعمالها

* في علاج بعض اضطرابات القلب في النظم القلبي بالرجحان النطفي المقاوم القلبي النبوي في حالة توقف القلب المتعلق بالرجحان النطفي المقاوم للصدمة الكهربائية الخارجية.
علاج أولى (جرعة التحمل) تبلغ الجرعة العادمة 5 ملغ / كلغ من وزن الجسم يمكن إعادة الحقن مرتين أو 3 مرات على فترة 24 ساعة.
علاج صيانة، تترواح الجرعة بين 10 و 20 مل للكيلوغرام الواحد في اليوم على دose يومية ثانية.
ستتناول كذلك أفراد كوردارون ابتداء من اليوم الأول من التسريح كجرعة من 3 فراش في اليوم.

يمكن زيادة هذه الجرعة إلى 4 أو حتى 5 فراش في اليوم حسب الحاجة.
* + للارتفاع القلبي النبوي في حالة توقف القلب المتعلق بالرجحان النطفي المقاوم للصدمة الكهربائية الخارجية
51451517031154
يُنصح باستخدام قطرر وريدي مركزي إذا كان متوفراً على الفور، والأيضاً يمكن حقن الدواء عبر المكبس الوريدي المحضي باستعمال الوريد المحضي الأكبر الذي له

- مضادات الانقباضية من الفئة IIIA (كينتين، هيدروكلوتين، ديسوبيراميد).

- مضادات الانقباضية من الفئة III (ستوال، ديفيتلين، إيبولينيد).

- أخرى أخرى (نانثي اكسيد الزرنيخ وبيبريديل وسولاريديول وديفينيلين وديلازيرتونين داخل الوريد وأورديروماسين داخل الوريد وميزو-لاستين وموكسيفلوكاسين وسيبراماسين داخل الوريد وبيوريدامين وبنكتامين داخل الوريد). (راجع فقرة «موانع الاستعمال أو تناول أو استعمال آخرى»). لا تتحقق موانع الاستعمال هذه على استعمال الأدوية دون في حال تناول أو استعمال آخرى.

اعتمد عنابة خاصة مع كوردارون 150 ملغ / 3 مل، محلول الحقن داخل الوريد في أنيولات

احتذارات خاصة

* اضطرابات الخطيرة في النظم القلبي عندما لا يمكن الاستعمال عن طريق الفم مناسبًا باستثناء الانتعاش القلبي النبوي في حالة توقف القلب المتعلق بالرجحان النطفي المقاوم للصدمة الكهربائية الخارجية.
يجب عدم حقن هذه الدواء مطلقاً عبر المكبس المحضي داخل الوريد.
يجب عدم استخدام قطرر مركزي للحقن.

* الانتعاش القلبي النبوي في حالة توقف القلب المتعلق بالرجحان النطفي المقاوم للصدمة الكهربائية الخارجية.
يُنصح باستخدام قطرر وريدي كيفر إذا كان متوفراً على الفور، والأيضاً يمكن حقن الدواء عبر المكبس الوريدي المحضي باستعمال الوريد المحضي الأكبر الذي له القدرة على دفع مسكن.
لا تختلف أي منتجات أخرى إلى المخفة.

* حتى عملية الحقن التدريجية المبالغة يمكن أن تفاقم اضطرابات النظم القلبي، تقص ضغط الدم أو الضمور القلبي، أو أن تسبب اضطرابات في التنفس / أو الكبد يمكن تطلب إجراء عمليات جراحية مثل هذه العلاج مرافق وظيفة الكبد.
لا يُنصح باستخدام الأدوية دون في التناول مع السوكلسورفين والدبلاتيزام (حقن) والغيرقابل (حقن) وبعض اضطرابات الطفيلي (هالوفاترين، لوبيفاترين، ساميمازين، دروبوريديول، فلوفونيتازين، ساميمازين، بيوريدامين، بيريوريدامين، بيريوريدول، سارندول، سوليوريد، سولوريوريد، تياباريد، زوكافونتيكسول) والميثادون (راجع فقرة «تناقل آخرى»).

محاذير الاستعمال

يج استعمال هذا الدواء بحذر لدى المرضى المصابة باضطرابات في المثلثات الكهربائية لا سيما ينتاب في الموatas يوم.

باستثناء الحالات الطارئة التي تكون فيها حياة المريض معرضة للخطر، يجب فقط استعمال هذا الدواء في محظي استثنائي متخصص وتحت مراقبة دائمة.
علم طبيب التخدير أن تناول علاج بالأدوية دون قبل الجراحة.

لا يُنصح استخدام هذا الدواء بالتزامن مع بعض الأدوية التي تحتل أن تسبب التواء أطراف الطفيلي بحسب كثرة تفاصيلها (اضطراب خلير في النظم القلبي) مثل الأدوية التي توقف في علاج الانقباضية (كينتين، هيدروكلوتين، ديسوبيراميد، ديفيتلين، ستوال)، وأدوية أخرى (نانثي اكسيد الزرنيخ وبيبريديل وسولاريديول، ديفينيلين، ستوال).

CORDARONE® 150 mg/3 ml

كوردارون® 150 ملغ / 3 مل

محلول للحقن داخل الوريد في أنيولات

اميودارون

الرجاء قراءة هذه الشارة كاملة، قبل استعمال هذا الدواء.

* احتذرت بهذه الشارة ضد تناول إلى سلطتها مجرد.

** إنكانت لديك أسلطة أخرى أو تدرك إأسال الطبيب أو الصيدلاني.

*** إن دفعت هذه الدواء لك شخص آخر، لا تعلمه أبداً إلى شخص آخر حتى إذا كانت عوارضه مماثلة.

**** لارجوا ذلك لأنك قد تشعر بالدوار أو تشك في أنه الدواء الذي تناولته غير مذكورة.

**** في هذه الشارة، العلم، العلامة التجارية أو المسمى أو المؤشر.

1. ما هو كوردارون 150 ملغ / 3 مل، محلول الحقن داخل الوريد في أنيولات وما هي دواعي استعماله

2. قبل أن تستعمل كوردارون 150 ملغ / 3 مل، محلول الحقن داخل الوريد في أنيولات

3. كيفر يستعمل كوردارون 150 ملغ / 3 مل، محلول الحقن داخل الوريد في أنيولات

4. الآثار الجانبية المعاشرة

5. كيفر ينفع كوردارون 150 ملغ / 3 مل، محلول الحقن داخل الوريد في أنيولات

6. معلومات إضافية

1. ما هو كوردارون 150 ملغ / 3 مل، محلول الحقن داخل الوريد في أنيولات وما هي دواعي استعماله

2. مضادات الانقباضية، الفئة III

يعرف هذه الدواء في علاج بعض اضطرابات النظم القلبي الخطيرة وفي الانتعاش القلبي النبوي في

حالة توقف القلب المتعلق بالرجحان النطفي المقاوم للصدمة الكهربائية الخارجية.

2. قبل أن تستعمل كوردارون 150 ملغ / 3 مل، محلول الحقن داخل الوريد في أنيولات

يُمنع استخدام هذه الدواء في الحالات التالية:

* حساسية معروفة ضد الإيودين أو الأميدارون أو ضد أحد المركيبات الأخرى في الدواء.

** التذرّن.

*** بعض اضطرابات النظم القلبي وأو التوصيل القلبي.

**** توهج ماجنات مع قوطوة في سقط الدم.

***** توهج كيور في سرعة القلب.

***** إبهاد في العمل الثاني من العمل.

***** الإرهاص.

لديك الأفضل ما دون الثالثة من العمر بسبب احتواء الدواء على كحول البنزين.

* بالتزامن مع بعض الأدوية التي يُعَتمد أن تسبب التواء أطراف الطفيلي بسبب كثرة

تفاصيلها (اضطراب خلير في النظم القلبي):

أقوى دفع ممكن.

تبليغ البراءة الأولية داخل الوريد 300 ملخ (أو 5 ملخ/كلاخ) تُخفّف في 20 مل من محلول الملاوكير 5% وتُخفّف بسرعة.

في حال استمرار الرجحان البطيء، يمكن حق كمية إضافية من 150 ملخ داخل الوريد (أو 2.5 ملخ/كلاخ).

طريق الاستعمال
لتقط الأنابيب:

أصلب بالأنابيب بإحكام بحيث تكون النقطة المسؤولة قبالت (الصورة 1). أسلك برأس الأنابيب من أيام الديد وبasisa (حيث يمكن إبعاده عن نقطه المسؤولة) ومن ثم اضطر خواطر الخلف (الصورتان 2 و 3).

* عبر السلك الوريدي المركزي باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي في حالة توقيت القلب المتعلق بالرجحان البطيء المق僚م للعدمة الكهربائية الخارجية يجب أن يكون هنا هذا الدفع كافياً. بأوسع مع طبلون على 50%.

إن استعمال مادة بولي كلوريد الفينيل أو أدوات طبقة ملائمة بفتحات دي إي إيتش دي (Bleiblerökspel) يمكن أن يسبّ إطلاع دي إي إيتش في عند الامتناع بمحلول الأمبورادين للحقن. تقليل تعرّض المريض الذي إي إيتش في ينصح بتضييف بمحلول الأمبورادين تخفّف التصرّف بالتسرب باستخدام أدوات لا تختفي على آقى دي إيتش في مثل الأدوات المق僚مة من مواد حالية من دي إي إيتش في، ماء بولي كلوريد الفينيل، البولي أوليفينات (مواد البوليإيلين والبوليبروبيلين) أو الزجاج.

* للإنعاش القلبي الرئوي في حالة توقيت القلب المتعلق بالرجحان البطيء المق僚م للعدمة الكهربائية الخارجية:

ينصح باستخدام قشر وريدي مركزي إذا كان متوفراً على الفور؛ ولا يمكن حق الأدوية عبر السلك الوريدي المحيطي باستخدام الوريد المحيطي الأكبر الذي له أعلى دفع ممكن.

عدد مرات الحقن خلال العلاج الأولي، يمكن إعطاء الدواء مرتين أو 3 مرات يومياً.

4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة

مثل الأدوية كلها، يمكن أن يسبّ كورادرين 150 ملخ/3 مل، محلول للحقن داخل الوريد في أنابيب تأثيرات جانبية جيدة.

* غثيان:

• يظهر في فقط المرض يمكن عادة معتدلاً وعابراً.
• بطيء في سرعة القلب (بطء القلب) يمكن أن يتميز استثنائياً باضطرابات حالة في النحل (النحل الطلق) (النحل الطلق الجيبي).

• مضاعفة الهاب وريدي يمكن عند الحقن عبر السلك المحيطي المباشر.

• إنكسات في موقع الحقن، آلم أحمر، تصلب، التهاب (قد يشير إلى التهاب الوريدي) والتهاب النسيج الخلوي.

• اضطرابات حادة في الكبد.

* اضطرابات حادة في الكبد (تحصل في غضون 24 ساعة ويختفي أن تكون مميتة

الشركة المصنة

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1, Rue de la Vierge,
Ambarès & Lagrave
33565 Carbon Blanc Cedex – France

تاريخ الموافقة الأخيرة على هذه النشرة، حزيران/ يونيو 2011.

في حالات استثنائية أو اضطرابات مزمنة في الكبد: زيادة معتدلة وعابرة لبعض إنزيمات الكبد (إنزيمات الأدين).

* هيكل، تعرّق، ساقاً الشّر.

• في حالات استثنائية، لوحت الآثاريات التالية بعد الحقن المباشر داخل الوريد: صدمة كالمذلة الإيجيّة، فرق فحص محمد داخل الجمجمة

(شحط مفرط داخل الجمجمة)، مشاكل تنسجية (انزعاج في التنسج) وأو توافق في التنسج.

في التنسج مقاولات المدة لدى المرضى المصابة بقصور تنسجي حاد وبخاصمة لدى مرضى الروه، شقيق في التنسج يمكن أن يتراافق مع حمى دئوي خطير جداً أو سمود حتى بعد الهراء.

التأثيرات غير المعروفة:

* ارتكاشات تنسجية، تورم الرّوجه والعنق.

إذا انتهت أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أو إذا تفاقم أحد التأثيرات الجانبية الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلاني.

5. كيف يُحفظ كورادرين 150 ملخ/3 مل، محلول للحقن داخل الوريد في أنابيب لاحظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظفهم.

لا تستعمل كورادرين 150 ملخ/3 مل، محلول للحقن داخل الوريد في أنابيب بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدون على العلبة.

بعد الفتح، يجب استعمال الدواء على الفور. إحفظ هذه الدواء في حرارة ما دون 25 درجة مئوية.

لا ينصح رمي الأدوية في المياه المبنية أو مع النفايات المنزلية. إسأل الصيدلاني الذي الذي يجب فعله بالأدوية غير المستعملة. فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي كورادرين 150 ملخ/3 مل، محلول للحقن داخل الوريد في أنابيب المادة الفاعلة،

هيوروكلوريد الأمبورادين. لأنبوبة الواحدة من 3 مل..... 150 ملخ

المركبات الأخرى هي،

بوايسوربات .80 تحول بنزولي، ماء للحقن.

كيف هو شكل كورادرين 150 ملخ/3 مل، محلول للحقن داخل الوريد في أنابيب ومستويات الطبلة

هذا الدواء هو محلول للحقن.

عليه من 6 أنابيب.

الشركة المالكة وخصصة التسويق / الشركة المشغلة

sanofi-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris – France

مجلس وزراء الصحة العرب
وأتحاد الصيادلة العرب.