



التهلل يهدف من حد الشئ سلطات والذين يتجاوزون واهم 17 كغ
لا يوسى باستخدام كبريتات كبريت اولى الاكثف ما من الشئ سلطات من العمر قد يتناول القوس بمرارة خائفة ومعتقون: فوجد احدى لمرى تانهم كثر.

طريقة الاستعمال
ويجب تناول 3 كغ الأوكسيد كبريتية كل مرة مع كبريت من الماء ، لا ياشي عليه سحق الأوكسيد في انهدما.

الأوكسيد قابلية للتهلل، إن يمكن تلمها في صلبين متوازيين عد المجاذ.

مكة العلاج
لا تفرق من أخذ هذا الدواء من دون استشارة الطبيب أولاً.

إن أخذ جرعة مفرطة من يدهاين كبريت:
تصل سلبك في اذع إلى ضم اللوزج على اللير.

لا تفسد أخذ يدهاين كبريت:
لا تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما.

إن توقت من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت:
لا تفرق من أخذ يدهاين كبريت بدون استشارة طبيبك أولاً، يجب إيقاف العلاج فوراً، إن أخذ توكت فهدا عن أخذ يدهاين كبريت أو قبل أن يلبس طبيبك ستع
كذلك، سوف يترد خطر الإصابة بالتهلل كبريت سريع.

إذ تأخذ جرعة مضاعفة للترويض من الجرعة التي نسبت انهدما:

• خلل في وظيفة المنجمن (استراحة المنجمن السليم السند الكريات)،

• اضطرابات في السواد، زيادة النشاط القلبي العرقي، سموات في التمر،

• ركاض سائلي كافي مع كم في الغضاب، طلع عليه يحمي (تأثيره حامية مشتركة)،

• يعضن بفرط لثة العرق (يسكن أو يفرط)،

• الإم عسلة وضغف صنف يمكن أن يكون خطيراً (عندل إربوات)،

• ينداء،

• إصابة الكلى (مسور كوني)، التهاب الكلية التنفسي الخفالي، متلازمة فلويدو،

• زيادة حجم الدم الحامض (زمن الكريات)، انخفاض كبير في عدد الكريات البيضاء (نذر الصدمات)،

• فقدان إنتاج خلايا الدم (فقر الدم الكنتسيمي)، إنتاج غير طبيعي لخلايا الدم (خلل التصاق الخلايا)،

• انخفاض عويل الخلد، انخفاض خلد غير طبيعية (إفراط TCA، إملاء TCA...)،

• انخفاض كمية الغضاب بآ (بريدن)فيليباز،

• إفراط كمية الأوربا في الدم،

• ازواج الأروية،

• اضطرابات في التكاثر وفي العدرات الذمعية تظهر هيرميتا (اضطرابات معوية، متلازمة عدم)، تختف بعد بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر من إيقاف العلاج.

يمكن أن تحدث هذه الأعراض مرتبطة بملحات استهامة على مستوى الدماغ (انحور الدماغ).

الإفراج عن التكاليف الصحية

إنذا نومت أو أنك تأثر جادتي، أتم الطبيب أو الصيداني، يتحقق هذا أيضاً على أن تأثر جادتي غير متكرر في هذه الفترة.

بالإضافة عن التكاليف الصحية، تساهم في المزيد من الترويض من المعلومات حول سلامة الدواء.

5. يجب تجنب تناول هذا الدواء

إعظ بعد الدواء بعداً من نقل الأكلان ومثاقولهم.

لا تضعل هذا الدواء بعد عرته انتهاء، المتحالمة المتكرر على فترة.

يشر تاريخ انتهاء الصلابة إلى اليوم الأخير من الشهر المتكرر.

إعظ هذا الدواء في درجة حرارة ما بين 30 درجة مئوية بعداً عن البرودة.

لا تزم الأروية في مصرف الدواء، أو مع التكاليف المالية العادية، اطلب من الصيدلي التماس من الأروية التي لم تعد استعمالها، لمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. محتويات العبوة وسعوليات أخرى

ماذا يحتوي يدهاين كبريتو 500 ملغ، أقراص مغطاة قابلة للتحلوة ذات تعبر معلول

• العبوة البلاطية من:

أقربيات الصيدوية: 333.00 ملغ

حماض الفلوريدية: 145.00 ملغ

كيتية مائدة للأقربيات الصيدوية: 500.00 ملغ

القوس الوارد المغطى القابل للتحلوة.

• العرقيات الأخرى هي:

إيل سولازر 20 mPa.s 3000، سيليكا عرورية لامتية، سيليكا عرورية ستهة، سكون الصيدوية، هروبيلاز 6 mPa.s، مكارونول 6000، 30 % عرور الأوكولات الممتد (البروليت) 30 (، -)، ملق، ثلي كيتيد الفيتامين.

ما هو يدهاين كبريتو 500 ملغ، أقراص مغطاة قابلة للتحلوة ذات تعبر معلول ومحتويات العبوة الفعوية

بأنها هذا الدواء على شكل أقراص مغطاة قابلة للتحلوة، عب. من 30 و 40 و 60 و 100 أقوس.

قد لا تكون الأرقام كلها متسوية في بلدك.

عناصير

Sanofi Winthrop Industrie
82, avenue Raspail
94250 Gentilly – France

التمصغ

Sanofi Winthrop Industrie
1 rue de la Vierge Ambréas Lagrive
33665 Carbon Blanc – France

التاريخ الأخير الذي تمت فيه مراجعة هذا النشرة هو نيسان/أبريل 2020.

تصالح عامة

الصرع هو مرض عصبي، إنه عبارة عن خلل حاد وموكت في النشاط الكهربائي في الدماغ، يؤدي إلى نوبات صرع.

قد تكرر النوبات على فترة معينة من حياة شخص ما.

تأتي هذه النوبات المتكررة مختلفة وقد تتطور بمرور مخطئة أيضاً؛ ليس هناك نوع واحد من الصرع بل أنواع عدة.

كذلك، ليس هناك علاج واحد بل عدة علاجات ممكنة، سوف يصف لك الطبيب العلاج الأنسب المناسب لذلك.

الخاصة.

لتحسان نوعية الحياة التي وصف لك، من الضروري أن تتبع توصيات الطبيب وتتقيد بما يلي:

• الجرعة اليومية الموصوفة لك،

• أوقات الجرعات،

• مدة العلاج، عادة طوول الأدد،

• التوصيات المتعلقة بنمط الحياة، تجنب العمل المرفوق بالوقه اليوم وضرب الكحول.

إن تغيير الجرعات، لا سيما التوقف الجاهلي عن العلاج، قد يؤديان إلى ظهور النوبات من جديد.

لا تنس أن تأخذ دواءك معك إذا سافرت.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks

Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.

Do not repeat the same prescription without consulting

Keep all medicaments out of reach of children

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacies.

إن هذا الدواء

مستحضر يورل على صحته وإستهلاكه خلافا للتعليمات يوضهه الخطر.

اتبع بدقة وصلة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

• الطبيب والصيدلي هما المتخصصان في الدواء وفي نفعه وضرو.

• لا تضلع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

• لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

• لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
وإتحاد الصيدالفة العرب

793239
170x210 TC
4349