

ديتروبان®

أوكسيبوتينين 5 ملغ

قرص قابل التجزئة

Ditropan® 5 mg

- الفقد الحجابي أو مرض معدى معوي آخر.
- مرض في الكبد أو في الكلى.
- العدوى البولية.
- سوابق شذوذ في نظم القلب.
- سوابق مرض في الدماغ.

تناول أو استعمال أويبة أخرى: إذا كنت تأخذ أو أخذت مؤخراً دواءً آخرًا بما في ذلك دواء حصلت عليه من دون وصفة طبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلاني.

الحمل والإرضاع: لا ينبغي تناول هذا الدواء أثناء الحمل إلا إذا أشار الطبيب بعكس ذلك. لا ينبغي تناول هذا الدواء أثناء فترة الإرضاع. عليك باستشارة طبيبك أو الصيدلاني قبل تناولك أي دواء.

قيادة المركبات واستعمال الآلات: قد يسبب هذا الدواء النعاس أو عدم وضوح الرؤية يُنصح بالامتناع عن قيادة المركبات والعمل على الآلات أو أداء أعمال خطيرة.

قائمة بالسواوغ ذو تأثير معروف: اللاكتوز.

3. كيف يؤخذ ديتروبان

المقدار

للبالغين

الجرعة الأولية هي 1/2 قرص. 3 مرات في اليوم.

الجرعة المعتادة هي قرص واحد مرتان في 3 مرات في اليوم.

يمكن لطبيبك أن يزيد الجرعة إلى حد أقصى قدره قرص واحد 4 مرات في اليوم.

إذا كنت مُسنّاً، الجرعة الأولية هي 1/4 قرص مرتان في اليوم والجرعة المعتادة هي قرص واحد مرتان في اليوم.

للأطفال

الأطفال أكبر من 5 سنوات: الجرعة الأولية هي 1/4 قرص مرتان في اليوم.

الجرعة المعتادة هي

1/2 - 1/4 قرص 3 مرات في اليوم للأطفال من 5 إلى 9 سنوات.

قرص واحد مرتان في اليوم للأطفال من 9 إلى 12 سنة.

قرص واحد 3 مرات في اليوم للأطفال ابتداءً من 12 سنة.

لا ينصح باستعمال هذا الدواء لدى الأطفال أصغر من 5 سنوات.

طريقة الإصطاع: عن طريق الفم. يمكن ابتلاع هذه الأقراص على معدة خاوية مع كوب من الماء كما يمكن أيضاً تناولها مع الوجبات. أو مع كوب من الحليب في حالة الآم في المعدة.

مدة المعالجة: تقيد تماماً بوصفة الطبيب.

إذا تناولت أكثر مما يجب من ديتروبان: اتصل بطبيبك أو بالمستشفى على الفور.

إذا نسيت تناول ديتروبان: إذا نسيت تناول الدواء قم بتناول القرص في أقرب وقت ممكن بواصل علاجك كالمعتاد.

4. ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة

مثل كافة الأدوية، قد يسبب ديتروبان تأثيرات غير مرغوبة لكن ليس من الضرورة تعرض الجميع لذلك. التأثيرات غير المرغوبة الأكثر شيوعاً التي أبلغ عنها هي جفاف الفم، والإمساك، وعدم وضوح الرؤية، اتساع حشفة العين، تسرع مرور الغثاين، انزعاج في البطن، احمرار الوجه، الأرق، اضطرابات في النوم (عسر النوم)، الأكل، شحوب، الصداع، احتباس البول، الدوان، النعاس، جفاف البشرة، الإسهال، الانطهم القلبي (عدم انتظام ضربات القلب)، بعض الاضطرابات في العين (ارتفاع ضغط الدم داخل العين والزرق وجفاف العين)، الجزر الفرجي المؤني، اختلاجات، الهلوسة والكوابيس، نفضش العقل، القلق والهذيان (العراض الاضطرابات الشخصية)، ارتكاسات خفسسية مثل الطفح الجلدي، الشرى، والوذمة الوعائية. إذا لاحظت أي تأثير غير مرغوب غير مذكور في هذه النشرة أو في حال تفاقم إحدى التأثيرات غير المرغوبة، عليك إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني.

5. كيف يحفظ ديتروبان

يحفظ بعيداً عن بصر ومناول أيدي الأطفال. لا تستعمل ديتروبان بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة. يُحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية. لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو الغفايات المنزلية. اسأل الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. وسوف تساعد هذه التدابير على حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

على ماذا يحتوي ديتروبان؟

المادة الفاعلة هي: هيدروكلوريد الأوكسيبوتينين 5,00 ملغ لكل قرص قابل التجزئة المكونات الأخرى هي: لك ألومنيوم والبنجوجين سيليكوزميكربوليدي، ستيارات الكالسسيوم، لاكتوز، لامالي.

ما هو ديتروبان وما هو محتوي العبوة؟

يتوفر هذا الدواء على شكل أقراص قابلة التجزئة. علبة جوي 60 قرصاً.

حامل رخصة التسويق والمسئوق

13,

المصنّع

30 36, avenue Gustave Eiffel 37100 Tours - France

تاريخ آخر تحديث لهذه النشرة هو سبتمبر 2012.

يرجى قراءة كامل هذه النشرة بمنع قبل استعمال هذا الدواء.
• احتفظ بهذه النشرة فقد خُتاج إلى إعادة قراءتها
• إذا كان لديك أي أسئلة أو أي شكوك، اسأل طبيبك أو الصيدلاني.
• وصف هذا الدواء لك خصيصاً لا تقدمه لأي شخص آخر حتى ولو كان يعاني من نفس الأعراض التي تعاني منها.
• في حال تفاقم إحدى التأثيرات غير المرغوبة، أو إذا لاحظت أي تأثير غير مرغوب فيه غير مذكور في هذه النشرة، عليك إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني بذلك.

في هذه النشرة:

1. ما هو ديتروبان وفي أية حالة يستعمل
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ديتروبان
3. كيف يؤخذ ديتروبان
4. ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة
5. كيف يحفظ ديتروبان
6. معلومات إضافية.

1. ما هو ديتروبان وفي أية حالة يستعمل

الفئة الدوائية العلاجية: علاج للمسالك البولية/ مضاد لتشنج المسالك البولية.

دواعي الاستعمال العلاجية

يوصى باستعمال هذا الدواء:

- لدى البالغين والأطفال أكبر من 5 سنوات من العمر في الحالات التالية:
- سلس البول (التبول غير الإرادي المتأري أو الليلي).
- الإحراج البولي (الحاجة للتبول القوي) والوجبة للفرطة للتبول في حالة اللثة غير المستقرة الناتجة عن عدم استقرار تنفاسي للعضلة النافضة (عدم استقرار من أصل غير معروف لعضلات اللثة) أو اضطرابات مثانية من منشأ عصبي (اضطرابات متعلقة باللثة ناتجة عن بعض أمراض الجهاز العصبي).
- لدى الأطفال أكبر من 5 سنوات من العمر.
- سلس البول الليلي في حال فشل العلاجات الأخرى.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ديتروبان

راجع طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا كان قد أخبرك بعدم خُملك بعض السكريات.

موانع الاستعمال

لا تتناول ديتروبان في الحالات التالية:

- الحساسية للأوكسيبوتينين وأو لأي من مكونات هذا الدواء
- احتمال الاحتباس البولي، عسر عند إفراغ المثانة، المتعلق باضطرابات بروتستانية بولية.
- الانتسداد للعوي توقف مرور المحتويات، وغازات موهودة في جزء من الأمعاء.
- تضخم القولون النسمي (تد جزء من الأمعاء).
- وتي الأمعاء (تقص هام في توتر الأمعاء).
- التهاب القولون النفرسي، الوجيه (التهاب القولون).
- الوهن العضلي (مرض في العضلات).
- وجود سوابق زرق السداد الزاوية (زيادة الضغط داخل العين).

احتياطات الاستعمال وتحذيرات خاصة

كن حذراً مع ديتروبان

تحذيرات

قد يحتاج طبيبك إلى زبوتك مرة أخرى بعد 4 إلى 6 أسابيع لإعادة تقييم علاجك. ينبغي عدم استعمال أوكسيبوتينين لعلاج سلس بول الإجهاد. يمكن أن يؤدي أوكسيبوتينين إلى تفاقم حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، نشاط مغرط للغدة الدرقية) أو بعض الاضطرابات القلبية (مرض الشريان التاجي، قصور القلب الاحتقاني، عدم انتظام ضربات القلب، تسرع القلب) أو تضخم البروستاتا (زيادة في حجم البروستاتا). عليك إبلاغ طبيبك إذا كان لديك أي من هذه الاضطرابات.

قد يسبب تناول أوكسيبوتينين لفترة طويلة انزعاجاً يسبب نقص في إفراز اللعاب وبالتالي إلى تعزيز ظهور تسوس الأسنان وتحلل دواعم السن (الصابة الأنسجة الداعمة لللسان). دام للمبيبات القموي (عدوى في الفم ناتجة عن بعض الفطريات). في حالة درجة حرارة بيشية عالية قد تؤدي المعالجة بأوكسيبوتينين إلى انخفاض في التعرق يسبب لشفة حرارة، ويزداد هذا الاحتمال في شرائح الأعمار القصوى (الرضع والأطفال والمسنين) وفي حالة وجود أمراض مزمنة (وخاصة القلبية الوعائية) أو الكلوية أو العصبية (النفسانية). لا ينصح باستعمال هذا الدواء لدى المرضى الذين يعانون من عدم خمل الغالاكتوز أو من متلازمة سيوم امتصاص الغلوكتوز والغالاكتوز أو لديهم نقص في أنزيم لAPP (مرض وراثية نادرة).

احتياطات الاستعمال: ينبغي استعمال هذا الدواء بحذر عند المسنين والأطفال وينصح بعدم استعماله عند الأطفال أصغر من 5 سنوات من العمر.

يجب إبلاغ طبيبك في حالة:

- مرض في الجهاز العصبي.