

دوغماتيل® 50 ملغ

كيسولات صلبة

سولبيريد ايد

الرجاء قراءة هذه النشرة كاملة، قبل تناول هذا الدواء.

- تتلخص النشرة في عدة نقاط، هي: (الأمثلة صلبة)
- لا تأخذ كمية كبيرة أو شديدة من دواء دوغماتيل أو الصوديوم المحتوي على المزيد من المعلومات.
- قد تعرف هذا الدواء، لك شخصياً، لا تعلقه أبداً على شخص آخر، إذا كانت عوارضه مماثلة لعوارضك، لأنه قد يوفيه.
- في حال تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت تغيرات جانبية غير متوقعة في هذه النشرة، اطلب الطبيب الصيدني.

في هذه النشرة:

- 1 ما هو دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة وما هي دواعي استعماله
- 2 قبل أن تتناول دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة
- 3 كيف يجب تناول دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة
- 4 الآثار الجانبية المحتملة
- 5 طريقة حفظ دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة
- 6 معلومات إضافية

1 ما هو دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة وما هي دواعي استعماله

مضاد للالتهاب مهمي عصبي

يستعمل هذا الدواء لعلاج آلام العرق وبعض أشكال الصداع لدى البالغين وبعض الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال والأطفال ما فوق السنوات.

2 قبل أن تتناول دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة

إذا قال لك الطبيب أنك تعاني من عدم تحمل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل تناول هذا الدواء

- لا تتناول دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة في الحالات التالية:
- فترة الحساسية ضد السولبيريد أو ضد أحد المركبات الأخرى في الدواء.
- سوء محضف قاعلي البارونيكس، مثلًا، ومرض العانة الخامية أو سرطان الثدي.
- ورم الكبد (حالة يصعب أب الكلى وسبب ارتفاعاً في ضغط الدم).
- بالترافق مع أدوية الوبصيان غير المستعملة كأدوية مضادة لآلام باركنسون وكينغوليد (دواء يستعملان للاضطرابات الإرعاش) (راجع فقرة تناول أدوية أخرى)

إذا كان لديك أي نك، من الضروري أن تستشير الطبيب أو الصيدني
استخدم عقايد خاصة مع دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة

تحذيرات خاصة
في حال الإصابة بنمى غير مبررة أو بنسج أو بنمى كتلي من الضروري الاتصال بالطبيب أو بمركز طوارئ طبي على الفور

يؤيد كنف في اضطرابات قلبية مختلفة، قد يثقل ذلك من عمل الكلى، اجراء مخططة لكهربائية القلب لأن هذا الدواء يمكن أن

يسبب اضطرابات في تنظيم القلب (راجع الفقرة "الآثار الجانبية المحتملة")

يجب استعمال هذا الدواء بحذر لدى المرضى الذين لديهم مشاكل خطيرة للإصابة بسكتة مادية

يجب استعمال هذا الدواء بحذر لدى المرضى المسنين الحساسين بالتهمة

يجب استعمال هذا الدواء بحذر إذا لميس أنت أو أحد أفراد عائلتك في السباحة بجلبات موية بما أن تناول مضادات

الالتهاب يمكن بتشكيل جلاتل موية

لدى الأطفال، من الضروري اجراء اجراء طبية منتظمة

لا يجب اعطاء الافرا و كيسولات صلبة للأطفال ما دون السنت سنوات بسبب خطر الاختناق

لا يتصل بتناول هذا الدواء مع أدوية مهدئة أو أنوية تحتوي على الكحول وعن البلفوبوية وأدوية الوبصيان المضادة لآلام

باركنسون ومضادات التشنجات التي يمكن أن تسبب التواء اتراف البطينين بسبب كثرة خفاقتها (اضطرابات خطيرة في

تنظيم القلب) والعيانوي ومهدئات معينة أخرى (ويوت يمكن أن تسبب التواء اتراف البطينين بسبب كثرة خفاقتها (راجع

فقرة "تناول أدوية أخرى")

بحذو هذا الدواء على الأكل أو يجرى به تناول هذا الدواء إذا كنت تعاني من عدم تحمل الغالكتوز أو من نقص لآب

اللاكتاز أو من تثارر سوء امتصاص الفلوكوز والغالكتوز (أمراض وراثية نادرة).

في حال شكك من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدني

محددات الاستعمال

يجب عليك أن تعلم طبيبك إذا كنت تعاني بأي من الحالات التالية لكي يتكيف الجرعة وأو مراقبة العلاج

– مرض في القلب.

– داء باركنسون.

– قصور كلوي.

– إصابات سابقة بمرض صراع (منذ وقت بعيد أو حديثاً) أو صرع.

– داء السكري أو عوامل خطر الإصابة بداء السكري.

في حال شكك، لا تتردد باستشارة الطبيب أو الصيدني.

تناول أدوية أخرى

لا ينبغي تناول هذا الدواء مع الكاربوجولين أو الكينغوليد (دواء يستعملان للاضطرابات الإرعاش) (راجع فقرة "لا تتناول

دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة في الحالات التالية")

يجب تقادي استعمال هذا الدواء مع المواد التالية:

• بعض أدوية علاج داء باركنسون.

• بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب التواء اتراف البطينين بسبب كثرة خفاقتها (اضطرابات خطيرة في تنظيم القلب).

• المشروبات أو الأوية التي تحتوي على الكحول.

الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدني إذا كنت تتناول دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة مع أدوية أخرى بما فيها تلك التي حصلت

عليها بعد وصفة طبية.

الحمل

يجب عدم استعمال هذا الدواء في خلال فترة الحمل إلا بناء على نصيحة الطبيب.

إذا اكتشفت أنك حامل الصلي، بطبيبك لكي يقرر ما إذا كان من الضروري متابعة العلاج

الإرعاش

لا يوصى بالإرعاش في خلال مدة العلاج بهذا الدواء

استشيري الطبيب أو الصيدني قبل تناول في دواء

القيادة واستعمال الآلات

يجب عليك أن تعرف أن هذا الدواء قد يسبب الغمسا، لا سيما إذا كنت تقود سيارة أو تستعمل آلات.

معلومات مهمة حول بعض مكونات دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة

اللاكتوز

كيف يجب تناول دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة

ما هو عدد الافرا دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة التي تتناولها

لاستعمال الأوية والأطفال ما فوق السنت سنوات فقط.

مقدار الجرعة متغير ويجب أن يحدد حسب كل حالة فردية.

في مطلق الأحوال، تقيد بدة بوصفة الطبيب.

كيف يجب تناول دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة

عن طريق الفم.

ما هي مدة العلاج بدوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة

تؤيد بوصفة الطبيب.

إذا تثاررت كمية من دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة أكبر من التي عليك تناولها

إذا تناولت جرعة مفرطة من هذا الدواء، اطلب العلم الطبيب أو مركز طوارئ طبي على الفور بسبب خطر التعرض لاضطرابات

قلبية خطيرة.

الآثار الجانبية المحتملة

مثل الأوية كلها يمكن أن يسبب دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة آثار جانبية لا تصعب المرضي كهم.

عوارض البرورة الشديدة، تضخم الشرايين، الإزأ غير طبيعي للحليب من الحفمة.

عثة، زيادة وزن.

– زيادة وزن.

– غمسا.

– رفة، تيبس وأو حركات غير طبيعية تضخم حركات الوجه (والسان).

– دواو عند الفوف بعد الاستيقاظ أو الجوس.

– اضطرابات في تنظيم القلب قد تؤدي إلى الواع (راجع فقرة "تحذيرات خاصة")

– يوات صرع.

– طفح.

– زيادة في التزمات الكبد.

– يمكن أن ترم عطلات موية وريدية لا سيما في السابقين (تضمّن العوارض توروماً وأمماً واحمراراً في السابقين) عبر

الأوعية الدموية لتصل إلى الرئينين مسببةً أماً في التنفس (لا تعرضت لأحد هذه العوارض إذهب

إلى الطبيب على الفور).

– تثارر الحمى العصبي الحبيبي ويمكن أن يبدأ الحمى عبر مبررة، ترقق، خشوب، تغيير في ضغط الدم أو نظم

القلب، ضعف في الوبي، تيبس عسلي، اعلم الطبيب أو مركز طوارئ طبي على الفور في حال ظهر أحد هذه العوارض (راجع

فقرة "تحذيرات خاصة")

لا تتردد باستشارة الطبيب أو الصيدني وبالأزلاغ عن آثارها غير مرغوب بها ومزعجة، لا سيما للتغيرات غير المتوقعة

في هذه النشرة

طريقة حفظ دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة

اطخا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال وتطزيم

لا تخأ دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة بعد انقضاء تاريخ الصلاحية الموزن على العبوة

اطخا الدواء في حرارة لا تتعدى 30 درجة مئوية

لا ينبغي في الأدوية في المياه العذبة أو مع التفاعلات الموزلية (أسال الصيدي) عن كيفية التخلص من الأوية غير

المستعملة، فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة

المادة الفاعلة هي:

قائمة السولبيريد، 50 ملغ

كيسولة صلبة واحدة.

المكونات الأخرى هي: لاكتوز، ميثيل سلولون، طلق، سترات المغنيزيوم.

مركبات غلاف الكبسولة الصلبة، حلام، ثاني أكسيد التيتانيوم (17).

مركبات ياتي دوغماتيل 50 ملغ كيسولات صلبة ومحتويات العبوة الخارجية

يأتي هذا الدواء على شكل كيسولة صلبة (غبة) من 30 و 100.

حامل رخصة التسويق والشركة المصنعة

المصنع

sanofi-aventis France
1-13, boulevard Roman Rolland - 75014 Paris – France

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
6, boulevard de l'Europe – 21800 Quetigny - France

تاريخ الموافقة الأخيرة على هذه النشرة

نشرين الثاني 2009

إن هذا الدواء

متاحصر بوتر على صحتك واستهلاكه خلافا لتعليمات

يعرضك لخطر

التأخ عن علاقتك وصحة الطبيب، وطريقة الاستعمال المخصوص

عليها، وتعليمات الصيدني الذي مررها لك.

• الطبيب أو الصيدني إذا الخديرت في الدواء وفي نغمة

وقررت

• لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

• لا تترن صرور الدواء بدون استشارة الطبيب.

• لا تترن الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

والأحد الصيدالية العرب.