

Podertonic enfants



Ferricitrate de choline

Sachets

VOIE ORALE

COMPOSITION PAR SACHET DE 5 ml de solution buvable:

Ferricitrate de choline 500 mg
(équivalents à 56,3 mg de fer élément)

Excipients : Saccharine sodique, saccharose, édétate disodique, nipagin sodique (E-218), nipasol sodique (E-216), arôme à la framboise, eau déminéralisée.

INDICATIONS:

Prophylaxie et traitement de l'anémie par manque de fer.

POSOLOGIE:

Un sachet de 5 ml 1 à 2 fois par jour, selon l'avis médical.

MISE EN GARDE:

L'absorption de fer est plus importante lorsqu'il est administré par un estomac vide. Par contre, dans ces conditions la fréquence de troubles gastro-intestinaux augmente. Il faut prendre certaines précautions en cas d'états inflammatoires du système gastro-intestinal : entérites, ulcères peptiques, colites ulcéreuses.

En cas de transfusions sanguines fréquentes, l'administration de sels de fer peut provoquer un surdosage en fer.

Le changement de couleur de la substance à l'intérieur du sachet avec le temps est normal, du à la composition du produit.

EFFETS INDESIRABLES:

Occasionnellement, des troubles gastro-intestinaux : douleur épigastrique, pyrosis, nausées, coliques intestinales, constipation. On peut réduire l'intensité de ces troubles en administrant le médicament simultanément avec les aliments ou en élévant la dose de façon graduelle. Le produit noircit les fèces.

CONTRE-INDICATIONS:

-Hémochromatose ou hémosidérose (excès de fer)

-Anémies non ferropéniques

INTERACTIONS:

L'administration simultanée de sels de fer avec des tétracyclines ou la pénicillamine peut faire diminuer l'absorption des deux médicaments.

Les sels de fer peuvent faire baisser l'absorption des quinolones (Ciprofloxacine et autres) et de la Lévodopa.

Les antiacides peuvent abaisser l'absorption orale des sels de fer. Dans n'importe quel de ces cas, laisser passer au moins 2 heures entre l'administration de chaque médicament.

INTOXICATION ET TRAITEMENT:

L'intoxication par fer est extrêmement rare chez l'adulte, mais pas chez l'enfant. En cas de symptômes d'intoxication, éliminer rapidement le fer et prendre les mesures d'accompagnement pertinentes.

PRESENTATION:

Podertonic Enfants, boîte de 20 sachets de 5 ml de solution buvable

Podertonic Adultes, boîte de 20 sachets de 10 ml de solution buvable

GARDER LES MEDICAMENTS HORS DE PORTEE DES ENFANTS

SANS ORDONNANCE MEDICALE

inkeysa, s.a

Juan XXIII, 15-19

08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) ESPAGNE

6070-A

Podertonic adultes



Ferricitrate de choline

Sachets

VOIE ORALE

COMPOSITION PAR SACHET DE 10 ml de solution buvable:

Ferricitrate de choline 1000 mg
(équivalents à 112,6 mg de fer élément)

Excipients : Saccharine sodique, saccharose, édétate disodique, nipagin sodique (E-218), nipasol sodique (E-216), arôme à la framboise, eau déminéralisée.

INDICATIONS:

Prophylaxie et traitement de l'anémie par manque de fer.

POSOLOGIE:

Un sachet de 10 ml 1 à 2 fois par jour, selon l'avis médical.

MISE EN GARDE:

L'absorption de fer est plus importante lorsqu'il est administré par un estomac vide. Par contre, dans ces conditions la fréquence de troubles gastro-intestinaux augmente. Il faut prendre certaines précautions en cas d'états inflammatoires du système gastro-intestinal: entérites, ulcères peptiques, colites ulcéreuses.

En cas de transfusions sanguines fréquentes, l'administration de sels de fer peut provoquer un surdosage en fer.

Le changement de couleur de la substance à l'intérieur du sachet avec le temps est normal, du à la composition du produit.

EFFETS INDESIRABLES:

Occasionnellement, des troubles gastro-intestinaux : douleur épigastrique, pyrosis, nausées, coliques intestinales, constipation. On peut réduire l'intensité de ces troubles en administrant le médicament simultanément avec les aliments ou en élévant la dose de façon graduelle. Le produit noircit les fèces.

CONTRE-INDICATIONS:

-Hémochromatose ou hémosidérose (excès de fer)

-Anémies non ferropéniques

INTERACTIONS:

L'administration simultanée de sels de fer avec des tétracyclines ou la pénicillamine peut faire diminuer l'absorption des deux médicaments.

Les sels de fer peuvent faire baisser l'absorption des quinolones (Ciprofloxacine et autres) et de la Lévodopa.

Les antiacides peuvent abaisser l'absorption orale des sels de fer.

Dans n'importe quel de ces cas, laisser passer au moins 2 heures entre l'administration de chaque médicament.

INTOXICATION ET TRAITEMENT:

L'intoxication par fer est extrêmement rare chez l'adulte, mais pas chez l'enfant. En cas de symptômes d'intoxication, éliminer rapidement le fer et prendre les mesures d'accompagnement pertinentes.

PRESENTATION:

Podertonic Enfants, boîte de 20 sachets de 5 ml de solution buvable

Podertonic Adultes, boîte de 20 sachets de 10 ml de solution buvable

GARDER LES MEDICAMENTS HORS DE PORTEE DES ENFANTS

SANS ORDONNANCE MEDICALE

inkeysa, s.a

Juan XXIII, 15-19

08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) ESPAGNE

6069-A