

فلاچنتيل® ٥٠٠ مجم

سيكنيدازول



• داء الأمبيبات المعويّ:

– داء الأمبيبات المعويّ الحاد المصحوب بأعراض:

- البالغون: ٤ أقراص (أي: ٢ جرام) يتم تناوّلهم في هيئة جرعة واحدة في بداية الوجبة.
 - الأطفال: ٣٠ مجم / كجم في اليوم كجرعة مفردة.
- يتم تناوّل الجرعة ليوم واحد فقط.

– داء الأمبيبات المعويّ غير المصحوب بأعراض: الجرعة اليومية نفسها لمدة ٣ أيام.

• داء الأمبيبات الكبديّ:

– البالغون: ٣ أقراص يومياً (أي: ١,٥ جم في اليوم).

– الأطفال: ٣٠ مجم / كجم في اليوم.

يتم تناوّلها في هيئة جرعة واحدة أو جرعات متعددة في بداية الوجبة لمدة ٥ أيام.

داء الجيارديّات:

– الأطفال: ٣٠ مجم / كجم في اليوم كجرعة مفردة

كيفية تناوّل عقار فلاجنتيل ٥٠٠ مجم أقراص مغلفة محزّزة للاستخدام عن طريق الفم

إذا لم تكن متأكدًا من أي شيء، لا تتردد في طلب النصيحة من الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

منى يجب تناوّل عقار فلاجنتيل ٥٠٠ مجم أقراص مغلفة محزّزة؛ ولكم مرة؛ تناوله في بداية الوجبة.

اتب وصفة طبيبك بشكل صارم.

ما هي العدة التي يجب تناوّل عقار فلاجنتيل ٥٠٠ مجم أقراص محزّزة خلالها؛
اتب وصفة طبيبك بشكل صارم.

الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع أي دواء، قد يكون لهذه المادة تأثيرات يمكن أن تسبب درجات متفاوتة من الشعور بعدم الراحة لدى بعض المرضى:

– اضطرابات الجهاز الهضمي (غثيان، ألم بالعدة)، مذاق معدني في الفم، التهاب اللسان، التهاب الفم.

– تفاعلات حساسية فورية نادرة: حمى واحمرار وشرى (أرتكاريا) ووذمة وعائية (تورم الوجه) (انظر: "يجب عدم استخدام هذا الدواء في الحالات التالية").

– نازلة، دوخة، واضطرابات حسية وحركية في الجهاز العصبي.
– لثة كثرة الدم البيضاء بدرجة معتدلة (انخفاض غير طبيعي في مستويات خلايا الدم البيضاء)، الأمر الذي يزول عند التوقّف عن تناوّل العلاج.

إذا لاحظت أي آثار أخرى غير مرغوبة ومزعجة غير مذكورة في هذه النشرة، فيجب عليك إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

كيفية تخزين عقار فلاجنتيل ٥٠٠ مجم أقراص مغلفة محزّزة

لا يستخدم بعد انتهاء موعده صلاحيته المكتوب على العلبة من الخارج.
يخزن في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية، في مكان جاف.

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

انتاج شركة سانوفي إيجيبث بتصريح من شركة سانوفي افينتس-فرنسا

تم الموافقة على هذه النشرة في ١٠ مايو ٢٠١٧

يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ في استعمال هذا الدواء.

إذا كانت لديك أية أسئلة، أو إذا لم تكن متأكدًا من أي شيء، استشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك لمزيد من المعلومات.

احتفظ بهذه النشرة؛ قد تحتاج إلى الرجوع إليها مرة أخرى.

ما هو عقار فلاجنتيل ٥٠٠ مجم أقراص مغلفة محزّزة؟

التركيب

المادة الفعّالة: لكل قرص:

سيكنيدازول.....
السواغات: فوسفات هيدروجين الكالسيوم، سيلونز دقيق التبلور، نشا القمح، سليكا مائية، جليكوالات نشا الصوديوم، جيلاتين، ستيرات الماغنسيوم، هيبروميلوز.

الشكل والنحضر الصيدلي

عبوة كرتون تحتوي على شريط واحد، الشريط يحتوي على ٤ أقراص مغلفة و نشرة داخلية.

مجموعة الدواء العلاجية

مضاد الطفيليات، مضاد الأولي، مبيد الأمبيبات النسيجية، مبيد الأمبيبات التماسي، (P. علم الطفيليات).

كيف يستخدم عقار فلاجنتيل ٥٠٠ مجم أقراص مغلفة محزّزة؟

يرجى بهذا الدواء في علاج:

– التهاب الإخيل والتهاب المهبل نتيجة المَشْرُات المَهْلِيّة

– داء الأمبيبات المعويّ وداء الأمبيبات الكبديّ

– داء الجيارديّات.

قبل تناوّل عقار فلاجنتيل ٥٠٠ مجم أقراص مغلفة محزّزة

يجب عدم استخدام هذا الدواء في الحالات التالية.
لا تتناول عقار فلاجنتيل ٥٠٠ مجم أقراص مغلفة محزّزة إذا:

– كان لديك حساسية تجاه مشتقات إيميدازول أو أي من المكونات الموجودة بهذا

الدواء.

– كنت حُرْضًا.

– كان لديك حساسية تجاه القمح؛ إذ يحتوي هذا الدواء على نشا القمح.

إذا كنت غير متأكد من أي شيء، فمن الضروري طلب النصيحة من الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

توخ حذرًا خاصًا مع عقار فلاجنتيل ٥٠٠ مجم أقراص مغلفة محزّزة.

يجب عليك تجنب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.

أخير طبيبك إذا كان لديك تاريخ من اضطرابات الدم.

يُمكنك تناوّل هذا الدواء إذا كنت مريضًا بمرض بطني متعلق بالجلوتين. قد يحتوي نشا القمح على آثار فقط من الجلوتين، من ثم قد آمنًا للمرضى الذين يعانون من المرض البطني.

إذا كنت غير متأكد من أي شيء، فمن الضروري طلب النصيحة من الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

تناول عقار فلاجنتيل مع أدوية أخرى

لتجنّب أي تداخلات بين الأدوية المختلفة، وخاصة ديسلفيرام، يجب عليك دائمًا إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك بأي علاج آخر قد تكون تتناولوه

الحمل والرضاعة الطبيعية

يُمنَحُ لا تستخدمى هذا الدواء أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.
إذا اكتشفت أنك حامل أثناء تناوّل هذا الدواء، فاستشري طبيبك، فهو/ هي الشخص الوحيد الذي يُمكنه أن يُحدد ما إذا كان الاستمرار بالعلاج أم لا.

كقاعدة عامة، يجب عليك دوماً أثناء الحمل أو ممارسة الرضاعة الطبيعية طلب النصيحة من طبيبك أو الصيدلي الخاص بك قبل استخدام أي دواء.

قائمة بالسواغات ذات التأثير المحد:

نشا القمح (الجلوتين)

كيفية تناوّل عقار فلاجنتيل ٥٠٠ مجم أقراص مغلفة محزّزة

كم عدد الأقراص التي يجب تناوّلها من عقار فلاجنتيل ٥٠٠ مجم أقراص مغلفة محزّزة؟

يجب أن يُعطى هذا الدواء فقط للأطفال الذين لا تُلّ أعمارهم عن ٦ أعوام نظرًا لكونه في هيئة قرص.

كقاعدة عامة:

• التهاب الإخيل والتهاب المهبل.

– البالغون: ٤ أقراص (أي: ٢ جرام) يتم تناوّلهم في هيئة جرعة واحدة في بداية الوجبة.