

MEGAMAG® 45mg

aspartate de magnésium

■ IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

DÉNOMINATION :

MEGAMAG 45 mg, gélule.

COMPOSITION :

ASPARTATE DE MAGNESIUM DIHYDRATÉ..... 400 mg

La teneur totale en magnésium-élément est de 45 mg par gélule.

Excipients : Amidon de blé, Stéarate de magnésium.

Pour une gélule de 421 mg.

Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, indigotine (E 132), dioxyde de titane (E 171).

FORME PHARMACEUTIQUE :

Gélule - Boîte de 40.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

SUPPLÉMENT MINÉRAL (A: Appareil digestif et métabolisme).

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR

LE MARCHÉ / EXPLOITANT / FABRICANT :

Laboratoires MAYOLY SPINDLER

6, avenue de l'Europe - B.P. 51 - 78401 CHATOU CEDEX - FRANCE

■ DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

(Indications thérapeutiques) : Ce médicament est indiqué dans les carences en magnésium confirmées par votre médecin.

■ ATTENTION !

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER

CE MÉDICAMENT (Contre-indications) :

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas de certaines maladies des reins.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas de traitement par les quinidiniques, sauf avis contraire de votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

CE MÉDICAMENT EST RÉSERVÉ À L'ADULTE ET À L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

Il existe des spécialités plus adaptées à l'enfant de moins de 6 ans.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLU-SIEURS MÉDICAMENTS, notamment avec des quinidiniques, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :

Amidon de blé (présence de gluten).

■ COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

RÉSERVÉ À L'ADULTE ET À L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS

POSOLOGIE :

Chez l'adulte : 6 à 10 gélules par jour à répartir en plusieurs prises.

Chez l'enfant de plus de 6 ans (environ 20 kg) : 4 à 6 gélules maximum par jour à répartir dans la journée.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie orale.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL

LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ :

Les gélules seront avalées avec un verre d'eau pendant les repas.

DURÉE DU TRAITEMENT :

Le traitement sera interrompu en accord avec votre médecin.

■ EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS, notamment diarrhées, douleurs abdominales. NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNEZ À VOTRE PHARMACIEN OU À VOTRE MÉDECIN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

■ CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITÉE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

■ DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Novembre 1996.



MAYOLY
SPINDLER

Information médicale : +33 (0)1 34 80 72 60